костью, моментально останавливаетъ кровотеченіе. Благодаря его присутствію, раскрытіе зѣва совершается очень быстро, и тогда, удаливъ его, разрываютъ оболочки и оканчиваютъ роды тѣмъ или инымъ способомъ. Въ одномъ случаѣ Varnier и въ двухъ—авторъ примѣнили этотъ баллонъ съ успѣхомъ. Н. Какушкинъ.

91. Boissard.—Les vomissements chez les femmes enceintes. (La Semaine médicale, 1895 г., № 1). Рвота у беременныхъ.

На тысячу госпитальныхъ беременныхъ авторъ наблюдалъ неукротимую рвоту одинъ разъ, между тъмъ какъ среди меньшаго числа беременныхъ изъ частной практики (болье обезпеченнаго класса) это заболъвание встрътилось автору три раза. Это даетъ поводъ ему заключить, что неукротимая рвота беременныхъ есть одно изъ проявленій нервной слабости, истеріи. Другою причиной неукротимой рвоты беременныхъ авторъ считаетъ болфзненную раздражительность матки, проявляющуюся подъ вліяніемъ растяженія ея полости растущимъ яйцомъ и подъ вліяніемъ періодическихъ сокращеній маточныхъ ствнокъ. Въ пользу умъстности последней причины говорить то обстоятельство, что неукротимая рвота развивается не ранфе третьяго мфсяца беременности и не наблюдается къ концу беременности, когда маточная стънка успъваеть привыкнуть къ раздраженію оть присутствія плоднаго яйда. Къ неукротимой рвотъ пуерперальной авторъ относитъ тодько такую, которая всецьло зависить оть вліяній со стороны полового аппарата и при томъ влечетъ за собой резкія общія явленія упадка питанія. Всѣ другія формы рвоты, наблюдаемыя у беременныхъ и зависящія или отъ мъстныхъ разстройствъ пищеварительнаго аппарата, или отъ рефлекторныхъ вліяній со стороны другихъ, не половыхъ, органовъ, авторъ къ пуерперальной рвотъ не причисляеть. Кром'в общаго упадка питанія симптомами неукротимой рвоты авторъ называетъ: учащение пульса до 120-130 ударовъ въ минуту и появление бълка въ мочъ. Лъчение его направлено на нервную систему (ванны, пульверизація позвоночнаго столба эфиромъ, ледъ на позвоночникъ, насильственный сонъ) и на матку (исправление положения, бромъ и хлоралъ въ клистирахъ, насильственное расширение канала шейки). Какъ вспомогательное средство, авторъ хвалитъ промываніе желудка. Искусственный выкидышь представляеть ultximum refugium, но къ нему, по мненію автора, приходится прибегать редко.

Н. Какушкинъ.