

92. G. Maurange.—*Endométrite fétide des femmes âgées.* (La Presse médicale, 26 janvier 1895 г.). **Зловонный эндометритъ у старухъ.**

Подъ такимъ названіемъ авторъ описываетъ особое заболѣваніе слизистой матки у женщинъ, развивающееся черезъ больший или меньшій періодъ времени послѣ наступленія климактерія. Въ трехъ случаяхъ, бывшихъ подлѣ наблюденіемъ автора и д-ра *Picqué*, имѣлись на лицо слѣдующіе припадки: періодически изъ полости матки изливается отдѣляемое, то гнойнаго вида, то кровавистаго, ѣдкое, съ противнымъ запахомъ. Выдѣленіе бѣлей сопровождается желудочными расстройствами, въ формѣ отсутствія аппетита и рвоты. Женщина быстро худѣетъ; кожа приобретаетъ желтоватый цвѣтъ. При этомъ боли умѣренныя. Матка немного увеличена, подвижна. Изъявленій видимыхъ отдѣловъ слизистой полового канала нѣтъ. Полость матки около 7—8 смт., введеніе зонда болѣзненно. Микроскопическая картина слизистой ничѣмъ не отличается отъ таковой-же при хроническомъ катаральномъ эндометритѣ. Предсказаніе благоприятное. Лѣченіе, — расширение канала шейки, выскабливаніе и послѣдовательная тампонація полости матки, — даетъ блестящій исходъ.

Н. Какушкинъ.

93. M. Guéniot.—*Opérations césariennes multiples.* (Bulletin de l'académie de médecine. Séance du 3 juillet 1894 г.). **Повторное кесарское сѣченіе.**

Авторъ сообщаетъ, что у двухъ больныхъ онъ сдѣлалъ кесарское сѣченіе по 2 раза. У одной больной промежутокъ между обѣими операціями равнялся тремъ годамъ, четыремъ мѣсяцамъ и семи днямъ, а у другой — семнадцати мѣсяцамъ и одиннадцати днямъ. Во всѣхъ случаяхъ дѣти получены живыми, вѣсомъ около 3000 грм. каждое. Операціи сдѣланы по поводу рѣзкихъ рахитическихъ измѣненій таза; въ одномъ случаѣ діагональная конъюгата равнялась 4 смт. Въ трехъ случаяхъ ножъ хирурга попалъ на мѣсто прикрѣпленія послѣда, и потеря крови въ каждомъ изъ этихъ случаевъ достигала 500 грм.; въ четвертомъ случаѣ послѣдъ былъ прикрѣпленъ не на мѣстѣ разрѣза, и потеря крови была умѣренная. Въ случаѣ повторнаго кесарскаго сѣченія спустя 17 мѣсяцевъ и 11 дней послѣ перваго, авторъ наблюдалъ сохранившимися уколы отъ швовъ въ стѣнкѣ матки. Для предупрежденія возможности забеременѣть въ будущемъ въ третій разъ, авторъ