

міомахъ матки операція сдѣлана три раза, у женщинъ 43, 53 и 57 лѣтъ; величина опухолей отъ кулака до дѣтской головки. Два раза примѣнено кускованіе, одинъ разъ (при обѣ известленой фиброміомѣ) разсѣчены задняя стѣнка и влагалище. Случаи окончились выздоровленіемъ. Въ одномъ случаѣ поводомъ къ операціи послужило давнее выпаденіе матки и влагалища, у старухи 66 лѣтъ. Примѣнены зажимы (сняты черезъ 48 часовъ); послѣоперационное теченіе гладкое. Кромѣ описанныхъ случаевъ, авторъ упоминаетъ еще объ одномъ, при ракъ матки, окончившемся смертью, но подробностей не сообщаетъ, потому что скорбный листъ этой больной затерялся. *Н. Какушкинъ.*

93. Д. А. Богатыревъ.—Случай поврежденія влагалища во время совокупленія.—(Еженедѣльникъ, 1897 г. № 50, стр. 795)

Больная 24 л., фабричная, замужняя (уже 8 лѣтъ), родила 6 разъ благополучно. Послѣднія мѣсячныя были 1½ недѣли назадъ. Послѣ бурнаго совокупленія у нея появилось сильное влагалищное кровотеченіе, которое и заставило ее обратиться въ больницу. При изслѣдованіи найдено, что правый сводъ влагалища совершенно оторванъ отъ влагалищной части шейки; щель въ этомъ мѣстѣ сильно зияетъ. Разрывъ продолжается, огибая шейку, кзади. Авторъ сшилъ этотъ разрывъ (8 узловатыхъ швовъ). На 7-й день послѣ операціи при снятіи швовъ констатировано полное сращеніе. *Н. Какушкинъ.*

94. І. А. Штейнъ.—Случай задержанія мертваго плода въ полости матки.—(Еженедѣльникъ, 1897 г. № 50, стр. 793).

Случаи задержанія мертваго плода въ маткѣ, по автору, встрѣчаются не рѣдко: въ засѣданіяхъ Елисаветградскаго Медицинскаго Общества за 3 года сообщено о 8 случаяхъ. Описываемый здѣсь случай касается еврейки, 31 года, страдающей бугорчаткой легкихъ, рожавшей 2 раза и 2 раза имѣвшей искусственный выкидышъ. Во время пятой беременности у нея развитіе яйца прекратилось на 14 недѣлѣ послѣ прекращенія мѣсячныхъ, выкидышъ-же произошелъ на 24 недѣлѣ, причемъ яйцо за это время не развивалось. Выкинутое яйцо состояло изъ толстыхъ мясистыхъ стѣнокъ съ многочисленными кровяными сгустками; внутри оболочекъ на пуповинѣ висѣлъ плодъ, длиной около 2,5 см.; яйцо съ гнилостнымъ запахомъ. *Н. Какушкинъ.*