

95. Л. Н. Варнекъ.—Десятилѣтіе Московскаго Акушерско-Гинекологическаго Общества.—(Врачебныя Записки, 1897 г., № 12 и 13, стр. 220).

96. С. Д. Чечулинъ.—Извлеченіе изъ историческаго обзора дѣятельности за истекшее десятилѣтіе съ 1887 г. по 1897 г. Акушерско-Гинекологическаго Общества при И. Московскомъ университетѣ.—(Тамъ-же, стр. 224).

Уставъ Общества, подписанный 43 учредителями, утвержденъ 13 марта 1887 года. За десять лѣтъ Общество имѣло 153 засѣданія, на которыхъ сдѣлано 212 сообщеній (въ томъ числѣ 53 демонстраціи). О чревосѣченіяхъ сдѣлано 40 докладовъ, о болѣзняхъ беременныхъ 30, о массажахъ и электричествѣ въ гинекологіи 25, о виѣматочной беремености 17, о послѣродовыхъ болѣзняхъ 17, о порокахъ развитія 14, о лѣченіи рака 11, о кесарскомъ сѣченіи и эмбриотоміи 7, о выворотѣ матки 4. Остальные доклады касались неоперативнаго лѣченія женскихъ болѣзней, гинекологическаго инструментарія, общехирургическихъ вопросовъ и мелкихъ казуистическихъ наблюденій. Обществомъ издано 10 томовъ „Трудовъ“ и брошюра „Электричество въ гинекологіи“. Библіотека Общества состоитъ изъ 856 номеровъ изданій. Число членовъ Общества 52. *Н. Какушкинъ.*

97. Н. М. Плѣшковъ.—Случай врожденнаго заращенія влагалища съ послѣдовательнымъ скопленіемъ крови во влагалищѣ, маткѣ и трубахъ.—(Врачебныя Записки. 1897 г. № 16 и 17, с. 268).

Изъ 255 случаевъ заращенія и суженія влагалища, собранныхъ *Эберлиномъ* (московская диссертация 1895 г.), врожденныхъ было 38. Въ случаѣ автора, у 19—лѣтней больной, скопленіе крови въ маткѣ обусловило существованіе въ полости живота опухоли, доходящей верхней границей почти до пупка; у вершины ея съ обѣихъ сторонъ имѣлись двѣ опухоли, съ лѣсной орѣхъ. Заподозрѣно двухстороннее скопленіе крови въ трубахъ и для удаленія послѣднихъ сдѣлано чревосѣченіе. Сращенія матки съ сальникомъ и правыхъ придатковъ съ червеобразнымъ отросткомъ нарушены. Расширенныя трубы и яичники (правый кистовидно перерожденъ, лѣвый нормаленъ) удалены. Черезъ нѣсколько дней проложенъ путь черезъ заращенное влагалище. Слизистая оболочка верхняго отдѣла влагалища низведена и пришта къ краямъ кожной раны. Влагалище дренажировано и затампонировано; промывалось борнымъ растворомъ. Послѣопера-