

врачемъ; черезъ нѣсколько лѣтъ у ней образовалась опухоль на лѣвой половой губѣ; докторъ захлороформировалъ больную съ цѣлью вправленія предположенной грыжи. Вправление не удалось. Тогда больная поступила въ больницу. Опухоль величиною съ воложскій орѣхъ, находилась въ верхней части лѣвой половой губы; при кашлѣ—не измѣнялась; она сообщалась съ паховымъ каналомъ узкимъ ходомъ; прежде была меньше и безболѣзненна, послѣдніе дни—стала болѣть. Ни слабости, ни запоровъ не было. Подъ хлороформомъ авторъ обнажилъ кисту; она была блестящей, дольчатой, тонко-стѣнной; при вылученіи ея она разорвалась и изъ нея вылилась темная жидкость, а въ верхней части ея найденъ небольшой свертокъ крови. Ножка опухоли имѣла сходство съ яичниковой бахромкой (*fimbria ovarica*, т. е. связки). Рана зашита и зажила первымъ натяженіемъ. *М. Гинзбургъ.*

135. Dr. E. B. Cragin.—What are the Indications for a vaginal Examination? (*Americ. Journ. of obstetrics etc*, 1894, IV, p. 515). **Какія существуютъ показанія къ изслѣдованію женщинъ черезъ влагалище?**

Авторъ сдѣлалъ докладъ объ этомъ медицинскому обществу Цинцинати. Онъ разсматриваетъ отдѣльно 3 различныя эпохи жизни женщины: 1) періодъ дѣвственности, 2) полного развитія половой жизни и 3) увяданія (климактерій). Въ 1-мъ показанія къ осмотру рѣдки. Однако недостатки развитія половыхъ органовъ у дѣвушки, готовящейся выйти за мужъ, требуютъ изслѣдованія такой дѣвушки. Дизменорея, не уступающая общему лѣченію или постоянныя боли въ нижней части живота—также даютъ право осмотрѣть дѣвушку. Въ Америкѣ осмотръ въ 1-й разъ дѣлается подъ анестезіей во избѣжаніе боли и моральнаго шока.

Не приводя показаній автора къ осмотру замужнихъ женщинъ, укажу только на его совѣтъ, изслѣдовать *каждую родильницу* по истеченіи 3-хъ мѣсяцевъ послѣ родовъ, чѣмъ можно, по его мнѣнію, предупредить многія болѣзни женщинъ: смѣщенія матки и т. п. Послѣдній совѣтъ его былъ поддержанъ нѣсколькими членами общества. Въ 3-мъ періодѣ всякое разстройство въ отдѣленіяхъ: бѣли, крови даютъ поводъ къ осмотру, которымъ подѣ-часъ можно узнать раннія фазы раковаго пораженія шейки и спасти женщину.

*М. Гинзбургъ.*