

пришлось отрѣзать высвободившуюся головку съ обѣими ручками соотвѣтствующей стороны и одну изъ ручекъ противоположной стороны и затѣмъ сдѣлать поворотъ на ножку съ послѣдующимъ извлеченіемъ. Въ статьѣ авторъ даетъ очень подробное описаніе строенія тѣла этого уroda. Заслуживаетъ вниманія почти полная раздвоенность скелета туловища и внутреннихъ дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ (за исключеніемъ печени).

*Н. Какущинъ.*

142. С. Войно.—Отчетъ о хирургической дѣятельности лѣчебницы С. В. Топурія въ гор. Кутаисѣ съ 1 мая 1890 по 1 мая 1894 года. Спб. 1895.

Эта лѣчебница подаетъ помощь и гинекологическимъ больнымъ. За отчетное время въ ея амбулаторіи было сдѣлано 717 операций и въ томъ числѣ гинекологическихъ 17 (discisio coli uteri 2, excisio condylomatium 11, удаленіе полипа шейки 3 и удаленіе рака шейки 1). На 457 стационарныхъ больныхъ за отчетное время гинекологическихъ мы насчитали 46 (hymen imperforatus 1, stenosis ostii uteri 17, hypertrophia colli uteri 1, prolapsus uteri et vaginae 2, ruptura colli uteri 2, fistula vesico-vaginalis 5, polypus uteri 3, fibromyoma uteri 2, epithelioma uteri 1, carcinoma colli uteri 1, кисты яичниковъ 3, abortus 1, carcinoma mammae 3, adenoma mammae 4). Во всѣхъ этихъ случаяхъ операція была произведена 38 разъ, въ томъ числѣ чревосѣченіе, для удаленія кистъ яичниковъ, сдѣлано два раза; удалена одна большая подслизистая фиброміома; вылущена опухоль изъ грудной железы въ 5 случаяхъ.

*Н. Какущинъ.*

143. В. А. Петровъ.—Случай *hydrosalpingitis*, симулировавшій *внѣматочную беременность*. (Отд. отт. изъ Трудовъ Физико-Медиц. Общ. въ Саратовѣ, за 1894 г.).

Больная 37 лѣтъ. 3 мѣсяца назадъ со стороны половыхъ органовъ была здорова; явилась къ автору съ опухолью, равномерно эластическою, овальной формы, неболѣзненною, на 2 пальца не доходящею до пупка; справа отъ опухоли неувеличенная матка. Нагрубшія груди, выдѣляющія молозиво, окраска околососкового кружка и слизистой входа во влагалище—соотвѣтствовали обычнымъ признакамъ беременности. Черезъ нѣкоторое время отмѣчено: остановка роста опухоли, обратное развитіе грудей, нагноительная лихорадка. Это дало поводъ подозрѣвать смерть плода и начавшееся его распаденіе. Въ анамнезѣ больная указывала на дви-