

женія плода. Мѣсячныя были правильны, за исключеніемъ одного раза въ началѣ болѣзни, когда они продолжались двѣ недѣли. При чревосѣченіи оказалось, что опухоль была водяною трубы, а нагноительная лихорадка зависѣла отъ небольшого гнойника въ одномъ изъ сросченій между маткой и сальникомъ. Вслѣдствіе сросченій часть стѣнки трубы резецирована, оставшіяся мѣшокъ вшитъ въ рану брюшной стѣнки. Выздоровленіе.

*Н. Какушкинъ.*

144. В. А. Петровъ.—Медицинскій отчетъ по Саратовскому городскому родильному дому, находящемуся въ вѣдѣніи Физико-Медицинскаго Общества, за 1892 годъ. (Отд. отт. изъ „Саратовск. Санит. Обзора“, 1893 г., №№ 5—6.

Родильный домъ располагаетъ шестью штатными кроватями, но подаетъ помощь числу женщинъ большому, чѣмъ число, соответствующее помѣщенію. При домѣ имѣется повивальная школа. Въ 1892 году оказана помощь 366 женщинамъ, изъ которыхъ каждая въ среднемъ провела въ домѣ 6, 3 сутокъ. Наичаще были крестьянки, мѣщанки, солдаты, по занятіямъ прислуга и портнихи. Замужнихъ было 71,6%; незамужнихъ 28,4%. Первородящія составили 31,6%. Срочныхъ родовъ было 307. Двойней 4. Отношеніе числа мальчиковъ къ числу дѣвочекъ=1,1:1. Мертворожденные составили 5,3%. Операциі сдѣланы въ 11,3% всѣхъ случаевъ; наичаще извлеченіе за ножки и поворотъ на ножки. Разрывъ промежности произошелъ только въ 1,4% всѣхъ родовъ. Абсолютно не лихорадили 83% родильницъ. Процентъ послѣродовыхъ заболѣваній=4,9. Умерло три родильницы (0,8%): одна отъ септического перитонита, при разрывѣ матки (консервативное лѣченіе—извлеченіе плода *per vias naturales*), другая—отъ септического метрофлебита послѣ манипуляцій повитухи (поперечное положеніе), одна отъ азиатской холеры.

*Н. Какушкинъ*

145. А. Кочетковъ.—Первый случай симфизеотоміи въ елиникѣ проф. Феноменова. (Дневн. Общ. врачей при Казанск. унив., 1894 г., вып. IV).

Третьеродящая, 25 лѣтъ. Размѣры таза: *spinae* 22, *crystae* 24, *s. ext.* 17, *diag.* 9,5. Полное открытіе, головка надъ входомъ, подвижна. Рѣзко выраженное и высоко стоящее кольцо сокращенія. Хорошія схватки. Сердцебиеніе плода стало рѣже. Разрѣзъ кожи, начатый выше лона на 1,5 смт., дойдя до пахотника, уклонялся влѣво. Сосуды захватывали пинцетами; мочеиспуска-