

ходящихъ для такого лѣченія, авторъ выбралъ алюмооль, въ виду его свойства, не разрушая тканей, глубоко проникать въ толщу ихъ. Онъ примѣнялъ его въ слѣдующей смѣси: *alumnol* 2,5 + *spir. vini rectificatissimi* 25,0 + *tinct. jodi* 25,0. Введеніе этой смѣси въ полость матки дѣлалось помощью Брауновской спринцовки, иногда съ предварительнымъ расширеніемъ канала шейки. Смѣсь подогрѣвалась до 28°. Авторъ описываетъ пять случаевъ успѣшнаго примѣненія этого средства. Всѣ случаи съ острыми или обострившимися явленіями: болями, бѣлями (гонококки), выпотомъ въ около маточныхъ пространствахъ, и въ одномъ случаѣ съ опредѣленной этиологіей. Одна больная лѣчилась аббулаторно. Лѣчение продолжалось отъ одной недѣли до двухъ мѣсяцевъ. Одной больной было сдѣлано всего 24 впрыскиванія. Выводы автора: впрыскиванія алюмооля сокращаютъ теченіе остраго воспалительнаго стадія болѣзни, понижаютъ температуру тѣла и ослабляютъ боли; всасываніе выпотовъ ускоряется, явленія эндометрита ослабляются, при чемъ гнойный секретъ становится слизистымъ.

*Н. Какуткинъ.*

148. **В. А. Петровъ.**—**Случай фиброміомы.** (Отд. отт. изъ Трудовъ Физико-Медиц. Общ. въ Саратовѣ, за 1894 г.).

Крестьянка 27 лѣтъ, больна два года, жалуется на растущую опухоль. Послѣдняя, съ голову взрослога, принадлежитъ тѣлу и дну матки, вполне подвижна. Сдѣлано надвлагалищное отсѣченіе матки съ придатками съ помощью жгута. Ампутаціонный разрѣзъ пришелся на верхнюю часть полости матки. Полость прижжена 10% растворомъ карболовой кислоты. На вульву наложены три яруса швовъ: два на мышцы и одинъ на брюшину. Сѣмянные артеріи перевязаны отдѣльно. Послѣоперационное время прошло гладко.

*Н. Какуткинъ.*

149. **М. К. Гайрабетовъ.**—**Случай полного отсутствія матки.**—(Медиц. Обозр., 1895 г., № 13).

Замужняя и бездѣтная. Мѣсячныхъ ни разу не имѣла, но разъ въ мѣсяцъ обычное у нея шелушеніе надкожицы всего тѣла усиливалось, причѣмъ болѣла голова въ теченіи 3—4 дней. Половые сношенія всегда были безразличны. Наружные половые органы безъ особенныхъ отклоненій. Влагалище длиной около 1½ вершковъ. Въ сводѣ его прощупывается бугорокъ съ горошину. Внутреннихъ половыхъ органовъ нѣтъ. Больная умерла отъ бугорчатки легкихъ и при вскрытіи ея трупа прижизненное

распознаваніе подтвердилось: на мѣстѣ матки и придатковъ имѣется только вышеупомянутый бугорокъ. На мѣстѣ широкихъ связокъ замѣчаются двѣ нѣжныя брюшинныя складки.

*Н. Какушкинъ.*

150. **В. В. Типяковъ.**—Два случая кистъ круглой маточной связки.—(Медиц. Обзор., 1895 г., № 13).

*1-й случай:* крестьянка 24 л. Опухоль въ области праваго паховаго канала, съ гусиное яйцо, мягко-упругая, неуменьшавшаяся при давленіи, несдвигающаяся съ мѣста и неуправляющаяся въ паховой каналъ, проникнуть въ который пальцемъ также не удается.

*2-й случай:* еврейка 45 лѣтъ. Опухоль справа, съ куриное яйцо, съ тѣми-же свойствами, какъ и у первой больной. Опухоль растетъ. Боли въ ней временами очень сильныя. Въ обоихъ случаяхъ опухоли были отсепарованы до наружнаго отверстія паховаго канала, ножки опухолей перерѣзались ниже лигатуры. Опухоли оказались дольчатыми; каждая долька представляла полость, наполненную прозрачною жидкостью, и отдѣлялась отъ сосѣдней тонкой фиброзою перегородкой. Больныя выздоровѣли.

*Н. Какушкинъ.*