

ціонное теченіе осложнилось образованіемъ параметритического выпота. Больная выписалась здоровой. *Н. Какушкинъ.*

98. **М. Лутохинъ.**—Замѣтка о пузырьномъ заносѣ.—(Врачебныя Записки, 1897 г., № 14 и 15, стр. 240).

У второродящей 25 лѣтъ выдѣлено плодное яйцо, при осмотрѣ котораго съ помощью лупы оказалось, что это былъ пузырьный заносъ въ самомъ раннемъ періодѣ развитія, захватившій ворсины послѣда и весь chorion laeve. Авторъ изъ послѣдняго заключаетъ, что процессъ начался очень рано, еще до дифференцировки ворсистой оболочки на chorion frondosum и chorion laeve. На микроскопическихъ препаратахъ были видны прекрасно выраженные ворсины, съ значительно уменьшеннымъ количествомъ клѣтокъ основы и большимъ скопленіемъ межуточнаго вещества. Эпителий ворсинъ плохо выраженъ, эпителиальныхъ отростковъ нѣтъ. Отпадающая гиперемирована, содержитъ въ себѣ кровоизліянія и инфильтраты. Вѣроятно, измѣненія въ отпадающей явились причиной болѣзненнаго развитія яйца (endometritis decidualis?). За послѣдніе 8 лѣтъ въ акушерской клиникѣ Московскаго университета на 5500 родовъ было 4 случая заноса, изъ которыхъ только описанный представилъ поражение всего chorion laeve.

Н. Какушкинъ.

99. **А. А. Максимовъ.**—Къ вопросу объ эмболіяхъ легочной артеріи.—(Журн. Русск. Общ. Охр. Нар. Здравія. 1897 г., № 11, с. 647).

Schmorl, открывшій эмболію легочной артеріи клѣтками послѣда, опредѣлилъ это явленіе, какъ причину эклампсіи беременныхъ. *Lubarsch* считалъ эмболію слѣдствіемъ вообще разнаго рода судорогъ у беременныхъ. *Касьяновъ*, нашедшій эмболію у всѣхъ беременныхъ, предположилъ, что это явленіе физиологическое, случающееся при каждой беременности. Авторъ изслѣдовалъ легкія у 40 беременныхъ кроликовъ и убѣдился, что при нормальныхъ условіяхъ у кролика не наблюдается эмболія легочной артеріи крѣтками послѣда. Но если во время беременности произвести чрезъ брюшныя покровы сильное разминаніе матки, то оказывается, что въ развѣтвленіяхъ легочной артеріи имѣется присутствіе клѣточныхъ элементовъ послѣда. Это не клѣтки внутрисосудистаго пласмодія, выступающія въ просвѣтъ кровеносныхъ полостей въ видѣ бугровъ, а многоядерныя, гигантскія клѣтки, принадлежащія особому отдѣлу послѣда, называемому