

этой вздутой трубы найдено было 35 маленьких косточекъ, являющихся несомнѣннымъ доказательствомъ существовавшего фетального скелета. Косточки представляли собою ребра, ключицы, конечности и черепные обломки. Такимъ образомъ необходимо поставить въ тѣсную связь наступившую внезапно 13 лѣтъ тому назадъ тяжелую болѣзнь, съ трубною беременностью, остатки которой были случайно открыты благодаря оваріотоміи.

А. Розенблюмъ.

101. J. Hofbasser.—Zur Physiologie des Puerperiums.—(Monatschr. für Geburtschül. u. Gynaek. 1897. Ergänzungsheft).—**Къ физиологіи пуэрперальнаго періода.**

Авторъ описываетъ результаты его изслѣдованій надъ составомъ крови женщинъ въ періодѣ конца беременности, въ послѣродовомъ и лактаціонномъ періодахъ. Въ приведенныхъ авторомъ случаяхъ, опредѣляется число лейкоцитовъ крови въ выше-названныхъ періодахъ, при чемъ на составленныхъ кривыхъ ясно обозначено, что число лейкоцитовъ достигаетъ своего maximum'a сейчасъ же послѣ выхода плода, затѣмъ ихъ число постепенно уменьшается. При появленіи симптомовъ, сопровождающихъ наступленіе лактаціоннаго періода, какъ напр. головная боль, общее надомоганіе, легкій ознобъ и т. д., число лейкоцитовъ опять увеличивается. У одной беременной съ зѣвомъ открытымъ на 1 палецъ авторъ опредѣлилъ 9500 лейкоцитовъ, а тотчасъ послѣ родовъ число ихъ достигло до 17000, а затѣмъ число ихъ стало подходить къ нормѣ; съ наступленіемъ же лактаціоннаго періода число ихъ опять возросло до 14800. Авторъ ставитъ это увеличеніе и уменьшеніе числа лейкоцитовъ въ различныхъ періодахъ въ зависимость отъ дѣятельности матки и вліянія брюшнаго пресса, характеръ которыхъ, какъ извѣстно, бываетъ различенъ въ вышесказанныхъ періодахъ.

А. Розенблюмъ.

102. Baumgärtner jun.—Beitrag zur Technik der heissen Scheideuspülungen.—(Monatschr. für Geburtschül. Gynaek. Heft. 1897).—**Къ вопросу о technikѣ примѣненія горячихъ влагалищныхъ спринцеваній.**

Какъ извѣстно, горячія влагалищныя спринцеванія примѣняются въ гинекологической практикѣ для возбужденія маточныхъ сокращеній, остановки кровотеченій, рассасыванія старыхъ хроническихъ экссудатовъ и сращеній тазовыхъ органовъ. Эти спринцеванія, по общему мнѣнію, необходимо дѣлать водой t° 40°, ибо въ противномъ случаѣ онѣ не даютъ желаемого результата.

Но употребляя такую горячую воду во время спринцеванія, больныя нерѣдко жалуются на сильную болѣзненность, причиняемую вытекающей изъ влагалища жидкостью, на наружныхъ половыхъ органахъ, промежности и заднемъ проходѣ. Всѣ предпринятія мѣры для устраненія этой болѣзненности оканчивались болѣе или менѣе неудачей. Кромѣ разныхъ аппаратовъ для спринцеванія рекомендовали смазывать вышеназванные чувствительныя мѣста какимъ нибудь жирнымъ веществомъ, или спринцеваться, сидя въ тепловатой ваннѣ, но все это, по мнѣнію автора, не давало желаемого результата. Исходя изъ этого положенія, авторъ изобрѣлъ аппаратъ для горячихъ спринцеваній влагалища. Этотъ аппаратъ имѣетъ видъ маточнаго зеркала съ загнутымъ книзу концомъ для истеченія жидкости изъ влагалища. Это зеркало вставляется плотно на разстояніи 1 или 1½ см. во влагалище женщины, находящейся въ лежачемъ положеніи съ немного приподнятымъ тазомъ; въ это зеркало проволится маточный наконечникъ и производится спринцеваніе, причемъ вода, проникающая во влагалище стекаетъ чрезъ зеркало, не касаясь наружныхъ половыхъ органовъ и не причиняя болѣе своей высокой температурой. Зеркало четырехъ номеровъ, изъ которыхъ второй номеръ наиболѣе употребляется, готовится изъ твердаго каучука. Оно дешево, легко чистится и стерилизуется посредствомъ кипяченія, не измѣняя своей формы. По мнѣнію автора, примѣненіе этого зеркала до того просто, что даже менѣе интеллигентнымъ женщинамъ удастся спринцеваться безъ посторонней помощи, если имъ указали предварительно подходящій номеръ и способъ употребленія. Авторъ въ трехъ случаяхъ *Retroflexio fixata* при помощи своего аппарата до примѣненія массажа, дѣлалъ горячія спринцеванія водой 40°, при чемъ послѣ нѣсколькихъ спринцеваній матку удалось освободить отъ сращеній и вывести въ нормальное положеніе.

А. Розенблюмъ.

103. A. Döderlein.—*Vaginitis gonorrhoeica beifehlendem Uterus.*—(Monatsschrift für Geburtshilfe u. Gynaekol. Heft I 1897).—**Гонорройный вагинитъ при отсутствіи матки.**

Вопросъ о томъ, можетъ ли влагалище взрослыхъ быть мѣстомъ непосредственнаго зараженія гонорройнымъ ядомъ, оставался до послѣдняго времени открытымъ. Всѣ изслѣдованія въ этомъ направленіи окончились неудачей, ввиду того, что тѣло и шейка матки постоянно были находимы зараженными гонорройнымъ ядомъ, причемъ влагалище, благодаря стекающему секрету также зара-