

Sch. слышалъ своеобразные звуки, исходящіе изъ матки. Выпустивъ изъ рукъ ножку, онъ сталъ прислушиваться приложивъ ухо къ маткѣ; звуковъ онъ однако больше не слышалъ, но зато одновременно съ правильными сердечными тонами явственно ощущалъ дыхательныя движенія плода. Когда *Sch.* опять потянулъ за ножку, то онъ, равно какъ и всѣ присутствовавшіе при родахъ, опять услышали явственный крикъ ребенка, повторившійся съ промежутками нѣсколько разъ въ продолженіи 20 секундъ, причемъ при аускультации живота можно было констатировать респираторный шумъ. *Sch.* вновь выпустилъ изъ рукъ ножку и опять потянулъ за нее, но крикъ уже болѣе не повторился. Такъ какъ сердцебіеніе плода стало замедляться, то приступили къ извлеченію, которое однако удалось лишь послѣ перфорации головы тѣмъ временемъ умершаго плода. При секціи послѣдняго оказалось, что правое и среднее легкое, равно какъ желудокъ содержали въ себѣ воздухъ и при погруженіи въ воду плавали. Приведенное наблюденіе, въ которомъ крикъ и дыханіе ребенка имѣло мѣсто при наличности плацентарнаго кровообращенія, заслуживаетъ, по мнѣнію автора, еще особеннаго вниманія, поскольку оно можетъ служить доказательствомъ въ пользу теоріи *Freyer'a* о роли раздраженія кожи при наступленіи перваго дыханія.

С. Ю. Хазанъ.

154. Emanuel Wittkowsky und Veit.—Ueber Endometritis in der Gravidität. (Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXII, Hft. 1). Endometritis во время беременности.

E. два раза, у одной и той же молодой многорожавшей, наблюдалъ выкидышъ. Въ обоихъ случаяхъ decidua оказалась сильно утолщеною и пораженною, въ особенности на поверхности, мелкоклѣтчатый инфильтратомъ; но послѣ обработки ихъ по методу *Gram-Weigert'a*, между обѣими deciduae оказалась существенная разница. Въ то время какъ при выкидышѣ, произшедшемъ 2¹/₂ года тому назадъ, въ decidua обнаружены были кокки, при послѣднемъ выкидышѣ были найдены бациллы, которыя *W.* удалось даже демонстрировать въ чистой разводкѣ. Не смотря на то, что въ обоихъ случаяхъ дѣло шло о морфологически совершенно различныхъ микробахъ, *E.* склоненъ видѣть въ нихъ настоящихъ виновниковъ этого характернаго воспалительнаго процесса. *Veit*, въ клиникѣ котораго были произведены изслѣдованія *E. W.*, хотя и признаетъ, что этими изслѣдованіями вопросъ объ этиологіи endometritis gravidarum

еще далеко не исчерпанъ, высказываетъ однако предположеніе, что установленное *Ruge* дѣленіе эндометрита на *end. glandularis* и *end. interstitialis* имѣетъ основаніе и въ этиологiи этого страданія, поскольку гландулярная форма обуславливается различными механическими раздраженіями, а интерстиціальная—имѣетъ источникомъ своимъ инфекцію микробами. То обстоятельство, что въ двухъ беременностяхъ *deciduae* содержали микроорганизмы, *Veit* приводитъ почему-то въ доказательство своего ученія, что *endometritis gravidarum* имѣетъ источникомъ своимъ уже раньше существовавшее заболѣваніе эндометріа.

С. Ю. Хазанъ.

155. Н. Thomson. — *Beiträge zur Extrauterin gravidität.* (Zeitschr. f. Geb. und Gyn., Bd. XXXII, Hft. 1). **Къ казуистикѣ внѣматочной беременности.**

1) Сильно истощенная многорожавшая, у которой послѣднія регулы были 8 мѣсяцевъ тому назадъ, жалуется на боли, и въ послѣднее время на кровотеченіе. Вслѣдствіе неопредѣленнаго характера ощущаемой въ животѣ опухоли, діагнозъ колеблется между *missed labour* и *graviditas extrauterina*. Зондированіе матки, которая оказалась пустою, разрѣшаетъ сомнѣніе. Но раньше, чѣмъ послѣдовало согласіе, тѣмъ временемъ сильно лихорадившей больной, на предлагаемое оперативное вмѣшательство, черезъ небольшое отверстіе во влагалищѣ стала просачиваться вонючая окоплодная жидкость. Расширивъ это отверстіе, приступили къ извлеченію содержаемаго плоднаго мѣшка, которое окончилось не сразу, а длилось съ промежутками нѣсколько дней. Выздоровленіе.

2) 58-лѣтняя, многорожавшая рассказываетъ, что, 13 лѣтъ тому назадъ, она была беременна, но къ сроку не родила, а плодъ извлекла себѣ сама по частямъ нѣсколько времени спустя черезъ образовавшееся около пупка отверстіе, черезъ которое съ того времени постоянно выдѣляется калъ. Лапоротомія при наркозѣ эфиромъ. Разрѣзъ въ видѣ двухъ дугъ, мимо констатированныхъ около пупка двухъ фистулъ, отпрепарированіе сращеній кишекъ, съ брюшною стѣнкою, эксцизія части брюшной стѣнки, зашитіе по *Lembert*'у какъ фистулъ, такъ и нѣкоторыхъ дефектовъ, образовавшихся при операціи. Послѣоперационный періодъ почти безъ реакціи; полное выздоровленіе.

3) 26-лѣтняя многорожавшая жалуется на уже 1 1/2 мѣсяца продолжающіяся крови, которыя начались мѣсяцъ спустя послѣ прекратившихся нормальныхъ регулъ. Матка нѣсколько увели-