

VI.

Капиллярный дренажъ матки, какъ методъ лѣ- ченія послѣродовыхъ эндометритовъ *).

Врача И. Гузарчика.

(Изъ Императорскаго Клиническаго Повивальнаго Института).

(Окончаніе).

№ 74. (№ 1366).

Евдокія К., 25 лѣтъ, первородящая. Тазъ общесѣуженный плоскій. Беременность нормальная. Роды продолжались 61 часъ и окончены перфорацией. *Endometritis sub partu*. $t^0 = 38.5$, $p. = 96$. Матка промыта горячимъ борнымъ растворомъ и затампонирована. *Ruptura perinei—suturae*.

Послѣродовое состояніе.

1—2 дни. $t^0 = 36.7—37.3$, $p. = 72—84$. Черезъ 16 час. послѣ родовъ удалены тампоны.

3-й день. У. $t^0 = 37.5$, $p. = 70$; в. $t^0 = 38.5$, $p. = 77$. Выдѣленія бурья, съ запахомъ.

4-й „ У. $t^0 = 39.6$, $p. = 38$. Днемъ $t^0 = 40.2$, $p. = 102$; в. $t^0 = 40^0$, $p. = 96$. Исслѣдованіе: мочевого пузыря сильно переполненъ мочей. При вставленіи катетра замѣчается сѣуженіе мочеиспускательнаго канала (отъ со-сѣдства наложеннаго на трещину клитора шва). Рана на промежности разошлась и поверхность покрыта гнойной массой. Удалены всѣ швы. По обнаженіи влагалищной части зеркалами оказалось, что вся она превращена въ омертвѣвшую рыхлую массу грязно-сѣ-

*) См. „Журн. Акуш. и Женск. болѣз.“ за Мартъ 1898 г. стр. 140.

- раго, мѣстами чернаго цвѣта, съ очень рѣзкимъ запахомъ. Съ лѣвой стороны имѣется разрывъ, проникающій отчасти въ сводъ. Тѣло матки довольно большое, подвижное и нечувствительное; своды безболѣзненны. Выдѣленія изъ полости матки необильны, съ рѣзкимъ запахомъ. *Colpitis (cum mortificatione), Endometritis*. Сколько возможно было, шейка очищена отъ омертвѣвшихъ массъ; тампонація; $t^0 = 39.5$, $p. = 92$.
- 5-й день. У. $t^0 = 37.1$, $p. = 80$. Шейка понемногу очищается отъ омертвѣвающихъ массъ. Выдѣленія съ нѣскольکو меньшимъ запахомъ. Тампонація. Днемъ $t^0 = 40.5$, $p. = 90$; в. $t^0 = 36.7$, $p. = 80$. Удалены тампоны.
- 6-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 90$. Тампонація. Днемъ ознобъ: $t^0 = 40.1$, $p. = 120$; в. $t^0 = 39.0$, $p. = 120$. Удалены тампоны.
- 7-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 80$; в. $t^0 = 37.4$, $p. = 74$.
- 8-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 70$. Задержка въ полости матки желтыхъ гнойныхъ выдѣленій. Шейка очищается. Тампонація. $t^0 = 38.7$, $p. = 96$. Тампонація. Черезъ часъ послѣ тампонаціи—потрясающій ознобъ: $t^0 = 41.0$, $p. = 120$; немедленно удаленъ тампонъ.
- 9-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 74$. Полость матки довольно большая, сама матка мягкая. У внутренняго зѣва—препятствіе, мѣшающее содержимому выливаться наружу: *Lochiometra*. Выдѣленія жидкія; запахъ менѣй. Шейка покрыта свѣжими, кровоточивыми грануляціями. Полость матки очищена шариками. Днемъ $t^0 = 38.5$; в. $t^0 = 39.6$, $p. = 100$.
- 10-й " У. $t^0 = 36.5$, $p. = 76$. *Lochiometra*: выдѣленія бурья, съ небольшимъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 36.5$, $p. = 70$; в. $t^0 = 37.6$, $p. = 80$. Тампонація.
- 11-й " У. $t^0 = 36.5$, $p. = 60$. Тампонація; в. $t^0 = 36.7$, $p. = 60$. Удалены тампоны.
- 12-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 66$; в. $t^0 = 37.2$, $p. = 64$. Выдѣленія безъ запаха, на видъ нормальны.
- 13-й " У. $t^0 = 37.0$, $p. = 68$; в. $t^0 = 37.2$, $p. = 70$.
- 14-й " У. $t^0 = 36.2$, $p. = 72$; в. $t^0 = 36.6$, $p. = 70$.
- 15-й " $t^0 = 36.5$, $p. = 64$. Здорова.

№ 75. (№ 1394).

Анна Д., 22 лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ—6 часовъ.

Послѣродовое состояніе:

- 1—2 дни. $t^0 = 36.5—37.5$, $p. = 60—72$.
- 3-й " У. $t^0 = 37.0$, $p. = 72$; в. $t^0 = 38.2$, $p. = 82$.
- 4-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 72$; в. $t^0 = 37.8$, $p. = 76$.
- 5-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 80$; в. $t^0 = 38.1$, $p. = 84$. Небольшая чувствительность матки.
- 6-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 74$; в. $t^0 = 38.5$, $p. = 84$.

- 7-й день. У. $t^0 = 38.1$, р. = 98. Изслѣдованіе зеркалами: шейка вялая, свободно пропускаетъ объемистый шарикъ; шарикъ смачивается темнокоричневою жидкостью, съ рѣзкимъ непріятнымъ запахомъ, *Endometritis*. Тампонація. В. $t^0 = 38.5$, р. = 80. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 39.6$, р. = 96. Въ маткѣ задержка выдѣленій, съ сильнымъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 41^0$, р. = 120 (ознобъ). В. $t^0 = 40.7$, р. = 120. Матка маленькая, но дряблая, въ нормальномъ положеніи. Своды, особенно правый, болѣзненны. Тампоны пропитаны кровянистою жидкостью, съ небольшимъ запахомъ. Тампонація; $t^0 = 38.2-36.5$, р. = 110. Въ 5 ч. у. — ознобъ: $t^0 = 40.5$, р. = 120. Тогда-же вынуть тампонъ.
- 9-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 112. Выдѣленія буроватыя, съ небольшимъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 37^0$, р. = 110; веч. $t^0 = 39.3$, р. = 90. Тампонація. $t^0 = 39.1$.
- 10-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 80. Тампонація. Въ 5 ч. веч. ознобъ: $t^0 = 40.3$, р. = 120. В. $t^0 = 40.2$, р. 110. Матка крайне дряблая, кровоточивая. Тампонація. $t^0 = 39.9$, р. = 88.
- 11-й " У. $t^0 = 39.2$, р. = 100. (Ночью былъ ознобъ). Изслѣдованіе: матка въ антеверси, крайне дряблая, немного чувствительная. Лѣвый сводъ свободенъ; въ правомъ прощупывается небольшая, величиною въ грецкій орѣхъ, опухоль, немного чувствительная при давленіи и мало подвижная. Въ полости матки задержка бурыхъ выдѣленій, съ небольшимъ запахомъ. Тампонація. Веч. $t^0 = 38.8$, р. = 100. Удалены тампоны.
- 12-й " У. $t^0 = 39.1$, р. = 70. Задержка въ полости матки выдѣленій, съ небольшимъ запахомъ. Вычищена полость шариками. Веч. $t^0 = 39.9$, р. = 108.
- 13-й " У. $t^0 = 39.3$, р. = 90. Матка дряблая, не уменьшается. Съ правой стороны прощупывается небольшая опухоль, немного бугристая, мало подвижная, немного чувствительная. Съ лѣвой стороны сегодня впервые констатируется небольшой утолщенный участокъ въ широкой связкѣ немного чувствительный. *Parametritis incip. s. Lochiometra*: изъ полости вылилось довольно большое количество бураго съ запахомъ секрета. Тампонація. $t^0 = 37.9-37.4$, р. = 80; в. $t^0 = 38.5$, р. = 90. Тампонація.
- 14-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 74. Удалены тампоны. При вытираніи полости матки шариками, оттуда вышелъ довольно большой кусокъ послѣда. *Retentio p. placentae*. Опухоль съ правой стороны меньше. Чувствительность и напряженіе въ лѣвомъ сводѣ тоже меньше. Тампонація. В. $t^0 = 37.7$, р. = 90. Тампонація.
- 15-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 88. Удалены тампоны. Выдѣленій мало; запаха нѣтъ; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 74.

- 16-й день. У. $t^0 = 37.7$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 72. Матка плотная, маленькая. Чувствительность въ сводахъ значительно меньше.
- 17-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 76.
- 18-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 62; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 70. Чувствительности нигдѣ нѣтъ.
- 19-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 72; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 64.
- 20-й " $t^0 = 36.7$, р. = 68. Здорова.

Въ данномъ случаѣ болѣзнь не поддавалась лѣченію тампонаціей до тѣхъ поръ пока въ полости матки оставался кусокъ послѣда. Съ 14 дня, когда этотъ кусокъ вышелъ, болѣзнь быстро пошла на улучшение. Изъ трехъ бывшихъ ознобовъ одинъ (8-й день) наступилъ вскорѣ послѣ тампонаціи, остальные два наступили спустя 9 часовъ (въ ночь на 9 день) и 6 часовъ (10 день) послѣ тампонаціи.

№ 76. (№ 1397).

Ирина К., 23 лѣтъ, первородящая. Въ послѣднія двѣ недѣли беременности—неукротимая рвота. Общесъуженный плоскій рахитическій тазъ, conj. diag. 8 cm. Роды преждевременные. Неправильное членорасположеніе плода: предлежаніе головки и ножки. Плодъ мацерированный, издававший рѣзкій непріятный запахъ. Вычлененіе ножки, перфорация головки и извлеченіе (трудное). Матка промыта горячимъ борнымъ растворомъ. Продолжительность родовъ 31 часъ.

Послѣродовое теченіе.

- 1-й день. У. $t^0 = 35.2$, р. = 100; веч. $t^0 = 35.6$, р. = 110. Матка плотная, шарообразная; выдѣленія содержатъ много крови и съ запахомъ. Безъ катетра не можетъ мочиться. Веч. очень слабый пульсъ; дыханіе частое и поверхностное; foetor ex ore. Возбуждающія, грѣлки, t-ra Moschi подъ кожу.
- 2-й " У. $t^0 = 35.4$, р. = 72. Общее состояніе относительно сносное: больная разговариваетъ, сама мѣняетъ положеніе въ постели, сама мочится. Языкъ слегка обложенъ; животъ впалый, нечувствительный; матка шарообразная, плотная. Низъ живота болѣзненный. Отдѣленія съ очень рѣзкимъ запахомъ. Слизистая входа покрыта гангренизирующими остатками. Пульсъ малый и частый. Спринцованія борнымъ и возбуждающія. Веч. $t^0 = 36.4$, р. = 98.
- 3-й " У. $t^0 = 34.4$, р. = 90 (слабый). Больная ѣстъ и пьетъ. Запахъ изо рта меньшій. Животъ нѣсколько вздутъ. Матка большая, плотная, нечувствительная. Выдѣленія съ рѣзкимъ запахомъ. Входъ во влагалище покрытъ гангренознымъ чернаго цвѣта налетомъ. Веч. $t^0 = 38.6$, р. = 100.
- 4-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 80. Изслѣдованіе зеркалами: вся влагалищная часть шейки до сводовъ разможжена и

гангренифицируетъ. Передняя и задняя стѣнки влагалища сѣро-аспиднаго цвѣта; на поверхности—поверхностныя и глубокія ссадины. Изъ влагалища выдѣляются клочьями куски омертвѣвшей ткани шейки и рукава; кое-гдѣ замѣтны грануляціи, легко кровоточащія. Запахъ крайне рѣзкій. Матка плотная; изъ полости ея ничего не выдавливается: *Colpitis gangraenosa. Gangraena cervicis*. По сколько возможно было—удалены омертвѣвшіе участки, очищены и присыпаны іодоформомъ; влагалище затампонировано іодоформной марлей на 3 часа. Днемъ $t^0 = 40^0$, $p. = 100$; веч. $t^0 = 39^0$, $p. = 100$.

- 5-й день. У. $t^0 = 38.5$, $p. = 94$. Влагалище и шейка нѣсколько очищаются. Изъ полости матки выдѣленія бурья, съ очень рѣзкимъ запахомъ: *Endometritis*. Тампонація матки и влагалища. Веч. $t^0 = 39.2$, $p. = 100$. Тампонація. $t^0 = 38.9$, $p. = 90$.
- 6-й " У. $t^0 = 38.2$, $p. = 96$. Тампонація. Веч. $t^0 = 39^0$, $p. = 100$. Тампонація.
- 7-й " У. $t^0 = 38.1$, $p. = 80$. Тампонація. Веч. $t^0 = 38^0 - 38.7$, $p. = 90$. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 37.9$, $p. = 72$; днемъ $t^0 = 38.9$, $p. = 90$; веч. $t^0 = 38.6$, $p. = 100$. Шейка и рукавъ очистились отъ гангренозныхъ массъ. Выдѣленія изъ матки бурья, съ небольшимъ запахомъ. Тампонація.
- 9-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 82$. Тампонація. Веч. $t^0 = 37.8$, $p. = 96$. Тампонація.
- 10-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 74$. Тампонація. Веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 80$. Тампонація.
- 11-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 82$. Удалены тампоны. Запаха не замѣтно. Спринцованія. Веч. $t^0 = 37.3$, $p. = 80$.
- 12-й " У. $t^0 = 37.1$, $p. = 60$; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 72$.
- 13-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 78$; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 70$.
- 14-й " $t^0 = 36.7$, $p. = 74$. Здорова.

№ 77. (№ 1399).

Марія И., 32-хъ лѣтъ, второродящая. Первые роды трудные; послѣ нихъ осталась *fistula vesico-vaginalis*. Течение настоящей беременности нормальное. Во время родовъ плодъ выжать по *Kristeller*'у. Ручное отдѣленіе послѣда. Продолжительность родовъ = 13 часовъ.

Послѣродовое теченіе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.6$, $p. = 90$; веч. $t^0 = 38.5$, $p. = 84$.
- 2-й " У. $t^0 = 38.9$, $p. = 100$; веч. $t^0 = 39.2$, $p. = 110$. Исслѣдованіе: старый разрывъ промежности до сфинктера задняго прохода; много рубцовой ткани. Старая пузырно-влагалищная фистула, открывающаяся на передней стѣнкѣ рукава на 3 см. ниже передняго

- свода отверстиемъ, пропускающимъ кончикъ мизинца. Шейка матки представляется травматически поврежденной со многими небольшими кровоподтеками и ссадинами. Передній сводъ какъ-бы отслоенъ отъ передней поверхности шейки; трещина эта покрыта кровяными сгустками. Цервикальный каналъ покрытъ сѣро-зелеными массами, легко стирающимся, особенно поверхностный ихъ слой. Выдѣленія изъ полости съ запахомъ. *Endometritis. Ruptura fornicis anterioris.* Тампонація. Ночью ознобъ: $t^0 = 40.4$, $p. = 118$.
- 3-й день. У. $t^0 = 36.9$, $p. = 86$. Вынуты тампоны: они пропитаны мочою и выдѣленіями. Полость матки вычищена шариками. Днемъ $t^0 = 40.7$, $p. = 120$; в. $t^0 = 38.6$, $p. = 94$.
- 4-й " У. $t^0 = 39.1$, $p. = 90$. Выдѣленія изъ полости бурья, съ запахомъ. Тампонація. Днемъ ознобъ: $t^0 = 40.4$, $p. = 98$; веч. $t^0 = 38.1$, $p. = 90$. Вынуты тампоны; они пропитаны главнымъ образомъ мочою.
- 5-й " У. $t^0 = 38.5$, $p. = 90$; веч. $t^0 = 39.4$, $p. = 102$. Чувствительности нигдѣ нѣтъ. Матка плотная, подвижная. Все время выдѣляется непроизвольно моча. Разрывъ въ сводѣ рубцуется. Полость матки вычищена шариками.
- 6-й " У. $t^0 = 36.0$, $p. = 68$; веч. $t^0 = 38.5$, $p. = 80$. Вычищена полость шариками.
- 7-й " У. $t^0 = 37.6$, $p. = 86$; веч. $t^0 = 38.2$, $p. = 88$. Веч. запахъ выдѣленій почти нормальный. Матка вычищена шариками.
- 8-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 72$. *Lochiometra*: выдѣленія бурья, съ запахомъ и съ хлопьями тканей. Вычищена полость матки шариками; веч.: $t^0 = 37.7$, $p. = 80$.
- 9-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 68$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; в. $t^0 = 37.4$, $p. = 78$.
- 10-й " У. $t^0 = 36.5$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 37.1$, $p. = 82$.
- 11-й " $t^0 = 36.7$, $p. = 70$. Здорова. Явленія недержанія мочи *in statu quo ante partum*. Больной предложено явиться черезъ 6 недѣль въ Институтъ для зашиванія свища.

№ 78. (№ 1412).

Анна О., 38-и лѣтъ, 8-ые роды. Прежнія беременности и роды нормальны. Теченіе настоящей беременности удовлетворительное. *Placenta praevia centralis*. Кровотеченіе. При зѣвѣ открытомъ на 2 пальца поворотъ и извлеченіе. Продолжительность родовъ = 5 часовъ.

Послѣродовое теченіе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.3$, $p. = 100$; веч. $t^0 = 37.0$, $p. = 100$. Болѣзненность матки и сводовъ.
- 2-й " Ночью знобило. У. $t^0 = 37.4$, $p. = 100$. Изслѣдованіе: шейка покрыта разрыхленными кусками омертвѣвшей

ткани. На передней губѣ глубокая поперечная трещина, дѣлящая губу на два лоскута, изъ которыхъ внутренний или задній, образующій стѣнку цервикальнаго канала, меньше передняго или наружнаго. Тѣло матки довольно большое, подвижное, въ нормальномъ положеніи. Правый сводъ болѣзненъ. Выдѣленія съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis. Fissura cervicis.* Тампонація; веч. $t^0 = 38.6$, $p. = 90$. Изъ полости матки выдѣленія въ небольшомъ количествѣ, съ кусочками похожими на вымоченное мясо, съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонація.

- 3-й день. У. $t^0 = 37.4$, $p. = 80$. Тампонація; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 98$. Тампонація. $t^0 = 37.3$.
 4-й " У. $t^0 = 38^0$, $p. = 68$. Тампонація; веч. $t^0 = 38.3$, $p. = 82$. Удалены тампоны.
 5-й " У. $t^0 = 37.6$, $p. = 90$; веч. $t^0 = 37.3$, $p. = 90$. Выдѣленій изъ полости матки меньше, почти безъ запаха, но содержатъ еще хлопья. Вычищена полость матки шариками. Чувствительности нигдѣ нѣтъ.
 6-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 80$. Выдѣленій меньше, безъ запаха, съ небольшими хлопьями. Вычищена полость шариками; веч. $t^0 = 37.5$, $p. = 86$.
 7-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 74$. Lochiometra: выдѣленія водянисто-желтоватыя, безъ запаха. Тампонація; веч. $t^0 = 37.2$, $p. = 72$. Тампонація.
 8-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 80$. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 37.4$, $p. = 80$. Задержки выдѣленій въ полости матки нѣтъ. Состояніе вполне хорошее.
 9-й " $t^0 = 37.2$, $p. = 68$. Здорова.

№ 79. ~~78~~ (№ 1423).

Елена Т., 33-хъ лѣтъ, первородящая. Во время беременности лежала въ Александровской Городской больницѣ; страдала общимъ отекомъ и кашлемъ. Время отъ времени появлялись кровотечения изъ половыхъ органовъ. Въ послѣдній день передъ поступленіемъ въ Институтъ крови изъ половыхъ органовъ шли въ большомъ количествѣ и сгустками. Поступила въ Институтъ очень малокровная, съ кровотеченіемъ: Placenta praevia centralis; зѣвъ открытъ на 1 палецъ. Тампонація шейки и рукава. При зѣвѣ, открытомъ на 3 пальца, поворотъ и извлеченіе. Послѣ родовъ—атоническое кровотеченіе: тампонація матки. Продолжительность родовъ=32 часа.

Послѣродовое теченіе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.7$, $p. = 140$ (очень слабый); веч. $t^0 = 37.8$, $p. = 70$? Возбуждающія. Удалены тампоны.
 2-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 72$; веч. $t^0 = 38.4$, $p. = 100$.
 3-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 80$; веч. ознобъ: $t^0 = 39.7$, $p. = 96$.
 4-й " У. $t^0 = 39.1$, $p. = 86$; веч. $t^0 = 39.5$, $p. = 102$. Изслѣдованіе: матка вялая, средней величины, подвижная,

- немного чувствительная, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды нечувствительны. Шейка довольно большая, изъязвленная. Изъ полости матки выдѣленія бурья, съ невыносимымъ запахомъ.
- Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 39.4$, $p. = 100$.
- 5-й день. У. $t^0 = 37.8$, $p. = 88$. Сильное малокровіе и кашель. Тампонація; веч. $t^0 = 39^0$, $p. = 116$. Удалены тампоны.
- 6-й " У. $t^0 = 37.4$, $p. = 75$. *Lochiometra*: выдѣленія грязно-зеленныя съ очень сильнымъ запахомъ. Тампонація; веч. $t^0 = 38.2$, $p. = 80$. Удалены тампоны.
- 7-й " У. $t^0 = 37.9$, $p. = 84$. Выдѣленія гноевидныя, съ меньшимъ запахомъ. Тампонація; веч. $t^0 = 38.1$, $p. = 90$. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 37.6$, $p. = 76$. Выдѣленія съ меньшимъ запахомъ. Тампонація; веч. $t^0 = 37.5$, $p. = 82$. Тампонація.
- 9-й " У. $t^0 = 37.4$, $p. = 72$. Удалены тампоны. Запаха не замѣтно. Больная чувствуетъ себя крѣпче. Кашель, хрипы; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 80$. Сиринцованія борнымъ растворомъ.
- 10-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 86$.
- 11-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 78$; веч. $t^0 = 39.8$, $p. = 100$.
- 12-й " У. $t^0 = 39.3$, $p. = 100$. Матка небольшая, довольно плотная. Полость немного объемиста, выдѣленія почти слизистыя, необильны; запаха рѣзкаго незамѣтно. Своды свободны. Тампонація; t^0 веч.: 39.9 , $p. = 100$. Удалены тампоны.
- 13-й " У. $t^0 = 29.6$, $p. = 100$. Со стороны половой сферы особенныхъ уклоненій отъ нормы констатировать не удастся: матка небольшая, довольно плотная, нечувствительная, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Задній и боковые своды нечувствительны. Выдѣленій мало, слизистыя, безъ запаха. Границы сердечной тупости нѣсколько расширены. Тоны сердца глухи. Пульсъ учащенъ и немного слабъ, 120 въ минуту. Дыханіе учащено, слышны хрипы. Аускультация обнаруживаетъ въ верхушкахъ легкихъ жесткое дыханіе съ удлинненнымъ выдохомъ, мѣстами дыханіе прерывистое. Распространенные сухіе и влажные хрипы. Языкъ сильно обложенъ и немного сухъ. Общая слабость. Отеки половыхъ губъ и ногъ. *Pneumonia chronica*; в. $t^0 = 40^0$, $p. = 100$. Въ мочѣ бѣлку нѣтъ.
- 14-й " У. $t^0 = 39.3$, $p. = 120$; веч. $t^0 = 39.9$, $p. = 120$.
- 15-й " У. $t^0 = 38.8$, $p. = 120$; веч. $t^0 = 39.1$, $p. = 120$. Со стороны половой сферы уклоненій отъ нормы не замѣчается: матка довольно плотная, нечувствительная, подвижная, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія слизистыя, безъ запаха.
- 16-й " Переведена въ Александровскую городскую больницу, какъ больная, страдающая воспаленіемъ легкихъ.

№ 80. (№ 1432).

Целагея Л., 28-и лѣтъ, 3-ьи роды. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 12 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. $t^0 = 36.2-37.1$, $p. = 67-70$.
 4-й " $U. t^0 = 37.6$, $p. = 68$; веч. ознобъ: $t^0 = 39.8$, $p. = 102$.
 5-й " $U. t^0 = 38^0$, $p. = 90$; веч. $t^0 = 37.9$, $p. = 94$. Выдѣленія кровянисто-слизистыя, мутныя, съ замѣтнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація.
 6-й " $U. t^0 = 37^0$, $p. = 80$. Удалены тампоны. Спринцованія; веч. $t^0 = 38.1$, $p. = 100$.
 7-й " $U. t^0 = 37.5$, $p. = 70$. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Тампонація; в. $t^0 = 38.3$, $p. = 90$. Удалены тампоны.
 8-й " $U. t^0 = 37.9$, $p. = 74$. Тампонація; $t^0 = 39.1$, $p. = 100$; веч. $t^0 = 38.8$, $p. = 100$. Удалены тампоны.
 9-й " $U. t^0 = 39.3$, $p. = 110$. *Lochiometra*: выдѣленія бурныя, съ запахомъ. Тампонація; веч. $t^0 = 38.4$, $p. = 96$. Тампонація.
 10-й " $U. t^0 = 37.3$, $p. = 68$. Удалены тампоны. Запаха не замѣтно; веч. $t^0 = 37.1$, $p. = 88$.
 11-й " $U. t^0 = 36.8$, $p. = 70$. Задержки выдѣленій въ маткѣ нѣтъ; в. $t^0 = 37^0$, $p. = 70$.
 12-й " $U. t^0 = 36.8$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 37.4$, $p. = 70$.
 13-й " $t^0 = 36.8$, $p. = 60$. Здорова.

№ 81. (№ 1435).

Дарья П., 19-и лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ = 19 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—5 дни. $t^0 = 37^0-37.3$, $p. = 60-86$.
 6-й " $U. t^0 = 37.7$, $p. = 84$; веч. $t^0 = 38.2$, $p. = 98$.
 7-й " $U. t^0 = 37.8$, $p. = 72$; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 78$.
 8-й " $U. t^0 = 36.7$, $p. = 66$; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 80$.
 9-й " $U. t^0 = 38.3$, $p. = 88$; веч. $t^0 = 37.9$, $p. = 92$.
 10-й " $U. t^0 = 37.8$, $p. = 70$. Изслѣдованіе: влагалищная часть матки мала, хорошо сформирована; на ней вокругъ наружнаго зѣва нѣсколько трещинъ. Тѣло матки небольшое, немного шарообразное, не совсѣмъ плотное, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія, взятые изъ полости матки, довольно густыя, мутны, темнокраснаго цвѣта, съ большой примѣсью слизи, съ небольшимъ запахомъ. Замѣтна задержка выдѣленій въ полости. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 37.3$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 38.4$, $p. = 90$. Тампонація.
 11-й " $U. t^0 = 37.3$, $p. = 94$. Вынуты тампоны; веч. $t^0 = 37.9$, $p. = 96$. Тампонація.

- 12-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 84. Тампонація; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 70. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ.
 13-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 62; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 70. Здорова.

№ 82. (№ 1451).

Екатерина С., 25 лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 17 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—6 дни. $t^0 = 36.2—37.2$, р. = 56—80. Послѣ вставанія съ постели зачихорадила.
 7-й " У. $t^0 = 39.3$, р. = 100; веч. $t^0 = 39.6$, р. = 100. Исслѣдованіе: жаръ, кожа горяча и суха. Шейка матки довольно большая, вялая, кровоточивая. Каналъ легко проходимъ для пальца. Полость матки объемиста; выдѣленія мутны, безъ рѣзкаго запаха. Тѣло матки средней величины, подвижно, нечувствительно. Правый и задній своды свободны; въ лѣвомъ—небольшая чувствительность. *Endometritis*. Тампонація.
 8-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 56. Тампонація; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 58. Тампонація; $t^0 = 36.8$, р. = 60.
 9-й " У. $t^0 = 38.4$, р. = 72. Тампонація; $t^0 = 38^0$, р. = 78; веч. $t^0 = 40.1$, р. = 100. Удалены тампоны.
 10-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 66. Выдѣленія желтоваты. Чувствительности въ сводахъ нѣтъ. Тампонація; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 64. Тампонація.
 11-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 56. Тампонація; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 60. Удалены тампоны. Ночью $t^0 = 39.2$, р. = 96.
 12-й " У. $t^0 = 38.3$, р. = 80; веч. $t^0 = 39.3$, р. = 80.
 13-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 64. Въ маткѣ небольшая задержка выдѣленій. Запаха незамѣтно. Матка маленькая, плотная, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Вычищена полость матки шариками; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 60.
 14-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 60; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 68. Выдѣленія желтоваты. Матка вычищена шариками.
 15-й " У. $t^0 = 36.2$, р. = 56; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 72. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 16-й " $t^0 = 36.6$, р. = 70. Здорова.

№ 83. (№ 1459).

Пелагея К., 20 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 24 часа.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. $t^0 = 37^0—37.2$, р. = 64—100.
 3-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 100. Исслѣдованіе: наружныя половыя части, входъ во влагалище и отчасти стѣнки рукава усѣяны острыми кондиломами. Шейка матки большая, дряблая, очень кровоточивая, покрытая грязнымъ, легко стирающимся налетомъ. По обѣимъ сто-

- ронамъ наружнаго зѣва довольно большіе надрывы. Тѣло матки средней величины, довольно плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости матки грязныя съ кусочками измѣненной ткани, съ крайне рѣзкимъ запахомъ. *Colpitis et Endometritis*. (Condylomata acuminata). Тампонація; веч. $t^0 = 39.4$. Удалены тампоны.
- 4-й день. У. $t^0 = 38^0$, р. = 94. Тампонація; веч. $t^0 = 38.3$, р. = 92.
- 5-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Перемѣнены тампоны; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 96. Тампонація.
- 6-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 90. Тампонація; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 90. Тампонація.
- 7-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 92. Тампонація; веч. $t^0 = 36.4$, р. = 82. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ.
- 8-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 74. Выдѣленія безъ запаха. Состояніе хорошее; веч. $t^0 = 36.9$, р. = 68.
- 9-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.5$, р. = 62.
- 10-й " $t^0 = 36.6$, р. = 72. Здорова.

№ 84. (№ 1468).

Пелагея С., 33-хъ лѣтъ, V-рага. Прежнія беременности и роды нормальны. Настоящая беременность оборвалась на VI-мъ мѣсяцѣ и кончилась выкидышемъ. Sub partu $t^0 = 39.6$, р. = 120 съ ознобомъ. Extractio foetus. Промываніе матки карболовымъ растворомъ. Продолжительность родовъ 12 ч.

Послѣродовое теченіе.

- 1—6 дни. $t^0 = 36.4-37.6$, р. = 70—108.
- 7-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 96. Выдѣленій мало, кровянисто-слизистыя, съ запахомъ. Матка промыта растворомъ сулемы, затѣмъ борнымъ растворомъ; в. $t^0 = 37.5$, р. = 72.
- 8-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 66. Изслѣдованіе: шейка матки хорошо сформирована; тѣло небольшое, средней плотности, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды безболѣзненны. Въ цервикальномъ каналѣ близко къ наружному зѣву торчатъ куски омертвѣвшей ткани, непосредственно связанные съ внутренней поверхностью матки; по удаленіи ихъ корнцангомъ замѣчалось небольшое кровотеченіе. Такіе-же кусочки выходили и изъ полости матки при вытираніи ея шариками. Запахъ выдѣленій крайне рѣзкій, бураго цвѣта, жидкія. *Edometritis*. Тампонація; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 64. Тампонація.
- 9-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 70. Тампонація; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 62. Тампонація. Запахъ значительно меньшій.
- 10-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 70.

- 11-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 64. Выдѣлений мало, слизистыя и безъ запаха; веч. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
 12-й „ $t^0 = 36.4$, р. = 62. Здорова.

№ 85. (№ 1477).

Анна Д., 18 лѣтъ, первородящая. Во время беременности обильныя бѣли. Тазъ слегка общесъуженный. Роды продолжительные = 54 часа.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.8—37.8$, р. = 72—80.
 5-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 75; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 76.
 6-й „ У. $t^0 = 36.6$, р. = 72; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 66. Выдѣленія съ запахомъ. Спринцовать.
 7-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 80; веч. $t^0 = 38.3$, р. = 88.
 8-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 70. Изслѣдованіе: влагалище усѣяно зернистыми образованіями; шейка матки вялая, съ двумя надрывами по краямъ. Каналь пропускаетъ палецъ. Тѣло матки немного велико, средней плотности, мало подвижно, нечувствительно, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны; въ правомъ сводѣ небольшая чувствительность. Выдѣленія изъ полости матки зеленовато-желтыя, густыя, съ замѣтно выраженнымъ запахомъ. *Colpitis granulosa et Endometritis*. Тампонація; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 86. Послѣ тщательнаго вычищенія влагалища, въ полость матки вложенъ тампонъ.
 9-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 90. Тампонація; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 74. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ.
 10-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 60; веч. $t^0 = 36.5$, р. = 70.
 11-й „ $t^0 = 36.6$, р. = 62. Здорова.

№ 86. (№ 1479).

Анна В., 19-и лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 14 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.4—37.7$, р. = 76—94.
 5-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 98; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 94.
 6-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 84; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 128.
 7-й „ У. $t^0 = 38.3$, р. = 98; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 100. Изслѣдованіе: шейка матки плохо сформирована, вяла, съ довольно большими трещинами по обѣимъ сторонамъ у наружнаго зѣва. Каналь легко пропускаетъ палецъ. Тѣло матки средней величины и плотности, немного чувствительное у праваго рога, лежитъ нормально наклоненнымъ впередъ. Своды свободны. Выдѣленія буроваты, съ ясно замѣтнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація.

- 8-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 72; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 80. Удалены тампоны: они насквозь пропитаны, и выдѣленія тоже на простынѣ.
- 9-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 80. Матка немного болѣзненна, велика. Въ полости задержка выдѣлений, буро-желтоватыхъ, съ запахомъ. Тампонація; веч. $t^0 = 37.8$, р. = 86. Тампонація.
- 10-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 68. Удалены тампоны. Запаха не замѣтно; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 64.
- 11-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 62; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 70.
- 12-й " $t^0 = 36.8$, р. = 70. Здорова.

№ 87. (№ 1481).

Надежда У., 34-хъ лѣтъ, 12-ые роды. Во время родовъ выдѣленія слизисто-гнойныя. Продолжительность родовъ = 29 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. $t^0 = 36.8—37.6$, р. = 72—90.
- 4-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 100.
- 5-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 80; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 100. Исследование: шейка матки нѣсколько плотна, каналъ свободно пропускаетъ палецъ. Полость матки велика; въ верхнелѣвомъ углу на задней стѣнкѣ имѣется наростъ, который, по отдѣленіи отъ стѣнки, оказался состоявшимъ изъ старой плотной измѣненной ткани (кусочъ послѣда?), къ нему пристали плотные фибринозные сгустки. Запахъ очень сильный. *Endometritis*. Послѣ отдѣленія пальцемъ и извлеченія этихъ кусочковъ измѣненной ткани, въ полость матки вложенъ тампонъ.
- 6-й " У. $t^0 = 39.4$, р. = 120. Тампонація; веч. $t^0 = 38.8$, р. = 100. Тампонація.
- 7-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 80. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 78. Небольшая задержка выдѣлений въ полости матки, цвѣта желтоватаго, съ небольшимъ запахомъ. Вычищена полость шариками; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 70.
- 9-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 68. Небольшой запахъ выдѣлений и ихъ задержка въ полости матки. Тампонація; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Удалены тампоны.
- 10-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 74. Выдѣленія довольно густыя, буроватыя. Тампонація; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 78. Тампонація.
- 11-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 72. Тампонація; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 76. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ.
- 12-й " У. $t^0 = 36.8$; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 13-й " $t^0 = 36.9$, р. = 60. Здорова.

№ 88. (№ 1495).

Пелагея Е., 37-и лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Продолжительность родовъ = 9 часовъ. Ruptura perinei—suturae. Послѣродовое теченіе.

- 1—2 дни. $t^0 = 36.8-37.7$, $p. = 58-74$.
 3-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 62$; веч. $t^0 39.2$, $p. = 88$.
 4-й " У. $t^0 = 37.4$, $p. = 64$. Сняты швы; промежность разошлась; веч. $t^0 = 39.9$, $p. = 100$.
 5-й " У. $t^0 = 38.6$, $p. = 88$. Изслѣдованіе: промежность отечна и чувствительна. Разрывъ не сросся; поверхность его покрыта разможженными омертвѣвающими хлопьями. Шейка дряблая, кровоточивая, со многими довольно большими трещинами вокругъ наружнаго зѣва. Тѣло матки большое, дряблое, въ ретроверсії. Выдѣленія кровянистыя, съ запахомъ. *Endometritis. Ulcera puerperalia*. Поверхность язвы пообчищена, прижжена t-ra jodi; полость матки вычищена ватными шариками; веч. $t^0 = 37.1$, $p. = 70$. Тампонація.
 6-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 64$. Тампонація; веч. $t^0 = 37.5$, $p. = 60$. Тампонація.
 7-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 76$. Тампонація; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 78$. Удалены тампоны. Поверхность разрыва значительно очистилась и покрыта свѣжими грануляціями.
 8-й " У. $t^0 = 36.2$, $p. = 62$; веч. $t^0 = 37.2$, $p. = 66$.
 9-й " У. $t^0 = 36.5$, $p. = 86$. Выдѣленія изъ полости матки бурья, съ запахомъ. Тампонація; веч. $t^0 = 37.4$, $p. = 68$. Тампонація.
 10-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 70$. Тампонація; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 62$. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ.
 11-й " У. $t^0 = 36.2$, $p. = 60$; веч. $t^0 = 36.4$, $p. = 64$.
 12-й " У. $t^0 = 36.4$, $p. = 60$; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 64$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 13-й " У. $t^0 = 36.5$, $p. = 62$; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 72$.
 14-й " $t^0 = 36.7$, $p. = 70$. Здорова.

№ 89. (№ 1520).

Прасковья Н., 25-и лѣтъ, второродящая. Беременность нормальная. Во время родовъ $t^0 = 38.9$, $p. = 78$. Выдѣленія жидкія, желтоватыя, съ небольшимъ запахомъ: *Endometritis sub partu*. Послѣ родовъ матка промыта карболовымъ растворомъ и затампонирована. Продолжительность родовъ = 15 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. $t^0 = 36.7-37.8$, $p. = 62-76$. Черезъ сутки послѣ родовъ удалены тампоны.
 3-й " У. $t^0 = 37.8$, $p. = 90$. Выдѣленія съ запахомъ. Тампонація; $t^0 = 37^0$, $p. = 82$; веч. $t^0 = 37.5$, $p. = 82$. Вынуты тампоны и матка промыта борнымъ растворомъ. $t^0 = 39^0$, $p. = 90$ (ознобъ).

- 4-й день. У. $t^0 = 38.5$, р. = 86. Изслѣдованіе: шейка большая, дряблая, не сформирована; каналъ свободно пропускаетъ большой шарикъ. Тѣло матки большое, средней плотности, подвижное, нечувствительное. Своды безболѣзненны. Выдѣленія довольно обильны, мутны, съ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; веч. $t^0 = 39.7$, р. = 82. Тампонація.
- 5-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 66. Тампонація; веч. $t^0 = 38.4$, р. = 56. Тампонація.
- 6-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 72. Тампонація; веч. $t^0 = 37.8$, р. = 72. Тампонація. Запаха почти нѣтъ.
- 7-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 68. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 72.
- 8-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.9$, р. = 64. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 9-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 64. Здорова.

№ 90. (№ 1528).

Евдокія Б., 35-и лѣтъ, шестые роды. Предыдущіе роды нормальны. При настоящихъ родахъ: *Endometritis*. $t^0 = 38.3$, р. = 116. Ножное предлежаніе плода. *Extractio foetus*. Выжиманіе послѣда по Credé. Матка промыта 2% карболовымъ растворомъ. Продолжительность родовъ 10 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. У. $t^0 = 36.2—37.6$, р. = 72—84. Сильное малокровіе.
- 3-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 86. Днемъ $t^0 = 38.5$, р. = 100. Выдѣленія съ запахомъ. Тампонація; веч. по удаленіи тампоновъ изслѣдована: $t^0 = 37.2$, р. = 80. Удаленные тампоны прочитаны грязными выдѣленіями и съ запахомъ. Влагалище дрябло; старый разрывъ задней стѣнки рукава съ лѣвой стороны. Шейка не сформирована; тѣло большое, средней плотности, въ *retroversi*и, нечувствительное. Своды свободны. Въ полости кровяные сгустки и выдѣленія съ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація.
- 4-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 74. При вычищеніи полости матки шариками, оттуда вышелъ кусокъ послѣда величиною въ 5×6 см. (по поверхности), съ крайне рѣзкимъ запахомъ. *Retentio p. placentae*. Тампонація; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 76. Тампонація.
- 5-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 66. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 64.
- 6-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 70. Небольшая задержка выдѣлений въ полости матки. Запахъ. Тампонація; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 90. Тампонація.
- 7-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 70. Выдѣленія съ замѣтнымъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 36.6$, р. = 74. 4' дня—ознобъ: $t^0 = 39^0$, р. = 90; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 64. Тампонація.

- 8-й день. У. $t^0 = 36.6$, р. = 66. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 60. Ночью ознобъ: $t^0 = 40^0$, р. = 106.
- 9-й „ У. $t^0 = 36^0$, р. = 96. При изслѣдованіи матки оказалась въ положеніи retroflexio, откуда она безъ труда репонирована. У дна — плотно приставшія къ стѣнкѣ разращенія. Выдѣленія бурья, съ рѣзкимъ запахомъ. Полость матки вычищена шариками и вложенъ туда тампонъ, причемъ влагалищнымъ тампономъ отодвинута шейка кзади, съ тѣмъ чтобъ матка удержалась въ положеніи нормальнаго наклоненія впередъ. Веч. $t^0 = 38.7$, р. = 100. Днемъ больную знобило ($t^0 = 39.7$). Тампоны пропитаны. Матка въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Болей нигдѣ не чувствуетъ. Тампонація. $t^0 = 38^0$, р. = 90.
- 10-й „ У. $t^0 = 36.6$, р. = 88. Тампонація. Днемъ $t^0 = 36.5$, р. = 72. 4' веч. $t^0 = 39.7$, р. = 92; веч. удалены тампоны. Ни на что не жалуется.
- 11-й „ У. $t^0 = 38.6$, р. = 90; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 100. Выдѣленийъ мало. Запаха не замѣтно.
- 12-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 66; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 70.
- 13-й „ У. $t^0 = 36.2$, р. = 66; веч. $t^0 = 36.4$, р. = 66.
- 14-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 62; веч. $t^0 = 36.1$, р. = 68.
- 15-й „ У. $t^0 = 36.2$, р. = 64; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 66.
- 16-й „ $t^0 = 36^0$, р. = 68. Здорова.

№ 91. (1530).

Прасковья Ф., 33-хъ лѣтъ, VII-рага. Послѣдній былъ выкидышъ, послѣ котораго хворала 3 мѣсяца кровотеченіемъ. Тазъ общесуженный-плоскій. Неправильное вставленіе головки: переднее склоненіе — и растяженіе нижняго отрѣзка матки послужили показаніемъ къ окончанію родовъ путемъ поворота на ножку и извлеченія. Поворотъ и извлеченіе трудные. Разрывъ промежности — швы. Матка послѣ родовъ промита борнымъ растворомъ. Продолжительность родовъ = 18 ч.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 64.
- 2-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 80; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 80.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.8$, р. = 86; веч. $t^0 = 38.4$, р. = 78.
- 4-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 70.
- 5-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 78; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 70.
- 6-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; веч. $t^0 = 39.3$, р. = 110. Оба параметрія нѣсколько напряжены.
- 7-й „ У. $t^0 = 39.6$, р. = 94; веч. $t^0 = 40.8$, р. = 120. Изслѣдованіе: кожа суха, горяча. При давленіи на область живота больная не испытываетъ никакой боли. Небольшой разрывъ промежности, который на ограниченныхъ только мѣстахъ сросся первымъ натяженіемъ. Шейка матки маленькая, хорошо сформирова-

лась, безъ значительныхъ разрывовъ у наружнаго зѣва. Послѣдній съ трудомъ пропускаетъ палецъ. Тѣло матки средней величины, не совсѣмъ плотное, мало подвижное, немного чувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Правый сводъ напряженъ и чувствителенъ; въ лѣвомъ сводѣ тоже небольшое напряженіе. Въ полости матки значительное количество бурокрасныхъ, мутныхъ, слегка густоватыхъ выдѣлений, съ замѣтнымъ запахомъ. *Endometritis (Lochio-metra), Parametritis incip.* Тампонація. $t^0 = 39.4$, $p. = 110$.

- 8-й день. У. $t^0 = 40^0$, $p. = 98$, довольно полный. Сонливость и апатія. Кожа суха и горяча. Языкъ сухой, потрескавшийся, больная имъ плохо владѣетъ. На губахъ — сухія корки. Аппетитъ отсутствуетъ. На боли нигдѣ не жалуется; животъ не вздутъ и нечувствителенъ. Тампоны удалены; влагалищный не весь пропитанъ; въ маткѣ позади тампона небольшое скопленіе выдѣлений. Тампонація. Веч. $t^0 = 40.2$, $p. = 98$. Животъ нѣсколько вздутъ, но нечувствителенъ. Въ мочѣ небольшое количество бѣлка. Жалуется на тошноту. Мѣстно на боли не жалуется. Тампонація. $t^0 = 39.7$, $p. = 96$.
- 9-й " У. $t^0 = 39.1$, $p. = 92$. Тампоны пропитаны. Выдѣленія бурья, съ запахомъ. Влагалищная часть по прежнему припухша, сине-красна, кровоточива. Тампонація. $t^0 = 40^0$, $p. = 96$; веч. $t^0 = 38.2$, $p. = 92$. Удалены тампоны, которые оказались только частью пропитанными. Изслѣдованіе обнаружило: шейка матки довольно дряблая, каналъ проходимъ для пальца. Тѣло матки средней величины и плотности, подвижное, немного чувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Въ правомъ сводѣ, въ верхнемъ отдѣлѣ широкой связки, и отчасти въ области обѣихъ крестцово-маточныхъ связокъ — замѣтное напряженіе. Выдѣлений немного, кровянистыя; запаха особеннаго незамѣтно. Общее состояніе нѣсколько лучше. Больную слабитъ. Покой, ледъ, коньякъ.
- 10-й " У. $t^0 = 37.9$, $p. = 84$; в. $t^0 = 39.4$, $p. = 82$.
- 11-й " У. $t^0 = 39.8$, $p. = 112$. Слабость нѣсколько увеличилась. Языкъ сухъ. Матка нѣсколько больше вчерашняго, немного дрябла и чувствительна. Выдѣленія изъ рукава мутны, съ небольшимъ запахомъ. Изъ полости матки, по проведеніи шарика черезъ каналъ, вылилось большое количество выдѣлений буровато-желтаго цвѣта. Тампонація; $t^0 = 38.5$, $p. = 86$; в. $t^0 = 38.6$, $p. = 82$. Больную рвало одинъ разъ. Поносъ. Тампонація. $t^0 = 39.5$, $p. = 90$; в. $t^0 = 36.8$, $p. = 84$.
- 12-й " У. $t^0 = 38^0$, $p. = 80$. Тампонація; в. $t^0 = 38.9$, $p. = 88$. Тампонація. $t^0 = 38.2$, $p. = 90$.

- 13-й день. У. $t^0 = 38.9$, р. = 96. Общая слабость. Сознание не помрачено. Внизу живота болезненности нѣтъ. Тампоны мало пропитаны. Выдѣлений мало, кровянистыя. Запахъ? Оставлена безъ тампоновъ; в. $t^0 = 39.5$, р. = 98.
- 14-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 90; в. $t^0 = 38.5$, р. = 100. Языкъ нѣсколько чище и влажнѣе. Самочувствіе лучше. Въ полости матки выдѣлений немного, но съ замѣтнымъ запахомъ. Тампонація.
- 15-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 72. Языкъ очистился, влажный. Общее состояніе значительно лучше. Чувствительности внизу живота нѣтъ. Поносъ прекратился. Тампоны всѣ пропитаны. Тампонація; в. $t^0 = 38.1$, р. = 82. Удалены тампоны.
- 16-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 86. Выдѣлений довольно много, кровянисто-слизистыя, запаха незамѣтно. Въ области крестцово-маточныхъ связокъ замѣтно меньшее напряжение. Подвижность матки нѣсколько большая. Общее состояніе значительно лучше; в. $t^0 = 38^0$, р. = 76.
- 17-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 72; в. $t^0 = 37.2$, р. = 70.
- 18-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 60; в. $t^0 = 37^0$, р. = 84.
- 19-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 80; в. $t^0 = 36.8$, р. = 84.
- 20-й " $t^0 = 36.5$, р. = 66. Здорова.

№ 92. (№ 1543).

Евпраксія К., 29 лѣтъ, третьи роды. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 21 часъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. $t^0 = 36.9$,— 37.6 , р. = 58—74.
- 4-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 78; в. $t^0 = 38.5$, р. = 80.
- 5-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 60. Болезненности нигдѣ нѣтъ. Тѣло матки большое дряблое. Полость объемиста. Выдѣленія бурья, съ запахомъ. *Endometritis*. Матка промыта борнымъ растворомъ; в. $t^0 = 38.3$, р. = 74.
- 6-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 78. Тампонація; в. $t^0 = 37.5$, р. = 72. Тампонація.
- 7-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 72. Тампонація; в. = 37.2 , р. = 64. Тампонація.
- 8-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 64. Удалены тампоны. Запаха незамѣтно; в. $t^0 = 37.3$, р. = 60.
- 9-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 54; в. $t^0 = 36.7$, р. = 64. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 10-й " У. $t^0 = 36.3$, р. = 60; в. $t^0 = 36.8$, р. = 70.
- 11-й " $t^0 = 36.9$, р. = 60. Здорова.

№ 93. (№ 1550).

Оекла А., 21-го года, первородящая. Беременность и роды нормальны. Разрывъ задней стѣнки влагалища и малой губы: швы. Продолжительность родовъ = 30 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—5 дни. $t^0 = 36.4-37.5$, $p. = 58-76$.
 6-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 68$. Сняты швы. На задней стѣнкѣ влагалища въ одномъ мѣстѣ получило расхождение, вслѣдствіе чего образовался маленькій кармашекъ; в. $t^0 = 39.2$, $p. = 110$.
 7-й " У. $t^0 = 37.9$, $p. = 88$; в. $t^0 = 37.6$, $p. = 76$.
 8-й " У. $t^0 = 37.7$, $p. = 68$; в. $t^0 = 38.1$, $p. = 76$; н. $t^0 = 39^0$, $p. = 88$.
 9-й " У. $t^0 = 38.8$, $p. = 84$. Матка средней величины и плотности, нечувствительна, подвижна. Каналъ проходимъ для пальца. Выдѣленія кровянисто-слизистыя, мутныя, съ большимъ количествомъ хлопьевъ, съ незначительнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; в. $t^0 = 38.4$, $p. = 82$. Тампонація.
 10-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 68$. Тампонація; в. $t^0 = 37.8$, $p. = 72$. Тампонація.
 11-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 62$. Удалены тампоны; в. $t^0 = 36.9$, $p. = 70$.
 12-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 66$; в. $t^0 = 36.4$, $p. = 66$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 13-й " $t^0 = 36.7$, $p. = 70$. Здорова.

№ 94. (1554).

Ольга С., 23-хъ лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Атоническое кровотеченіе непосредственно послѣ родовъ: холодныя и горячія спринцованія матки. Тампонація матки. Продолжительность родовъ = 11 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—6 дни. $t^0 = 36.5-37.5$, $p. = 76-96$.
 7-й " У. $t^0 = 37.1$, $p. = 80$. Днемъ ознобъ: $t^0 = 40.4$, $p. = 120$; в. $t^0 = 39.2$, $p. = 90$.
 8-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 96$; в. $t^0 = 39.6$, $p. = 114$.
 9-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 72$; в. $t^0 = 38.7$, $p. = 80$. Половая щель зіяетъ (старый разрывъ промежности). Шейка хорошо сформировалась; каналъ пропускаетъ палецъ. Полость матки велика, стѣнки ея гладки. Выдѣленія въ полости жидки, водянисты, буроватаго цвѣта. Запахъ небольшой. Тѣло матки слегка увеличено, подвижно, нечувствительно, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. *Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 27^0$.
 10-й " У. $t^0 = 37.7$, $p. = 88$. Тампонація; в. $t^0 = 37.5-38.2$, $p. = 78$. Тампонація.
 11-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 70$. Удалены тампоны; в. $t^0 = 37.1$, $p. = 68$.
 12-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 70$; в. $t^0 = 37^0$, $p. = 68$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 13-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 70$; в. $t^0 = 37.1$, $p. = 70$.
 14-й " $t^0 = 36.5$, $p. = 78$. Здорова.

№ 95. (№ 1579).

Наталя В., 17-ти лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Лобное предлежаніе. Попытка произвести поворотъ на ножку не увѣнчалась успѣхомъ. Послѣ пробныхъ щипцовъ при исправленномъ, по мѣрѣ возможности, положеніи головки, произведена перфорация головки и извлеченіе ея краниокластомъ. Атоническое кровотеченіе по удаленіи послѣда: спринцованія матки и тампонація. Продолжительность родовъ = 38 часовъ.

Послѣродовое состояніе:

- 1-й день. У. $t^0 = 38.5$, р. = 96. Удалены тампоны. Веч. $t^0 = 37.2$, р. = 70.
- 2-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.9$, р. = 80.
- 3-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 86; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 86.
- 4-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 84; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 70.
- 5-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 82.
- 6-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 64; веч. $t^0 = 38.6$, р. = 68.
- 7-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.3$, р. = 70. Шейка средней величины, довольно дряблая, слегка кровоточивая. По обѣмъ сторонамъ довольно глубокіе разрывы, доходящіе почти до сводовъ. Тѣло матки средней величины, плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Небольшая чувствительность въ лѣвомъ сводѣ. Выдѣленія необильны, цвѣта и консистенціи кофейной гущи. *Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 36.8$, р. = 68.
- 8-й " У. $t^0 = 38.5-39.6$, р. = 90. Тампонація. $t^0 = 38.9$; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 88. Удалены тампоны. Выдѣленій мало; запахъ значительно меньшій. Внутренній зѣвъ временами судорожно сокращается и не пропускаетъ тогда даже тонкаго ватнаго шарика. Вычищена полость шариками, смоченными въ карболовой 2% кислотѣ.
- 9-й " У. $t^0 = 39^0$, р. = 66. Вычищена полость шариками. Веч. $t^0 = 39^0$, р. = 70. Тампонація. $t^0 = 37.8$.
- 10-й " У. $t^0 = 38.4$, р. = 80. Выдѣленія желтаго цвѣта, съ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 39.1$. Веч. $t^0 = 39.8$, р. = 88. Удалены тампоны; они пропитаны. Въ лѣвомъ сводѣ та-же чувствительность.
- 11-й " У. $t^0 = 39.1$, р. = 84. Въ полости матки задержка буровато-желтыхъ выдѣленій. Въ глубинѣ разрывовъ на шейкѣ и въ сводахъ—сѣроватый налетъ. Тѣло матки подвижное, нечувствительное. Въ сводахъ ничего особеннаго не прощупывается. Тампонація. Веч. $t^0 = 39.6$, р. = 98. Удалены тампоны.
- 12-й " У. $t^0 = 38.3$, р. = 84; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 88. Чувствуетъ себя хорошо. Шейка очистилась.
- 13-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 68. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.

- 14-й день. У. $t^0 = 36.1$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.4$, р. = 68.
 15-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 68.
 16-й " $t^0 = 36.8$, р. = 70. Здорова.

№ 96. (№ 1583).

Надежда К., 27-ти лѣтъ, втородящая. Беременность и роды нормальны; продолжительность родовъ = 9 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—5 дни. $t^0 = 36.6—37.8$, р. = 68—84.
 6-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 80; днемъ $t^0 = 38.8$; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 102.
 7-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 88; веч. $t^0 = 38.8$, р. = 112.
 8-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 90; веч. $t^0 = 37.9$, р. = 80. Изслѣдованіе: шейка матки небольшая, хорошо сформированная, съ небольшими надрывами наружнаго зѣва. Тѣло матки небольшое, довольно плотное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Въ сводахъ ничего особеннаго не прощупывается. Въ полости матки на передней стѣнкѣ и у дна прощупываются довольно большія неправильной формы разращенія, которыя удалось легко отсепаровать отъ стѣнки пальцемъ, безъ замѣтнаго кровотеченія. Удаленные кусочки имѣли видъ плацентарной ткани и издавали запахъ. *Retentio p. placentae et Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 39.2$, р. = 74.
 9-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 76. Тампонація. Веч. $t^0 = 37.4$, р. = 74. Тампонація.
 10-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Удалены тампоны. Веч. $t^0 = 37^0$, р. = 82.
 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 74; веч. $t^0 = 36.5$, р. = 68.
 12-й " $t^0 = 36.2$, р. = 72. Здорова.

№ 97. (№ 1626).

Марія Ю., 20-ти лѣтъ, первородящая. Во время беременности чувствовала себя больною (?). Положеніе плода поперечное. Поворотъ на ножку и извлеченіе. Плодъ мацерированный. Продолжительность родовъ = 6 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 68; веч. $t^0 = 38.6$, р. = 84. Матка болѣзненна.
 2-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 66; веч. $t^0 = 38.4$, р. = 82.
 3-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 88; веч. $t^0 = 38.4$, р. = 82. Изслѣдованіе. Наружныя половыя части отечны. Шейка матки большая, дряблая, но безъ разрывовъ. Наружный зѣвъ пропускаетъ два пальца; усиленная раздражительность у внутренняго зѣва: онъ часто судорожно сокращается и не пропускаетъ даже тонкаго шарика.

- Тѣло матки большое, дряблѣе, нечувствительное, подвижное. Своды свободны. Выдѣленія слизисто-кровянисты, съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація.
- 4-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 70. Выдѣленийъ очень много. Пропитанные насквозь тампоны, при малоболѣзненномъ схваткообразномъ сокращеніи матки, сами выпали. Выдѣленія съ запахомъ. Тампонація. Веч. $t^0 = 38.2$, р. = 86. Тампонація. $t^0 = 37^0$.
- 5-й " Въ 5' утра тампоны сами выпали; они были насквозь пропитаны. У. $t^0 = 36.5$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 70. Поносъ.
- 6-й " У. $t^0 = 36.2$, р. = 66; веч. $t^0 = 36.9$, р. = 64. Выдѣленія слегка мутны, безъ запаха.
- 7-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 72. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 8-й " $t^0 = 36.5$, р. = 70. Здорова.

№ 98. (1665).

Евдокія Ф., 25-и лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ = 9 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 68; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 72.
- 2-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 76; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 74.
- 3-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 74; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 70.
- 4-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 62; веч. $t^0 = 39.6$, р. = 96.
- 5-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 66; веч. $t^0 = 38.3$, р. = 76. Исслѣдованіе: стѣнки рукава дряблы; шейка матки довольно большая, дряблая, конфигурируется. Тѣло матки большое, мягкое, подвижное, нечувствительное, въ норм. наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія кровянисто-слизисты, съ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 37.3$.
- 6-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 74. Тампонація; веч. $t^0 = 38.5$, р. = 96. Удалены тампоны.
- 7-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 60; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 62. Выдѣленія слегка мутны, безъ запаха.
- 8-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 70.
- 9-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 62; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 60. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 10-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 60; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 56.
- 11-й " У. $t^0 = 36.3$, р. = 60; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 52.
- 12-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 66; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 64.
- 13-й " $t^0 = 36.4$, р. = 62. Здорова.

№ 99. (1668).

Елизавета Ф., 20-и лѣтъ, первородящая. Во время беременности страдала сочленовнымъ ревматизмомъ. Роды нормальные. Продолжительность ихъ = 4 ч.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. $t^0 = 36.9-37.1$, $p. = 50-60$.
 3-й " У. $t^0 = 37.1$, $p. = 68$; веч. $t^0 = 38.1$, $p. = 68$.
 4-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 68$; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 70$. Шейка матки большая, ціанотически-красная, кровоточивая, не сформировалась; съ лѣвой стороны на шейкѣ довольно глубокой разрывъ. Тѣло матки средней величины и плотности, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленіе мутны, шоколаднаго цвѣта, съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 36.5$.
 5-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 68$. Тампонація; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 74$. Тампонація.
 6-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 62$. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 60$.
 7-й " У. $t^0 = 36.2$, $p. = 66$; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 60$. Выдѣленія съ меньшимъ запахомъ. Вычищена полость матки.
 8-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 64$; веч. $t^0 = 36.2$, $p. = 66$. Выдѣленія безъ запаха.
 9-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 64$; веч. $t^0 = 36.6$, $p. = 80$.
 10-й " $t^0 = 36.7$, $p. = 62$. Здорова.

№ 100. (1669).

Секлетей Ф., 29 лѣтъ, второрождающая. Беременность нормальная. Лицевое предлежаніе. Продолжительность родовъ = 39 часовъ. Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. $t^0 = 36.3-37.2$, $p. = 62-72$.
 4-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 88$.
 5-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 76$; веч. $t^0 = 38.2$, $p. = 76$.
 6-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 76$; веч. $t^0 = 37.5$, $p. = 64$. Шейка короткая, дряблая, съ небольшими ссадинами у наружнаго зѣва. Тѣло матки средней величины и плотности, подвижное, нечувствительное. Выдѣленія обильны, буроваты, съ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 36.6$, $p. = 66$; веч. удалены тампоны.
 7-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 72$. Тампонація; веч. $t^0 = 36.7$, $p. = 70$. Удалены тампоны.
 8-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 66$. Полость матки вычищена шариками; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 58$.
 9-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 80$; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 62$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 10-й " $t^0 = 37^0$, $p. = 72$. Здорова.

№ 101. (№ 1676).

Анна Ф., 22-хъ лѣтъ, четвертые роды. Непосредственно передъ началомъ родовыхъ болей кровотеченіе изъ половыхъ органовъ. Роды нормальные. Продолжительность = 4 часа.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 82; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 90.
 2-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 102; веч. $t^0 = 39.5$, р. = 100.
 (ознобъ). Жалуется на сильныя схваткообразныя боли
 внизу живота. При внутреннемъ изслѣдованіи най-
 дены въ цервикальномъ каналѣ куски плевъ, кото-
 рые отсюда удалены: *Retentio p. velamentorum*.
 3-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 100; веч. $t^0 = 38.5$, р. = 98. Шейка
 большая, дряблая, безъ разрывовъ; наружный зѣвъ
 проходимъ для двухъ пальцевъ; внутренній време-
 нами судорожно сокращается. Полость большая, на-
 полнена жидкими буроватыми выдѣленіями, съ силь-
 нымъ запахомъ. Тѣло матки большое, плотное, по-
 подвижное, чувствительное, въ нормальномъ положеніи.
 Своды свободны. *Endometritis*. Тампонація.
 4-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 80. Тампонація; $t^0 = 36.9$, р. = 78;
 веч. $t^0 = 38.6$, р. = 92. Тампонація; $t^0 = 36.3$.
 5-й " У. $t^0 = 38.4$, р. = 100. Удалены тампоны; пропиты
 насквозь; запаха не замѣтно. Больная жаловалась
 ночью на схваткообразныя боли. Веч. $t^0 = 37.8$, р. = 90.
 6-й " У. $t^0 = 36.3$, р. = 78. Выдѣленія слегка мутны, безъ
 запаха. На боли не жалуется. Вычищена полость ша-
 риками. Веч. $t^0 = 37.6$, р. = 82.
 7-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 74; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 70. Выдѣ-
 ленія по цвѣту и запаху нормальны.
 8-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 68; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 74.
 9-й " $t^0 = 36.8$, р. = 76. Здорова.

№ 102. (№ 1681).

Наталья Ж., 18-и лѣтъ, первородящая. Беременность и роды
 нормальные. Продолжительность родовъ = 17 часовъ. Кровоте-
 ченіе изъ рукава: тампонація. *Haematoma vaginae*.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.6—37.8$, р. = 80—86.
 5-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 104; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 88.
 6-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 124. Изслѣдованіе: *Colpitis granu-*
losa; кромѣ того въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на слизи-
 стой оболочкѣ рукава имѣются трещины, покрытыя
 частью кровяными свертками, частью сѣровато-жел-
 тымъ налетомъ. Въ полости матки задержка выдѣ-
 леній, слизисто-кровянистыхъ, мутныхъ, съ очень рѣз-
 кимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 40.1$,
 t^0 веч. 39.8, р. = 120. Удалены тампоны.
 7-й " У. $t^0 = 39^0$, р. = 96. Тампонація. $t^0 = 38.5$, р. = 96;
 веч. $t^0 = 39.6$, р. = 110. Тампонація. $t^0 = 38.9$.
 8-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 90. Тампонація. Влагалище передъ
 тампонаціей обильно обмыто *aceto pyrolignoso*; $t^0 =$
 37.4 , р. = 100; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 90. Тампонація.

- 9-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 70. Удалены тампоны. Запаха не замѣтно. Слизистая оболочка влагалища очистилась отъ налетовъ и имѣетъ болѣе нормальную окраску. Кровяная опухоль уменьшается. Спринцованія древеснымъ уксусомъ; в. $t^0 = 37.3$, р. = 88.
- 10-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 78; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 85. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 75.
- 12-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 80.
- 13-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 68; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 75.
- 14-й " $t^0 = 36.6$, р. = 70. Здорова.

№ 103. (1714).

Марѳа Я., 21 года, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ = 21 часъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 38.1$, р. = 96; веч. $t^0 = 39.5$, р. = 92.
- 2—4 " $t^0 = 36.6—37.6$, р. = 80—92.
- 5-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 76; веч. $t^0 = 38.5$, р. = 104.
- 6-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 86; веч. $t^0 = 38.9$, р. = 96.
- 7-й " У. $t^0 = 39.1$, р. = 102. Изслѣдованіе: шейка матки дряблая, края зѣва со многими трещинами; съ лѣвой стороны разможенный разрывъ, доходящій до свода. Тѣло матки довольно большое, мягкое, наклонено нормально впередъ. Своды свободны. Наружный зѣвъ пропускаетъ 2 пальца. Выдѣленія оттуда грязно-буроватыя, съ крайне рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 38.9$, р. = 100; веч. $t^0 = 39.4$, р. = 106. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 100. Тампонація; $t^0 = 39.3$, р. = 120; веч. $t^0 = 37.9$, р. = 84. Тампонація.
- 9-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Тампонація; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Удалены тампоны.
- 10-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 74; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 78. Выдѣленийъ мало, по цвѣту и запаху нормальны.
- 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 74; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 76.
- 12-й " $t^0 = 36.9$, р. = 72. Здорова.

№ 104. (№ 1733).

Пелагея Л., 35 лѣтъ, IX-рага. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 5 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. $t^0 = 36.8—37.1$, р. = 66—72.
- 3-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; веч. $t^0 = 38.9$, р. = 108.
- 4-й " У. $t^0 = 39^0$, р. = 90; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 70.
- 5-й " У. $t^0 = 39.2$, р. = 102. Изслѣдованіе: матка большая, дряблая, безболѣзненная. Шейка матки дряблая, со многими ссадинами у наружнаго зѣва. Отдѣленія изъ

- полости матки обильны, сѣро-буроватаго цвѣта, съ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 39^0$, $p. = 88$; веч. $t^0 = 39.2$, $p. = 92$. Удалены тампоны.
- 6-й день. У. $t^0 = 37.9$, $p. = 84$. Тампонація. $t^0 = 37.5$, $p. = 80$; веч. $t^0 = 38.1$, $p. = 84$. Тампонація.
- 7-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 68$. Удалены тампоны. Запаха незамѣтно; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 62$.
- 8-й " У. $t^0 = 37.1$, $p. = 68$. *Lochiometra*; но выдѣленія безъ запаха. Вычищена полость ватными шариками; веч. $t^0 = 36.9$, $p. = 72$.
- 9-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 37^0$, $p. = 76$.
- 10-й " $t^0 = 36.8$, $p. = 66$. Здорова.

№ 105. (№ 1744).

Ирина М., 22-хъ лѣтъ, первородящая. Во время беременности отеки ногъ, лица и кожи живота. Бѣлокъ въ мочѣ. Роды двойнями. Продолжительность родовъ = 19 часовъ. Въ послѣродовомъ періодѣ—кровотеченіе изъ разрыва на шейкѣ съ лѣвой стороны, доходящаго почти до свода. Наложены четыре шва; полость матки и влагалище плотно затампонированы іодоформной марлей. $t^0 = 37.6$, $p. = 76$.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. Веч. $t^0 = 37.1$, $p. = 60$. Удалены тампоны, крови нѣтъ.
- 2-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 58$; веч. $t^0 = 37.6$, $p. = 58$.
- 3-й " У. $t^0 = 37.1$, $p. = 56$; веч. $t^0 = 38.5$, $p. = 74$. Матка немного чувствительна.
- 4-й " У. $t^0 = 38.1$, $p. = 60$. Ночью жаловалась на боли въ животѣ. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Швы на шейкѣ прорѣзались. На поверхности бывшаго разрыва на шейкѣ желтый налетъ. Налетъ снять ватными шариками, смазанъ *t-ra iodi*. Матка промыта, послѣ чего въ каналъ шейки и во влагалище вложены тампоны изъ іодоформенной марли; веч. $t^0 = 39.1$, $p. = 77$.
- 5-й " У. $t^0 = 38.5$, $p. = 80$. Днемъ $t^0 = 39.5$, $p. = 80$. Удалены тампоны. Переведена въ лазаретъ; в. $t^0 = 39^0$, $p. = 84$.
- 6-й " У. $t^0 = 40.2$, $p. = 100$. Изслѣдованіе: со дня родовъ не было стула. Шейка матки большая, дряблая, разможженная съ лѣвой стороны и нѣсколько сзади. Тѣло матки средней величины и плотности, подвижно, безболѣзненно, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣлений очень мало, мутныя, съ небольшимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація, *ol. ricini* и *clysma*; $t^0 = 40.4$, $p. = 96$; веч. $t^0 = 40.6$, $p. = 98$. Больную рвало два раза; при чемъ во время рвоты ее непроизвольно ослабило. Животъ вздутъ, но нечувствителенъ. Матка плотная, подвижная, нечув-

- ствительная. Тампонъ весь пропитанъ. Выдѣленія темно-кровоюистаго цвѣта. $P. = 100$, хорошаго наполненія. Тампонація. $t^0 = 40.8$, $p. = 120$. Удалены тампоны.
- 7-й день. У. $t^0 = 40.9$, $p. = 112$. Больную нѣсколько разъ слабило и утромъ одинъ разъ рвало. Животъ менѣе вздутъ, нечувствителенъ. Матка плотная, подвижная, нечувствительная. Въ сводахъ (при наружномъ изслѣдованіи) чувствительности нѣтъ. Пульсъ слабый, но правильный. Въ сердцѣ—небольшой систолическій шумъ. Легкія при выстукиваніи и выслушиваніи особенно ненормальнаго не представляютъ. Выдѣленія изъ рукава желтоватыя, мутныя; запаха особеннаго не замѣтно. Видимая часть слизистой оболочки канала шейки, раскрытаго при помощи зеркала *Collin'a*, представляется совершенно чистою. Выдѣленія изъ полости матки кровянисты, запаха незамѣтно. Въ виду рѣзко выраженныхъ общихъ явленій, при отсутствіи возможности констатировать особенно замѣтныя мѣстныя отклоненія отъ нормы, рѣшено, *ex consilio*, примѣнить главнымъ образомъ общее лѣченіе. Назначены большія дозы вина, коньяку, обтиранія ароматнымъ уксусомъ, мѣстно—спринцованія и ледъ на низъ живота. Днемъ $t^0 = 40.7$, $p. = 106$; веч. $t^0 = 39.9$, $p. = 120$.
- 8-й " У. $t^0 = 40.2$, $p. = 124$ (потрясающій ознобъ). Такой же потрясающій ознобъ былъ и ночью. Больную рвало нѣсколько разъ; веч. $t^0 = 40.7$, $p. = 140$.
- 9-й " У. $t^0 = 40.1$, $p. = 124$, слабый. Дыханіе учащено, поверхностно. Сознаніе помрачено, состояніе немного возбужденное. Языкомъ плохо владѣетъ, языкъ темно-красный, слегка обложенъ, влаженъ, по краямъ отпечатки зубовъ. Глощаетъ хорошо. Непроизвольное мочеиспусканіе. *Digitalis* и *alcoholica*. Веч. $t^0 = 40.5$, $p. = 124$, дикротическій. Д. = 60. Состояніе значительно хуже.
- 10-й " У. $t^0 = 40.6$, $p. = 150$, нитевидный; веч. $t^0 = 41.3$, $p.$ не сосчитывается. Ночью въ 12 ч. *exitus letalis* при явленіяхъ паралича сердца.

Протоколъ вскрытія, произведеннаго проф. Н. П. Ивановскимъ. Въ полости *Pericardii* незначительное количество серозной жидкости. Сердце порядочно увеличено въ объемъ, въ особенности въ поперечномъ діаметрѣ; полости его расширены; стѣнки истончены; мышца сѣро-желтоватаго цвѣта, дряблая; клапаны и внутренняя оболочка безъ измѣненій; въ полостяхъ содержится темная кровь съ желтоватыми фибринозными свертками. Легкія по мѣстамъ срослены съ грудною стѣнкой старыми ложными перепонками; ткань ихъ въ верхнихъ и среднихъ частяхъ малокровна, въ заднихъ и нижнихъ темнокраснаго цвѣта, вездѣ проходима для воздуха, въ нижнихъ доляхъ отека. Брюшина блѣдная, гладкая; въ полости ея незначительное количество серозной проз-

рачной жидкости. Селезенка увеличена въ объемѣ, темнокраснаго цвѣта, довольно плотна. Печень слегка увеличена, ткань ея въ разрѣзѣ сѣро-глинистаго цвѣта, мягка. Желчный пузырь сращенъ съ поперечно-ободочной кишкой старыми ложными перепонками. Почки увеличены въ объемѣ; капсула ихъ отдѣляется легко; поверхность гладка; корковый слой немного утолщенъ, сѣро-красноватаго цвѣта; пирамидки немного укорочены, краснаго цвѣта; изъ сосковъ выдѣляется мутная жидкость; лоханки и мочеточники незначительно растянуты. *Матка* увеличена въ объемѣ, 19 cm. длины и 14 cm. ширины, серозная оболочка ея гладка и блѣдна, полость расширена, стѣнка около 2½ cm. толщины, блѣдно красноватаго цвѣта, мягка; внутренняя поверхность гладка, за исключеніемъ мѣста прикрѣпленія послѣда на передней стѣнкѣ, гдѣ она бугриста, на разрѣзѣ въ этомъ мѣстѣ ткань довольно рыхла, темно-красноватаго цвѣта съ желтоватыми полосками. На нижней части шейки матки имѣется небольшой разрывъ, слизистая оболочка ея, начиная съ этого разрыва вверхъ до тѣла матки покрыта грязно-желтоватымъ налетомъ, который по мѣстамъ распространяется и на внутреннюю поверхность нижняго отрѣзка тѣла матки. Въ параметральной клѣтчаткѣ никакихъ измѣненій нѣтъ. Яичники значительно увеличены, въ разрѣзѣ сѣро-красноватаго цвѣта, мягки и пропитаны студенистою жидкостью. Слизистая оболочка желудка и кишекъ блѣдна безъ особыхъ измѣненій. Мягкая мозговая оболочка нѣсколько мутна и отечна, утолщена. Ткань мозга плотна, содержитъ умеренное количество крови, въ желудочкахъ содержится незначительное количество серозной жидкости; сосуды основанія мозга блѣдны, безъ измѣненій. Ткань мозжечка въ такомъ-же состояніи, какъ большого мозга. *Diagnosis: Endometritis septica cervicalis et cepticaemia.*

№ 106. (№ 1745).

Александра Х., 21-го года, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 16 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.7$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 80.
 2-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 78; днемъ $t^0 = 39.5$, р. = 90; веч. $t^0 = 39.1$, р. = 86.
 3-й " У. $t^0 = 38.7$, р. = 90. Матка плотна, безболѣзненна. Шейка дряблая, коротка; края зѣва съ многочисленными поверхностными и болѣе глубокими трещинами, которыя мѣстами покрыты поверхностнымъ налетомъ. Выдѣленія вязкія, буровато-краснаго цвѣта, съ небольшимъ запахомъ. *Endometritis (Ulcer)*. Тампонація; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 80. Удалены тампоны.
 4-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 76. Тампонація. Шейка нѣсколько очистилась отъ налетовъ; веч. 37^0-38^0 , р. = 80. Удалены тампоны.

- 5-й день. У. $t^0 = 38.1$, р. = 76. Тампонація; $t^0 = 37.6$, р. = 80; веч. $t^0 = 37.8$, р. = 100. Удалены тампоны.
 6-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 68; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 68. Выдѣленія по запаху и цвѣту нормальны.
 7-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 60; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 78.
 8-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 64; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 70.
 9-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 64; веч. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
 10-й " $t^0 = 36.5$, р. = 68. Здорова.

№ 107. (№ 1755).

Елизавета Т., 38-и лѣтъ, IV-рага. Течение послѣдней беременности нормальное. Роды правильные, продолжались 18 часовъ. Въ послѣдовомъ періодѣ—кровотечение изъ матки: ручное отдѣленіе послѣда. Матка затѣмъ промыта горячимъ растворомъ борной кислоты.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.4$, р. = 82; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 82.
 2-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 60; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 100.
 3-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90. Матка средней величины и плотности, подвижная, немного чувствительная; полость ея велика; отдѣленія буроваты, обильны съ запахомъ. Шейка довольно большая, дряблая: небольшія ссадины у наружнаго зѣва. *Endometritis*. Послѣ тщательной дезинфекціи наружныхъ частей и рукава, полость матки промыта 2% карболовымъ растворомъ въ 38^0R . и затѣмъ рыхло затампонирована іодоформной марлей; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 78; веч. вынуты тампоны.
 4-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 84. Выдѣленія съ тѣмъ-же запахомъ. Матка промыта и затампонирована; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 80. Вынуты тампоны.
 5-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 84. Матка промыта и рыхло затампонирована; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 82. Удалены тампоны.
 6-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 86. Тампонація безъ предварительнаго промыванія матки; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 80. Тампонація.
 7-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 70. Тампонація; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 76. Удалены тампоны: они мало пропитаны. Матка маленькая, плотная, подвижная, нечувствительная. Общее состояніе хорошее. Спринцованія; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 72.
 8-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 72; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 72. Выдѣленія безъ запаха, по цвѣту нормальны.
 9-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 70.
 10-й " $t^0 = 36.9$, р. = 70. Здорова.

№ 108. (1875).

Марія А., 32-хъ лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ = 10 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 70; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 68.
 2-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 78; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 80.
 3-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 82; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 88.
 4-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 78; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 86.
 5-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 82; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 80.
 6-й „ У. $t^0 = 38.3$, р. = 86; веч. $t^0 = 39.9$, р. = 100. Матка немного чувствительна. Въ правомъ сводѣ небольшое напряженіе и чувствительность. Выдѣленія бурныя. *Endometritis*. Тампонація.
 7-й „ У. $t^0 = 38.3$, р. = 96. Удалены тампоны. Обильныя, мутныя, кровянистыя выдѣленія, съ небольшимъ запахомъ. Матка довольно дряблая, кровоточивая. Направление полости ея впередъ и немного влѣво. Тѣло слегка чувствительное у дна, мало подвижное, лежитъ въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Въ боковыхъ сводахъ небольшая чувствительность и напряженіе. Тампонація; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 70.
 8-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 78. Много кровянистыхъ выдѣленій на наружныхъ половыхъ частяхъ и на простынѣ. Тампоны всѣ пропитаны. Запахъ небольшой. Небольшая кровоточивость матки. Переменены тампоны (они оставались въ полости матки 24 часа). $t^0 = 37.6$ — 38.5 — 38.2 — 37.1 — 36.9 , р. = 68—92.
 9-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 76. Удалены тампоны. Выдѣленій много; запаха незамѣтно. Чувствительности нигдѣ нѣтъ; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 76.
 10-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 76; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 11-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 72.
 12-й „ $t^0 = 36.6$, р. = 78. Здорова.

№ 109. (№ 1888).

Софья К., 27-и лѣтъ, второродящая. Явленія гуммознаго сифилиса. Въ послѣдніе пять дней—кровотеченіе изъ половыхъ органовъ. *Placenta praevia lateralis. Versio in pedem et extractio*. Разрывъ на шейкѣ, доходящій до свода. Продолжительность родовъ = 14 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.1$, р. = 100; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 126 (легкое познабливаніе).
 2-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 104; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 110 (большую знобило).
 3-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 108; веч. $t^0 = 39.3$, р. = 120.
 4-й „ У. $t^0 = 38.1$, р. = 100. Въ 2' дня потрясающій ознобъ: $t^0 = 40.2$, р. = 126. Блѣдность покрововъ и видимыхъ слизистыхъ оболочекъ. На шеѣ, на правомъ боку и на лѣвомъ плечѣ имѣются сифилитическія язвы въ раз-

- ныхъ степеняхъ развитія. На шейкѣ матки съ лѣвой стороны имѣется разрывъ, не доходящій до свода, съ кровоподтеками и покрытый грязноватымъ налетомъ. Выдѣленія изъ полости матки блѣдныя, мутныя, съ небольшимъ запахомъ. Матка средней величины и плотности, подвижная, немного чувствительная, *Endometritis, Ulcera*. Тампонація. $t^0 = 38.8 - 37.8 - 37.3 - 38.2 \pm 36.6 - 37^0$. $p. = 100 - 104 - 98 - 80 - 84$.
- 5-й день. У. $t^0 = 37^0$, $p. = 84$. Тампоны (оставшіеся въ полости матки около сутокъ) пропитаны не пѣликомъ; въ полости матки мало выдѣлений. Вокругъ наружнаго зѣва шейки и особенно съ лѣвой стороны язвочка очищается. Запахъ выдѣлений небольшой. Перебѣнены тампоны. Самочувствіе значительно лучше; $t^0 = 37.3 - 37.5 - 38.3 - 37.3 - 36.7 - 36.8 - 37.7 - 37.5$. $P. = 72 - 80 - 84 - 72 - 70 - 76 - 72 - 80$. Ни на что не жалуется.
- 6-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 80$. Тампоны пропитаны. Шейка очистилась. Матка плотна, подвижна и нечувствительна. Чувствуетъ себя хорошо. Оставлена безъ тампоновъ; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 90$.
- 7-й " У. $t^0 = 37.4$, $p. = 84$; веч. $t^0 = 37.3$, $p. = 80$. Выдѣлений очень мало.
- 8-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 88$. Выдѣленія изъ полости матки кровянисто-слизистыя, безъ запаха. Полость матки небольшая. Шейка хорошо сформировалась. Болѣзненности нигдѣ нѣтъ; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 90$.
- 9-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 86$; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 82$. Запоръ. *Ol. ricini*. Ночью $t^0 = 38.6$, $p. = 100$.
- 10-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 88$. Жаловалась ночью на приступъ головной боли, чѣмъ она страдаетъ въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ (Lues?). Со стороны половой сферы не удается констатировать какія-либо уклоненія отъ нормы; веч. $t^0 = 37.8$, $p. = 90$.
- 11-й " У. $t^0 = 37.7$, $p. = 94$; веч. $t^0 = 38.3$, $p. = 78$. Жалуется на зубную боль.
- 12-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 74$; веч. $t^0 = 38.3$, $p. = 88$.
- 13-й " У. $t^0 = 37.4$, $p. = 88$; веч. $t^0 = 39^0$, $p. = 98$.
- 14-й " У. $t^0 = 37.5$, $p. = 80$. Исслѣдована на столѣ при помощи зеркалъ: шейка матки маленькая, плотная. На передней губѣ у наружнаго зѣва небольшія эрозіи. Каналъ шейки проходимъ для тоненькаго шарика. Въ полости матки выдѣлений мало, слизистыя, слегка бѣловатыя, безъ запаха. Изъ канала шейки изъ наружнаго зѣва—прозрачная, стекловидная, тягучая слизь. Тѣло матки небольшое, плотное, подвижное, нечувствительное, нормально обращено впередъ. Своды свободны и совершенно безболѣзненны. Жалуется на зубную боль: нижній правый большой коренной зубъ извѣденъ и болитъ. Соответственно этому мѣсту десна

- и щека болѣзненны и припухши: *Parulis*. Согревающий компрессъ и *kali iodat.* внутрь; веч. $t^0 = 37.3$, $p. = 84$.
 15-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 68$; веч. $t^0 37.3$, $p. = 80$. Халать.
 16-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 80$; веч. $t^0 37.2$, $p. = 96$.
 17-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 88$; веч. $t^0 37.2$, $p. = 72$.
 18-й " У. $t^0 = 36.9$, $p. = 74$; веч. $t^0 37.4$, $p. = 76$.
 19-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 78$. Здорова. Явленія сифилиса *in statu quo ante*.

№ 110. (№ 1889).

Екатерина В., 17-и лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 25 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37^0$, $p. = 68$; веч. $t^0 = 37.1$, $p. = 76$.
 2-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 76$; веч. $t^0 = 37.2$, $p. = 80$.
 3-й " У. Ознобъ $t^0 = 39.1$, $p. = 120$; днемъ $t^0 = 40.2$, $p. = 120$; веч. $t^0 = 40.8$, $p. = 148$.
 4-й " У. $t^0 = 38.9$, $p. = 124$; въ 1' дня $t^0 = 39.5$, $p. = 124$.
 Языкъ слегка обложенъ, влаженъ. Животъ не вздутъ и нечувствителенъ. Больную часто слабитъ. Печень и селезенка не увеличены. Дыханіе нормально; хриповъ и кашля нѣтъ. Сердце работаетъ учащенно; первый тонъ глухой. Пульсъ 124 немного мягкій и слабый. Самочувствіе относительно удовлетворительное. На лѣвой малой губѣ болѣзненная трещина съ чистой поверхностью. Шейка матки довольно большая, дряблая, съ лѣвой стороны небольшая трещина, покрытая желтымъ налетомъ легко удаленнымъ ватными шариками: по удаленіи налета на его мѣстѣ осталась красная, немного кровоточившая поверхность. Въ полости матки выдѣленія кровянистыя, съ небольшими кровяными сгустками, съ кусочками ткани (оболочки?), цвѣта свѣтло-буроватаго, съ небольшимъ запахомъ. Матка средней величины и плотности, подвижная, нечувствительная, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны, безболѣзненны. *Endometritis*. Полость матки вычищена стерилизованными шариками и туда вложенъ тампонъ изъ стерилизованной марли. $t^0 = 39.1-38.2-38.5-38^0-37.1-37.2$, $p. = 100-80-100-104-84-98$.
 5-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 80$. Удалены тампоны (оставшіеся въ маткѣ въ продолженіе сутокъ); они цѣликомъ пропитаны и издають рѣзкій запахъ. Перетампонирована стерилизованной марлей. $t^0 = 37^0-37.3-47.4-37.3-36.8-37^0$, $p. = 80-88-84-88$. Поносъ прекратился. Самочувствіе хорошее.
 6-й " У. $t^0 = 37^0$, $p. = 74$. Тампоны пропитаны насквозь и пахнутъ. Матка маленькая, плотная, нечувствитель-

- ная. Самочувствіе и аппетитъ хорошіе. Оставлена безъ тампоновъ. Веч. $t^0 = 37.4$, $p. = 92$.
- 7-й день. У. $t^0 = 36.6$, $p. = 76$; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 76$.
- 8-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 74$; веч. $t^0 = 37.2$, $p. = 70$. Выдѣленія въ маткѣ жидкія съ замѣтнымъ запахомъ. Вычищена полость карболовыми ватными шариками.
- 9-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 68$; веч. $t^0 = 36.9$, $p. = 78$. Выдѣленія съ запахомъ. Полость матки вычищена шариками.
- 10-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 64$; веч. $t^0 = 37.2$, $p. = 76$. Здорова.

№ 111. (№ 1927).

Зиновія К., 28-и лѣтъ, шестые роды. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 13 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.9—37.5$, $p. = 64—84$.
- 5-й " У. $t^0 = 39^0$, $p. = 80$; веч. $t^0 = 38.8$, $p. = 80$.
- 6-й " У. $t^0 = 39.1$, $p. = 80$; веч. $t^0 = 39.7$, $p. = 98$.
- 7-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 72$; веч. ознобъ: $t^0 = 40.5$, $p. = 110$.
- 8-й " У. $t^0 = 38.5$, $p. = 84$; Матка большая, дряблая; ткань ея кровоточива. Шейка рыхлая; каналъ проходимъ для пальца. Выдѣленія изъ полости матки обильны, темно-сѣро-бураго цвѣта, съ очень сильнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 37.7—37.5$, $p. = 76$; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 88$. Удалены тампоны.
- 9-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 72$; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 60$.
- 10-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 66$. Выдѣленія съ запахомъ, густы. Тампонація. $t^0 = 36^0—37.8—37.3—37^0—37^0—36.9—36.8$, $p. = 66—66—72—60—60—60—78$.
- 11-й " У. $t^0 = 37.1$, $p. = 68$. Удалены тампоны (они лежали въ маткѣ сутки). Выдѣленія безъ запаха.
- 12-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 60$; веч. $t^0 = 36.9$, $p. = 72$.
- 13-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 70$; веч. $t^0 = 36.8$, $p. = 60$.
- 14-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 60$; веч. $t^0 = 37.1$, $p. = 72$. Здорова.

№ 112. (№ 1940).

Наталья Ив., 24-хъ лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 6 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.5—37.9$, $p. = 64—82$.
- 5-й " У. $t^0 = 36.8$, $p. = 74$; веч. $t^0 = 38^0$, $p. = 80$.
- 6-й " У. $t^0 = 37.3$, $p. = 72$; веч. $t^0 = 37.7$, $p. = 68$.
- 7-й " У. $t^0 = 37.2$, $p. = 78$. Тѣло матки большое, дряблое, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Шейка матки большая, дряблая, слегка цианотическая. Каналъ свободно пропускаетъ палецъ. Выдѣленія очень обильны, мутны и съ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 37.1—37.5—38^0—37.4—36.8$, $p. = 78—80—72—78—72—70$.

- 8-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 72. Удалены тампоны. Веч. $t^0 = 37.3$, р. = 68.
 9-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 76; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 88. Исследование при помощи зеркаль ничего ненормального не обнаружило.
 10-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 76; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 80.
 11-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 60.
 12-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Здорова.

№ 113. (№ 1941).

Евдокия Н., 18-и лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 27 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. $t^0 = 36.6—37.6$, р. = 60—88.
 4-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 60; в. $t^0 = 38.3$, р. = 70.
 5-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 80; в. $t^0 = 38.4$, р. = 86.
 6-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 80; в. $t^0 = 38.8$, р. = 90.
 7-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 76; в. $t^0 = 38.7$, р. = 100.
 8-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 100. Исследование: влагалище довольно узко, эластично. Шейка матки маленькая, плотная, хорошо сформирована. Каналь проходимъ для тонкаго шарика. Выдѣленія изъ полости матки обильны, мутны, съ небольшими кусочками измѣненной ткани, съ рѣзкимъ непріятнымъ запахомъ. Матка маленькая плотная, нечувствительная, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. *Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 38—38—39.3—38.3—37.3$, р. = 100—86—104—90—78—80.
 9-й " $t^0 = 37.2—37.1—37^0—38^0$ (вечеромъ); р. = 60—90—80—80. Веч. удалены тампоны (они лежали въ полости матки 32 часа); они пропитаны и издаютъ сильный запахъ. Матка плотная нечувствительная. $t^0 = 37.6$.
 10-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 60. Выдѣленія изъ полости матки необильны, слегка густоваты, желтаго цвѣта, съ небольшимъ запахомъ. Шейка матки плотная, цилиндрическая, съ узкимъ каналомъ. Тѣло матки нечувствительное, плотное, подвижное. Тампонація. $t^0 = 37.3—37.7—38^0—38.5—38.6—38.3$, р. = 68—92.
 11-й " $t^0 = 37.1—37.5—37^0—37.6$, р. = 88—72; веч. удалены тампоны (они оставались въ маткѣ 34 часа); они сильно пахнутъ. $t^0 = 37.7$, р. = 72.
 12-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 72; в. $t^0 = 37.3$, р. = 70.
 13-й " У. $t^0 = 38.4$, р. = 78. Днемъ $t^0 = 38.6$, р. = 80; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 76. Въ полости матки задержка выдѣлений, желтаго цвѣта, довольно густыя, съ небольшимъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 37.1$, р. = 72.
 14-й " У. $t^0 = 36.8—37.4$, р. = 60—74. Тампонація. $t^0 = 37^0$, р. = 68; в. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Удалены тампоны.

- 15-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; в. $t^0 = 37.2$, р. = 80. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 16-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 62. Здорова.

№ 114. (№ 1947).

Христина П., 20 лѣтъ, третьи роды. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 3 часа.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.6—37.3$, р. = 64—76.
 5-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 74; в. $t^0 = 39.1$, р. = 88.
 6-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 70; в. $t^0 = 37.2$, р. = 76.
 7-й " У. $t^0 = 38.6$, р. = 92; в. $t^0 = 39.1$, р. = 96.
 8-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 76. Исслѣдованіе: Влагалище дрябло. Шейка матки довольно большая, вялая. Канальея свободно проходимъ для пальца. Тѣло матки большое, дряблѣе, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія обильны, кровянисты, съ рѣзкимъ запахомъ. Изъ полости матки, при вычищеніи шариками, удалены куски плодныхъ оболочекъ. *Retentio p. velamentorum. Endometritis.* Тампонація. $t^0 = 36.8—38—37.6—37.3$, р. = 60—80.
 9-й " $t^0 = 36.7—37—37.1—37.2—37—36.6$, р. = 60—72. В. тампоны удалены (они лежали въ маткѣ 32 часа); они цѣликомъ пропитаны и издають замѣтный запахъ.
 10-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 80. Выдѣленія изъ полости матки кровянисто-слизисты, мутноваты, съ небольшимъ запахомъ. Матка кровоточива, дрябла. Тампонація; $t^0 = 37.3$, р. = 72; в. $t^0 = 37.8$, р. = 74. Удалены тампоны.
 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 64; в. $t^0 = 36.8$, р. = 60. Выдѣленій мало, безъ запаха, норм. цвѣта.
 12-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 60; в. $t^0 = 36.8$, р. = 70.
 13-й " $t^0 = 36.5$, р. = 72. Здорова.

№ 115. (№ 1970).

Вѣра Ц., 22-хъ лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды двойнями. Продолжительность родовъ = 2 часа.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.9—37.8$, р. = 60—86.
 5-й " Ночью съ короткими промежутками было десять припадковъ эклампсiи. За день съ 5' у. до 7' в. было еще 11 припадковъ; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 72.
 6-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 66; в. $t^0 = 37.8$, р. = 70. Пришла въ сознаніе, потѣеть.
 7-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 82; в. $t^0 = 37.8$, р. = 72.
 8-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 70; в. $t^0 = 38.7$, р. = 80.
 9-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 70; в. $t^0 = 38.9$, р. = 76.

- 10-й день. У. $t^0 = 38^0$, р. = 84. Изслѣдованіе. Въ лѣвой большой губѣ, въ ея толщѣ опухоль, величиною съ куриное яйцо, шаровидная, гладкая, немного подвижная, безболѣзненная. Кожа на ней подвижна, нормальной окраски. Опухоль эластичная, слегка флюктуируетъ: ретенціонная киста. Шейка матки небольшая, нормальной плотности, немного кровоточива; каналъ ея проходимъ для шарика ваты. Тѣло матки средней величины и плотности, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости матки довольно обильны, мутны и съ особенно рѣзкимъ непріятнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 38.3 - 39.3 - 38.7 - 38.5 - 37.5 - 37.3 - 37.8$.
- 11-й „ 36.8, р. = 80—100—90—90—76—72—78—76. У. перемѣнены тампоны (они оставались въ маткѣ ровно сутки); $t^0 = 36.9 - 37.2 - 37.2 - 36.9$, р. = 72—74—72—64.
- 12-й „ $t^0 = 36.6 - 36.3 - 36.8 - 36.4$, р. = 68—58—70—72. У. удалены тампоны (оставались въ маткѣ 24 часа). Выдѣленія безъ запаха; в. $t^0 = 36.5$, р. = 76.
- 13-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; в. $t^0 = 36.8$, р. = 78. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; общее состояніе вполне хорошее.
- 14-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 64, в. $t^0 = 36.8$, р. = 88.
- 15-й „ $t^0 = 36.7$, р. = 78. Здорова.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

- 1) P. Müller. Handbuch der Geburtshülfe. 1889, Bd. III, pag. 323.
- 2) Mayrhofer. Zur Frage nach der Aetiologie der Puerperalprocesse. Monatschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten. 1865, Bd. XXV
- 3) Haussmann. Die Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane des Menschen und einigen Thiere. Berlin, 1870.
- 4) D'Espine. Contribution à l'étude de la septicémie puerpérale. Paris, 1873.
- 5) K. Rokitsky (jun). Untersuchungen der mikroskopischen Zusammensetzung der Lochien. Wiener med. Jahrbuch. 1874.
- 6) Kehrer. Versuche über Entzündung und fiebererregende Wirkungen der Lochien. Beiträge zur experiment. und vergleich. Geburtskunde. Giessen, 1875, H. 4.
- 7) Doléris. Essai sur la pathogénie et la thérapeutique des accidents infectieux des suites de couches. Paris, 1880.
- 8) Ferd. Karewski. Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkungen puerperaler Secrete auf den thierischen Organismus. Zeitschr. f. G. u. G., Bd. VII, 1881.
- 9) Д. О. Оттъ. О значеніи такъ называемыхъ послѣродовыхъ очищеній при примѣненіи противогнилостныхъ мѣръ въ акушерствѣ. Врачъ, 1886, № 27.
- 10) Doederlein. Untersuchung über das Vorkommen von Spaltpilzen in den Lochien des Uterus u. der Vagina der Wöchnerinnen. Arch. f. Gynaecol., Bd. XXXI.
- 11) Черневскій. Къ вопросу о послѣродовыхъ заболѣваніяхъ. Дисс. Спб., 1888, № 40.
- 12) Мироновъ. О причинахъ послѣродовыхъ заболѣваній. Дисс. Харьковъ, 1889.
- 13) Fehling. Arch. für Gynaecol., Bd. XXXV, pag. 493.
- 14) Döderlein. Arch. f. Gynaecol., Bd. XL, pag. 99.
- 15) Zweifel. Lehrbuch der Geburtshülfe. Die Pathologie des Wochenbetts. 1892.
- 16) Lingelsheim. Experimentelle Untersuchungen über morphologische, kulturelle u. pathogene Eigenschaften verschiedener Streptokokken. Zeitschr. f. Hygiene, B. X, 2.
- 17) Poirier. Lymphatiques des organes genitaux de la femme. Le Progrès médical. Nov. 23 et Dec. 7, 21, 28. 1889.
- 18) Pestalozza. Die heutige Therapie des Puerperalfiebers. Settimana medica, 1896, № 16—18. По Centralbl. f. Gynaec., 1896, № 37.
- 19) P. Zweifel. Die Pathologie des Wochenbetts. 1892.
- 20) O. v. Grunewaldt. Ueber intrauterine Therapie im Puerperium. St. Petersburger med. Wochenschrift. 1878, № 48—49.
- 21) Cohnstein. Beitrag zur Therapie d. chron. Metritis. 1868.

- 22) O. v. Gr ü n e w a l d t. Ueber die Eigenwärme gesunder und kranker Wöchnerinnen. Petersb. med. Zeitschrift, 1863.
- 23) R a d e c k i. Ueber intrauterine Injectionen im Wochenbette. Petersb. med. Zeitschr. 1874, № 4.
- 24) H. F r i t s c h. Ueber das Puerperalfieber und dessen locale Behandlung. Volkmann's Sammlung klin. Vorträge, № 107, 1876.
- 25) C. R i c h t e r. Ueber Ausspülung der Gebärmutter mit Carbolwasser. Zeitschrift f. Geb. u. Gyn., 1877, Bd. II, H. 1.
- 26) B i s c h o f f. Zur Prophylaxis des Puerperalfiebers. Corresp.—Blätter f. Schweiz. Aertzte, 1875, № 22 u. 23.
- 27) M ü n s t e r. Die intrauterine Injection im Wochenbett. Zeitschr. f. G. u. G., Bd. I, H. 2.
- 28) W. S c h ü l e i n. Ueber intrauterine Injectionen mit Garbolsäurelösung im Wochenbett. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 1877, Bd. II, H. 1.
- 29) F i s c h e l. Zur Therapie der puerperalen Sepsis. Arch. f. Gynaec., 1882, Bd. XX, H. 1.
- 30) F. K e h r e r. Handbuch der Geburtshülfe, von P. Müller. 1889, Bd. III, pag. 340.
- 31) F e h l i n g. Die Physiologie und Pathologie des Wochenbetts. 1890.
- 32) R u n g e. Bemerkungen über eine Puerperalfieberepidemie in der geburtsbülflichen Klinik der Charité. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. V, pag. 195.
- 33) B r e i s k y. Ueber die intrauterine Localbehandlung des Puerperalfiebers. Zeitschrift für Heilkunde. 1880, I.
- 34) H o f m e i e r. Ueber den Werth prophylactischer Uterusausspüllungen gleich nach der Geburt. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. V, H. 2.
- 35) B a r. Des méthodes antisép. en obstét. Paris, 1883.
- 36) K e h r e r. Verhandlung der gynécologischen Section der 56 Versammlung deutscher Naturforscher u. Aertzte in Freiburg. 1884.
- 37) W i e d o w. Zur Frage der Antisepsis während der Geburt. Centralbl. f. Gyn., 1883, № 35.
- 38) T o p o r s k i. Das Sublimat als Desinficiens in der Geburtshülfe. Centr. f. Gyn., 1883, № 37.
- 39) B r ö s e. Das Snblimat als Desinficiens in der Geburtshülfe. Centr. f. Gyn., 1883, № 39.
- 40) G a r r i g u e s. Prophylaxe des Puerperalfiebers. New-Jork med. record 1883, 23 December, no pef. Centr. f. Gyn., 1885, № 10.
- 41) W i n t e r. Gegen die Uebermässige Sublimat-Behandlung in der Geburtshülfe. Centralbl. f. Gyn., 1884, № 43.
- 42) T h i e d e. Ueber locale Antiphlogosis im Wochenbett. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. V, H. I.
- 43) D u k e. Lancet, vol. II, p. 669.
- 44) O. K ü s t n e r. Ueber Carbolintoxicationen nach Ausspülung des puerper. Uterus. C. f. G., 1878, 14.
- 45) H. F r i t s c h. Ueber das Einflissen von Desinficientien in die Uterus venen bei der Irrigation. Centralbl. f. Gyn., 1878, № 15.
- 46) R. H e r d e g e n. Ueber Zufälle bei Ausspüllungen des puerper Uterus. C. f. Gyn., 1878, № 16.
- 47) T i s s i e r. Semaine méd., 1892, Vol. XII, pag. 183.
- 48) Z w e i f e l. Berl. klin. Wochenschr. 1878, № 1.

- 49) Bruntzel. Breslauer aertztl. Zeitschrift. 1879, № 5.
- 50) Reimann. Centralbl. f. Gynaec. 1880, № 5.
- 51) Walther Fischer. Ueble Zufälle bei Ausspüllungen der Gebärmutterhöhle. Diss. inaug. 1880.
- 52) Frommel. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 1880, Bd. V, p. 224.
- 53) Roulin. Union médicale, 1887, № 108.
- 54) Кудинъ. Журн. Акш. и Женск. бол., 1889, т. III.
- 55) Выродскій. Ibid., 1890, т. IV.
- 56) Gebhard. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., XXI, p. 2.
- 57) Horn. Diss. inaug. Erlangen, 1891.
- 58) Krukenberg. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., XXI, 1.
- 59) Schleider. Deutsche med. Woch., 1891, pag. 9.
- 60) Langenbuch. Die Drainage des puerperalen Uterus. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 1877, Bd. II, H. 1.
- 61) Schede. Ueber die Drainage des Uterus bei puerperaler Septichämie. Berl. kl. Woch., 1877, № 23 и 24.
- 62) Veit. Ueber die Drainage des puerperal erkrankten Uterus. Berl. kl. Woch., 1879, № 23 и 15.
- 63) Breisky. Ueber die intrauterine Localbehandlung des Puerperalfiebers. Zeitschr. f. Heilkunde. Bd. I.
- 64) Richter. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 1878, Bd. II.
- 65) Duncan. British medical Journal. 1879, no Centralbl. f. Gyn., 1880, № 10.
- 66) Spiegelberg. Die Entwicklung der puerperalen Infection. Berl. klin. Woch., 1880, № 22.
- 67) Schücking. Wie ist eine streng antiseptische Behandlung der Wunden des weiblichen Genitalcanals einzurichten? Berl. klin. Woch., 1877, № 26 и Berl. klin. Woch., 1889, № 11.
- 69) v. Ott. Apparat zur Entfernung der Flüssigkeit der permanenten Irrigation. Centralbl. f. Gynaecol., 1882, № 13.
- 70) Schücking. Ein Utero-Vaginalrohr zur permanenten Irrigation. Arch. f. Gyn., Bd. XX, H. 2, pag. 329.
- 71) Winkel. Pathologie u. Therapie des Wochenbetts, 1878.
- 72) Fritsch. Ueber Ausstossung eines Fibroms nach Ergotinbehandlung nebst Bemerkungen über permanente Irrigation. C. f. G., 1879, № 18.
- 73) Левенштейнъ. О постоянномъ орошеніи матки при послѣродовыхъ заболѣваніяхъ. Врачъ, 1880, № 25.
- 74) Küstner. Die permanente Scheidenausspüllung eine Methode streng antiseptischer Behandlung der Genitalwunden der Frau. Centralbl. f. Gyn., 1880, № 16.
- 75) Снегиревъ. Маточныя кровотечения. Москва, 1895.
- 76) Недзвецкій. О постоянномъ влагалищномъ орошеніи при гнилостныхъ послѣродовыхъ заболѣваніяхъ половой сферы. Медв. Обзор., 1889, т. XXXI, № 6.
- 77) Ehrendorfer. Ueber die Verwendung der Iodoformstäbchen bei intrauteriner Nachbehandlung im Wochenbett. Arch. f. Gyn., Bd. XXII, H. 1.
- 78) Ehrendorfer. Ueber antiseptische (locale) Behandlung in der Geburtshülfe. Arch. f. Gyn., Bd. XXVII, H. 2.
- 79) Weckbecker-Sternfeld. Ueber die Anwendung des scharfen Löffels in der Geburtshülfe. Arch. für Gynaec., Bd. XX, H. 2, 1882.

- 80) Bruckhardt. Beitrag zur Therapie des Puerperalfiebers. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., Bd. IX.
- 81) Vulliet. Le curage de la cavité utérine. Journ. de médecine de Paris, 1887, vol. XIII, № 8.
- 82) Scharpentier. Du curage et de l'écouvillonnage de l'uterus dans l'endometrite septique puerpérale. Bulletin de l'Acad. de Médic., 1888, № 38.
- 83) Grandin. A plea for the active treatment of puerperal endometritis by means of the curette. N.-York med. Journ., Feb. 16, 1889. Реф. Журн. Ак. и Женск. бол., т. III.
- 84) Borel. Du curettage utérin dans les accidents consécutifs à l'accouchement et à la fausse couche. Arch. de Tocol., 1890, Février.
- 85) Scharrer. Du curettage précoce dans l'infection puerpérale, envisagé comme moyen thérapeutique et prophylactique. Arch. de Tocol., 1891, pag. 601.
- 86) Porteous. I. Lindsley. The treatment of puerperal septicemia by curetting. N.-York med. Journ., 1891, pag. 490. По Jahresbericht v. Frommel. 1891.
- 87) Weiss. Das Curettement bei Endometritis puerperalis mit besonderer Berücksichtigung der Endometritis sub partu. Wien, bei Moritz Perles, 1891.
- 88) Fraisse. Du tamponnement dans certains accidents de puerpéralité. Arch. de Tocol., 1891, p. 162.
- 89) Pryor. New-York Amer. Journ. of Obstetr., July, 1892, no Centralbl. f. Gyn., 1893.
- 90) Rapin. Mercredi méd., 1895, № 42.
- 91) Bericht über die Verhandlungen des Congresses für Geburtshülfe, Gynaecologie und Pädiatrie in Bordeaux. Monatschr. f. Geb. u. Gyn., 1895, H. V.
- 92) Fritsch. Ueber Auskratzung des Uterus bei Puerperalfieber. Deutsch. med. Woch., 1891, № 16.
- 93) Fritsch. Ueber Auskratzung des Uterus nach reifen Geburten. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., XXI, 1891.
- 94) Olshausen. Ibid.
- 95) М. Преображенский. Перевязочный матерьяль (физическія свойства). Дисс., Спб., 1890, № 70.
- 96) Dührssen. Die Uterustamponade mit Iodoformgaze bei Atonie des Uterus nach normaler Geburt. Centralbl. f. Gynaecologie, 1887, № 35.
- 97) Barnay et Roland. Retention placentaire complète avec adhérences; septicémie puerpérale, curage, écouvillonnage et tamponnement utérins. Guérison. Arch. de Tocologie. Décembre, 1890.
- 98) Miller. Intermediate treatment of puerperal sepsis. The Amer. J. obst., vol. XXXII, Nov., pag. 615. По Jahresbericht von R. Frommel, IX, 1895.
- 99) Bericht über die Verhandlungen des Congresses für Geburtshülfe, Gynaecologie u. Pädiatrie in Bordeaux. Monatschr. f. Geb. u. Gynaec., 1895, H. V.
- 100) Ettore Truzzi. Die prophylactische Gaze-Uterustamponade bei den rechtzeitigen Geburten. Monatschr. f. Geb. u. Gynaec., 1895, Bd. II.
- 101) Döderlein. Handbuch der Gynaecologie von Veit, pag. 362, Bd. II.
- 102) Döderlein. Das Scheidensecret und seine Bedeutung für das Puerperalfieber. 1892.