

158. Voigt.—Fall von Kaiserschnitt nach Porro in der Schwangerschaft wegen malignen Ovarialtumors nebst Beitrag zur Pathologie des Corpus luteum. (Arch. f. Gyn., Bd. XLIX, Hft. 1). Случай операціи Porro во время беременности вслѣдствіе злокачественной овариальной опухоли и къ патологіи corpus luteum.

У 30 лѣтней, II gravida, стала сильно рости овариальная опухоль. Благодаря причиняемымъ ею сильнымъ болямъ, чрезмѣрному истощенію больной, а главное, тому обстоятельству, что не было надежды на произвольное окончаніе родовъ, такъ какъ опухоль выполняла собою полость малаго таза, было приступлено къ овариотоміи. Но опухоль оказалась твердою и сросшеюся съ сосѣдними органами, въ особенности съ маткой, почему пришлось ампутировать также и эту послѣднюю. Виѣбрюшинный уходъ за ножкою и дренированіе по *Микуличу*. Операцію больная повидимому перенесла, но она умерла на 11 день, какъ показала секція, вслѣдствіе кровотеченія изъ стараго изъязвленія желудка. Данныя микроскопическаго изслѣдованія опухоли заставляютъ автора предположить, что опухоль образовалась изъ желтаго тѣла.

С. Ю. Хазанъ.

159. Fehling.—Weitere Beiträge zur Lehre von der Osteomalakie. (Arch. f. Gyn., Bd. XLVIII, Hft. 3). Еще къ ученію объ остеомаляціи.

Обозрѣвъ результаты собственныхъ наблюденій, равно какъ и литературу послѣднихъ лѣтъ, *F.* слѣдующимъ образомъ рисуетъ намъ состояніе вопроса объ остеомаляціи. Размягченіе костей не есть болѣзнь свойственная исключительно костямъ таза; въ трудныхъ случаяхъ поражаются также и кости позвоночника, бедеръ, грудной кѣтки, рѣже верхнихъ конечностей и черепа. По существу своему остеомаляціи болѣзнь воспалительная: распадъ костной ткани беретъ перевѣсъ надъ ростомъ. Чѣмъ обусловливается раствореніе кальцевыхъ солей—остается пока не разъясненнымъ: гипотеза-же о присутствіи въ тканяхъ костнаго мозга свободной кислоты является мало вѣроятною. Дальнѣйшія измѣненія при остеомаляціи заключаются въ уменьшеніи щелочности крови и содержанія въ ней гемоглобина и въ измѣненіи относительнаго количества клѣтчатыхъ элементовъ. Далѣе при разбираемой болѣзни находятъ пораженіе яичниковъ въ видѣ гіалинаго перерожденія сосудовъ. Затѣмъ весьма возможно, что существуютъ также измѣненія въ центральной и симпатической нервной системѣ, но ближайшій характеръ этихъ измѣненій еще не выясненъ.