

Что же касается наконецъ остальныхъ измѣненій въ организмѣ при остеомалациі, то они вторичнаго характера, являясь при высокихъ степеняхъ этого страданія, какъ напр. кахексія и обусловливаемый ею туберкулезъ. Улучшеніе и исцѣленіе, наблюдаемыя послѣ операціи Porro и кастраціи, говорятъ убѣдительно за то, что пораженіе личниковъ не есть слѣдствіе, а причина размягченія костей. Болѣзнь эта распространена преимущественно въ влажныхъ мѣстностяхъ, а въ отдѣльныхъ случаяхъ является подъ непосредственнымъ вліяніемъ сырой квартиры, простуды и т. п., при чемъ беременность и роды несомнѣнно предрасполагають къ заболѣванію. При лѣченіи разбираемаго страданія улучшеніе гигиеническихъ условій и воздержаніе отъ беременности должны быть на первомъ планѣ; затѣмъ является полезнымъ, въ особенности въ началѣ болѣзни, употребленіе фосфора, желѣза, рыбьяго жира, примѣненіе ваннъ и т. п. При сильныхъ степеняхъ болѣзни можно уже въ началѣ беременности прибѣгнуть къ выкидышу, въ концѣ беременности лучше всего сдѣлать Porro съ кастраціею. Последняя операція, т. е. кастрація, показуется также въ трудныхъ и упорныхъ случаяхъ внѣ акта родовъ, такъ какъ она почти безошибочно ведетъ къ цѣли.

С. Ю. Хазанъ.

160. Polgár.—Die Heilung der Osteomalacie mittelst Castration. (Arch. f. Gyn., Bd. XLIX, Hft. 1). Лѣченіе остеомалациі помощью кастраціи.

Результаты, достигнутые въ Будапештской клиникѣ, наглядно показываютъ, что, если гигиеническіе и фармацевтическіе приемы оказываютъ благотворное дѣйствіе на остеомалацию, то кастрація во всякомъ случаѣ принадлежитъ пальма первенства въ ряду терапевтическихъ приемовъ, такъ какъ при помощи этой операціи излѣчиваются даже такіе случаи, которые не поддаются дѣйствію другихъ средствъ.

С. Ю. Хазанъ.

161. Frh. von dem Bussche-Haddenhausen.—Die in den Jahren 1890 bis 1894 in der Frauenklinik zu Göttingen operirten Fälle von Osteomalacie. (Arch. f. Gyn., Bd. XLIX, Hft. 1). Случаи остеомалациі, оперированные въ Геттингенской клиникѣ, въ періодъ времени съ 1890 по 1894 годъ.

Передавъ исторію болѣзни 6 случаевъ остеомалациі, при которыхъ была произведена кастрація (въ 5 случаяхъ), resp. операція Porro (въ 1 случаѣ), авторъ пытается бросить нѣкоторый свѣтъ

на этиологию, патогенезъ и терапію этого страданія. Плохія гигиеническія условія, какъ сырое помѣщеніе, дурная пища и т. д. играютъ повидимому послѣднюю роль въ этиологіи этой болѣзни; все скорѣе говоритъ за географическое ея распространеніе, такъ какъ она является лишь въ извѣстныхъ мѣстностяхъ. Благотворное вліяніе кастраціи на остеомалачію несомнѣнно и выражается прежде всего въ уменьшеніи болей. Хотя и не существуетъ еще удовлетворительнаго объясненія этого вліянія, необходимо все же признать эту операцію, въ особенности, когда другіе методы лѣченія остались безъ результата. *С. Ю. Хазанъ.*

162. Rossier.—Anatomische Untersuchung der Ovarien in Fällen von Osteomalakie. (Arch. f. Gyn., Bd. XLVIII, Hft. 3). Анатомическое изслѣдованіе яичниковъ въ случаяхъ остеомалачіи.

Сырыя квартиры, плохой образъ жизни, скудная мясомъ пища, употребленіе для питья бѣдной солями кальція воды, частыя беременности, долгое кормленіе и т. п. играютъ безъ сомнѣнія не послѣднюю роль въ этиологіи этого страданія, но блестящіе результаты, достигаемые путемъ кастраціи, указываютъ еще на одинъ моментъ, а именно на непосредственное вліяніе яичниковъ. Предпринятая для провѣрки этого вліянія микроскопическія изслѣдованія яичниковъ показали гіалиновое перерожденіе сосудовъ и окружающей ихъ соединительной ткани. *Хазанъ.*

163. W. von Skowronski.—Ueber das runde Geschwür der Scheide. Beobachtung an einer lebenden Frau. (Centralbl. f. Gynäk., 1895 г., № 10). О круглой язвѣ влагалища. Наблюденіе у живой женщины.

Авторъ не нашелъ въ литературѣ описанія случая этой, такъ называемой, круглой разѣдающей язвы *Clarke*, наблюдавшагося у живой женщины. Его случай касается 37 лѣтней, рожавшей, женщины, заболѣвшей годъ назадъ бѣлями и болью при мочеиспусканіи. Авторъ нашелъ у нея припуханіе и болѣзненность отверстія мочеиспускательнаго канала и передняго края входа во влагалище. На 1½ смт. отъ входа на передней стѣнкѣ влагалища имѣлась язва, величиной съ крейцерову монету; язва круглой формы, съ ровными краями, покрытая вялыми грануляціями съ сѣро-гноевиднымъ выдѣленіемъ. Она была принята за раковую и вырѣзана, но микроскопъ показалъ, что по краю язвы эпителий влагалищной оболочки внезапно прерывался, замѣняясь прогрес-