

сводъ влагалища, но извлеченіе крючка этимъ путемъ оказалось неудобнымъ, вслѣдствіе толщины слоя тканей, покрывавшихъ нижній конецъ крючка; тогда *N.* вскрылъ животъ; крючекъ лежалъ на тонкихъ кишкахъ, покрытый сальникомъ, сросшійся съ подлежащими тканями, соотвѣтственно нижнимъ $\frac{2}{3}$ протяженія крючка; вскрывъ сальникъ у верхушки крючка, *N.* извлекъ его. Рану зашили 3 этажнымъ швомъ; выздоровленіе наступило гладкое.

При осмотрѣ извлеченныхъ частей крючка оказалось, что обѣ части были только склеены; весь крючекъ имѣлъ 5 дюймовъ длины, верхняя часть его— $3\frac{1}{2}$ дюйма. Этотъ случай еще разъ доказываетъ, какъ легко переносятся иногда прободенія матки инструментами.

М. Гинзбургъ.

183. **Dr. I. E. Andrew** (Hamthorn—Melbourne).—**A Case of Ectopic gestation.**—(The Australasian medical gazette, 20 May 1897, p. 229).—**Внѣматочная беременность (съ летальнымъ исходомъ).**

Интересъ этого случая состоитъ въ опубликованіи неудачнаго, смертельнаго исхода, происшедшаго на операционномъ столѣ. Беременность была 8—9 недѣльнаго срока, трубная; разрывъ произошелъ утромъ; операція, по консиліуму, была отложена до другого дня—и этому-то промедленію авторъ приписываетъ причину смерти, напоирая на то, что въ подобныхъ случаяхъ не слѣдуетъ откладывать операціи, а производить ее возможно быстрѣ послѣ происшедшаго разрыва беременной трубы.

М. Гинзбургъ.

184. **Dr. Ed. Ayers, Coë etc.**—**Symphysiotomy.**—(New-York Academie of medecine section in obstetrics and gynaecology. Meeting of Mai 27, 1897, p. New-York Medical journal, June 26, 1897 p. 877).—**Симфизеотомія.**

Ayers произвелъ за послѣдніе 2 года 8 симфизеотомій, изъ нихъ 7 съ благопріятнымъ, 1 съ смертельнымъ исходами. По его наблюденіямъ, симфизеотомія даетъ смертность въ 10% для матерей и вдвое большую смертность дѣтей; по этому онъ преждевременные роды предпочитаетъ лоносѣченію и высказывается за предоставленіе выбора между тою и другою операціей родственникамъ беременной. Въ случаѣ, окончившемся смертью, послѣдняя произошла отъ омертвѣнія рубца во влагалищѣ, даващаго кишечно-влагалищную фистулу и септическую пневмонію.