

на	7	день	—22 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
"	8	"	—24 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
"	9	"	—14 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
"	10	"	— 6 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
позднѣе	"	"	— 6 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

Они смазывали пупочный остатокъ 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub> карболовымъ вазелиномъ и ежедневно купали ребенка.

166. Dr. Farner.—Къ казуистикѣ елѣфантіазиса (Ein Beitrag zur Kasuistik der Elephantiasis).—(Ibid., № 17).

*F.* сообщаетъ случай елѣфантіазиса наружныхъ половыхъ органовъ, удаленной оперативнымъ путемъ. Изъ сопоставленія анамнестическихъ, клиническихъ и патолого-анатомическихъ данныхъ онъ приходитъ къ заключенію (въ противоположность общераспространенному взгляду), что причина этой болѣзни кроется въ повторныхъ раздраженіяхъ, ведущихъ къ хроническому воспаленію лимфатическихъ сосудовъ, а не въ первичномъ застоѣ лимфы.

167. Dr. Keilmann.—Шулцевскія качанія при переломахъ ключицы.—(Centr. f. Gyn., № 3, 1895 г.).

Авторъ приводитъ мнѣнія нѣкоторыхъ авторовъ, указывающихъ на непримѣнимость способа *Schultze*, для оживленія ребенка при переломахъ ключицы, тяжелою вѣсѣ ребенка и проч. *K.* присоединяется къ мнѣнію *Schultze*, что даже и при этихъ условіяхъ осторожныя, *lege artis* выполненныя качанія по *Schultze* не вредятъ ребенку, сопровождаясь обычнымъ быстрымъ устраненіемъ асфиксіи. Два случая подобнаго рода подробно описываются имъ.

*K.* между прочимъ отмѣчаетъ признакъ, которымъ онъ руководствуется при оцѣнкѣ дѣятельности сердца плода, даже когда послѣдній большей своей частью находится въ маткѣ: сдавливая кожу ребенка, удаляютъ кровь изъ подлежащаго участка; если послѣдняя быстро наполняетъ сосуды (узнаютъ по окраскѣ) послѣ прекращенія давленія, то дѣятельность сердца удовлетворительна, если медленно—обратное заключеніе.

Строгановъ.

168. Dr. H. Peters.—Инкарцерация удлиненной влагалищной части.—(Centr. f. Gynaec., № 3, 1895 г.).

*P.* сообщаетъ рѣдкій случай инкарцерации влагалищной части въ Брауновскомъ пессаріѣ. Роджавшая женщина, 41 году отъ роду, имѣла рѣзкое удлиненіе влагалищной части такъ, что наружный зѣвъ находился in rima pudendorum, передній влагалищ-