

ваго мѣшка, наполненнаго теплою водою, „что всегда сопровождалось чрезвычайно благоприятнымъ дѣйствіемъ на освобожденіе мочи“. Въ одномъ очень тяжеломъ случаѣ было примѣнено кровопусканіе въ 600 grm. послѣ родовъ, сопровождавшееся внезапнымъ прекращеніемъ припадковъ и рѣзкимъ улучшеніемъ общаго состоянія. На слѣдующій день вынуждено еще 500 grm., послѣ чего вскорѣ возвратилось сознание.

171. **Dr Witthauer.**—Опухоль печени, достигшая малаго таза.—(С. f. Gynaec., № 5, 1895 г.).

Большая злокачественная опухоль печени, нижнимъ отрѣзкомъ лежавшая въ маломъ тазу.

При изслѣдованіи per vaginam матка не могла быть точно опредѣлена, равно не могли доказать отсутствіе связи между маткой и опухолью.

Была предположена опухоль матки, или придатковъ. При произведенной лапоротоміи оказалось, что опухоль исходила изъ печени. Смерть на вторыя сутки послѣ операціи. *Строгоановъ.*

172. **Otto Küstner.**—Операція Alexander'a. (Бреславльская гинекологическая клиника).—(Centr. f. Gynaec., № 7, 1895 г.).

Въ началѣ *K.* былъ принципиальнымъ противникомъ этой операціи, затѣмъ подъ вліяніемъ результатовъ другихъ операторовъ, онъ дважды обращался къ ней и всегда съ неудовлетворительнымъ результатомъ. Работы *Lanz'a* и *Werth'a*, снова заставили его обратиться къ этой операціи. Онъ придаетъ особенное значеніе модификаціи *Koehera*, по которому производится большой кожный разрѣзъ; разсѣкается весь ваховой каналъ и вытянутая и обнаженная *lig. rotundum* пришивается къ *fasciam superficialem*.

K. подчеркиваетъ, что слѣдуетъ оперировать поэтому способу лишь совершенно подвижныя матки, находящіяся въ *retroversio-flexio*. Вотъ его описаніе операціи: передъ операціей исправляется положеніе матки, затѣмъ сначала съ лѣвой стороны производится разрѣзъ, длиною 6—8 сант., въ направленіи Пунартовой связки, или-же нѣсколько выше ея, начиная отъ *tubercum pubis*. Обнаживъ *fasciam superficialem*, узнаютъ по выступающимъ гроздьямъ жира наружное ваховое кольцо. Отъ него разсѣкаютъ однимъ ударомъ ножницъ весь ваховой каналъ, захватываютъ содержимое его въ пинцетъ *Koerberle* и изолируютъ *ligamentum rotundum* отъ *n. ileo-inguinalis*, жира и мышечныхъ и сухожильныхъ пучковъ *m. obliqui interni*. Изолировавъ, такимъ образомъ, связку на $\frac{1}{2}$ —