

178. Ludwig Pincus. — О терапевтическомъ примѣненіи горячаго (100° С.) водяного пара въ гинекологіи. — (Centr. f. Gynaec., № 11, 1895 г.).

Побуждаемый заявленіемъ проф. *Снегирева* о высококомъ достоинствѣ пара, какъ кровоостанавливающаго средства, авторъ примѣнилъ его въ 9 случаяхъ гинекологическихъ заболѣваній съ вполне удовлетворительнымъ успѣхомъ.

Съ этой цѣлью онъ примѣнилъ котелокъ ингаляціоннаго аппарата, къ которому были придѣланы предохранительный клапанъ и термометръ. Паръ выходилъ по цинковой трубкѣ, на наружный конецъ которой надѣвалась сѣрая резиновая трубка. Для проведения пара въ матку онъ пользовался сначала Фритчевскимъ катетеромъ, затѣмъ специально для этого приготовленнымъ инструментомъ, сходнымъ съ мужскимъ катетеромъ, но имѣющимъ меньшую кривизну и вмѣсто 2 окошечекъ, имѣвшемъ 3 продолговатыхъ отверстія. Для избѣжанія ожога пальцевъ при употребленіи, были придѣланы 2 специальныхъ штифтика.

Авторъ отмѣчаетъ слѣдующія детали при примѣненіи этого способа: паръ не долженъ проходить черезъ аппаратъ въ моментъ введенія его въ матку; дѣйствовать паромъ можно лишь короткое время— $\frac{1}{2}$ —1— $1\frac{1}{2}$  минуты; крайне важно, чтобы аппаратъ, вырабатывающій паръ, былъ снабженъ предохранительнымъ клапаномъ и чтобы введенный въ матку инструментъ имѣлъ большія отверстія. Примѣненіе этого способа показано лишь при заболѣваніи внутренней поверхности матки безъ сопутственнаго поражения придатковъ. Оно мало болѣзненно, легко примѣнимо и обыкновенно сопровождается рѣзкимъ улучшеніемъ состоянія. Нужно отмѣтить, что наблюденія автора продолжались лишь короткое время.

*Строгановъ.*

179. Gustav Woyer. (Изъ клиники проф. *Schauta*). — Случай эклампсіи у матери и ребенка. — (Centr. f. Gynaec., № 13, 1895 г.).

Теченіе и терапія даннаго случая настолько интересны, что я позволю себѣ дать подробный рефератъ его. 30 лѣтняя, перворождающая, доставлена въ клинику въ безсознательномъ состояніи. По словамъ родственниковъ она имѣла въ теченіи послѣднихъ 2 часовъ 2 судорожныхъ припадковъ. Вскорѣ по прибытіи наступилъ новый—3-й припадокъ судорогъ, 5 минутной продолжительности, характерныхъ для эклампсіи. Частота пульса около 120 въ минуту, сильные трахеальные хрипы, пѣна у рта, глубокой ціанозъ, сопорозное состояніе. Спустя нѣкоторое время состояніе нѣсколько