

ное шиваніе покрововъ не помогли: больная умерла черезъ сутки. Въ видѣ самоутѣшенія *D.* цитируетъ изв. америк. профессора *Lusk'a*, который считаетъ удачный исходъ кесарскаго сѣченія внѣ благоустроенныхъ заведеній—*чудомъ природы*„.

М. Гинзбургъ.

189. Prof. George W. Dobbin (Baltimore).—The Frequency of contracted pelvis in the Obstetrical service of the Johns Hopkins Hospital.—(American Journ. of the Obst. etc, 1897, VIII p. 145).—Частота суженныхъ тазовъ (въ Америкѣ).

Dobbin, проф. акушерской клиники одного изъ лучшихъ американскихъ университетовъ, *Johns Hopkins'a* въ Балтиморѣ, измѣрилъ 350 женщинъ, разрѣшившихся за послѣдній годъ въ его клиникѣ.

Изъ нихъ было:

	Общесуженныхъ.	Плоскихъ.	Плоск.-рахитическихъ.	Неправильн. формы. Коксальг.	Всего.	%
Американокъ 165.	4	6	1	2	13	7,74%
Негритянокъ 131.	9	3	12	0	24	1,32%
Иностранокъ 54.	1	0	1	1	3	5,55%

На 350 женщинъ неправильныхъ тазовъ было всего 40 или въ 11.7%. Эти цифры по *Dobbin'u* близки къ цифрамъ неправильныхъ тазовъ въ Германіи, гдѣ они по *Dohrn'u* встрѣчаются въ 12.18%. Что результаты *Dobbin'a* не обусловлены преобладаніемъ нѣмокъ въ средѣ женщинъ, обращающихся въ Балтиморскую клинику, видно изъ того, что *Dobbin* выдѣлилъ въ особую рубрику иностранокъ, а также бѣлыхъ и негритянскихъ женщинъ. Среди послѣднихъ аномаліи тазовъ чаще, чѣмъ среди бѣлыхъ женщинъ

М. Д. Гинзбургъ.

190. Dr. Pierre Mallet.—The Trendelenburgh position in Tumors of the Pelvis obstructing Labor.—(American Journ. of Obst., 1897, X, p. 846).—Тренделенбургское положеніе при опухоли въ тазу, препятствующей родамъ.

Dr. M. былъ приглашенъ другимъ врачомъ къ I роженицѣ, тазъ которой былъ выполненъ твердою опухолью, величиною съ головку доношеннаго ребенка; зѣвъ ощущывался надъ лобкомъ, а выше—головка плода. Автору пришла мысль испытать Тренделенбургское положеніе, т. е. заставить опухоль опуститься въ большой тазъ и провести головку плода мимо первой. Импровизовавъ упомянутое положеніе посредствомъ кресла, опрокину-

того ножками кверху, *М.*, по перекрытіи его матрацомъ, уложилъ на него захлороформированную роженицу. Надавливая на опухоль пальцемъ, введеннымъ во влагалище, автору удалось смѣстить ее кзади и кверху, при чемъ маточная шейка опустилась книзу на свое нормальное мѣсто. Тогда *М.* перемѣстилъ роженицу въ обыкновенное спинное положеніе и роды вскорѣ окончились силами природы. Колѣнно-локтевое положеніе роженицы можетъ дать такой же результатъ, но оно трудно переносится и хлороформированіе при немъ невозможно.

М. Д. Гинзбургъ.

191. **Dr. Macnaughton Jones** (Edinburg).—**Esthiomenie menstrual Ulcer of the Nose; its Treatment and Cure.**—(Edinb. med. J., 1897, X, p. 371).—**Разъѣдающая менструальная язва носа; лѣченіе ея.**

Интересъ этого случая состоитъ именно въ томъ, что язва сильно ухудшалась съ приближеніемъ регуль, бывшихъ у молодой женщины очень скудными, иногда всего по нѣсколько часовъ, а съ прекращеніемъ ихъ язва улучшалась.

Dr. Jones наблюдалъ больную въ теченіи многихъ мѣсяцевъ. На внутренней поверхности ея правой ноздри была не глубокая язва, покрытая тонкимъ бурымъ струпомъ, съ нѣсколько возвышенными краями и краснымъ воспалительнымъ ободкомъ. За 3—4 дня до регуль кожа носа краснѣла, становилась лоснящеюся, тонкій струпь язвы утолщался и темнѣлъ; по краямъ язвы появлялась эксудация, напоминавшая по виду оспенную пустулу: въ центрѣ—темный струпь, а по краямъ—свѣтлый красный ободокъ. Съ ухудшеніемъ въ мѣстномъ состояніи язвы появлялись и боли, ожесточавшіяся къ ночи; повышенія температуры не было.

Въ январѣ 96 г. *J.*, по консультаціи, сдѣлалъ выскабливаніе язвы; ткани были такъ тверды, что пришлось вырѣзать ихъ ножемъ; по прекращеніи регуль,—значительное улучшеніе.

Въ февралѣ ожесточеніе болѣе до того, что пациентка оставалась нѣсколько дней въ постели, въ полу-безсознательномъ состояніи. Большія дозы бромистыхъ препаратовъ, эрготинъ и *hydrastis*, тиронидинъ—не дали улучшенія. Болѣзнь захватила всю внутреннюю поверхность правой ноздри, а по кожѣ распространилась до губы; кожа лѣвой ноздри покраснѣла, начала лосниться. Горячіе носовые души ухудшали болѣзнь; рѣшено освѣжить язву и примѣнить *ас. nitric. fumans*, что и сдѣлано 7/II. 14/II вторичное освѣженіе язвы со смазываніемъ ея *ас. nitrico*