

194. **Dr. Baldy (Philadelphia).**—**A Case of Varicose vein of the broad ligament.**—(The American Journal of Obstetrics etc, 1897. p. 310).—**Варикозность венъ широкихъ связокъ (resp. случай, интересный и трудный въ діагностическомъ отношеніи).**

Больная консультировалась д-ра *Baldy* 3-мя годами раньше и тогда *B.* не находилъ нужнымъ операциі. Нѣкоторые врачи предполагали причиною ея болей переломъ копчика; но *Baldy* ни этаго, ни другихъ измѣненій въ тазу не находилъ. Исходная точка болей лежала высоко въ тазу; матка была нормальна, яичники немного увеличены, старый разрывъ шейки. Опущенія яичниковъ, діагностицированнаго другимъ гинекологомъ, *Baldy* тоже не находилъ. Возникалъ вопросъ, не воспалены ли маточно-крестцовыя связки, или не гнѣздится ли поврежденіе въ прямой кишкѣ? *B.* рѣшилъ произвести пробное чревосѣченіе. По вскрытіи живота при Тренделенбургской позиціи, выяснилось отсутствіе смѣщенія яичниковъ; послѣдніе, ф. трубы и широкія связки были интенсивно гиперемированы; на лѣвой широкой связкѣ замѣчались варикозныя расширенія венъ; изъ нихъ нѣкоторыя только на $\frac{1}{2}$ тоньше а. *radialis*. На правой сторонѣ расширенія венъ не было. Въ одномъ изъ яичниковъ замѣчалось начало кистознаго перерожденія. *B.* рѣшилъ вырѣзать широкую связку съ ф. трубами и яичникомъ лѣвой стороны. Послѣ операциі *B.* замѣтилъ варикозныя расширенія венъ на половыхъ губахъ и ногахъ. Боли, бывшія нѣсколько лѣтъ до операциі, послѣ нея совершенно прекратились.

М. Д. Гинзбургъ.

195. **Dr. Gustav Linke.**—**Case for Diagnosis.**—(Am. Journ. f. Obst. 1897, vjjj, p. 237).—**Діагностическая задача.**

36—лѣтняя женщина, подвергнувшаяся 3 года назадъ оваріотоміи, долгое время спустя упала, ударившись лѣвою ягодичною областью о выступъ тротуара; боль отъ ушиба длилась нѣсколько дней. Черезъ 4 мѣсяца у ней вновь появились боли въ лѣвой же сторонѣ, принятія за *ischias*, лѣчилась долго, но безуспѣшно. Больная не могла ходить отъ боли; стоя, она имѣла видъ страдающей поврежденіемъ тазо-бедреннаго состава: правая ягодичная область была на 2 дюйма ниже лѣвой, складка изглажена справа, а при ощупываніи снаружи влѣво замѣчалась ясная флюктуация. Лѣвая ягодичная область казалась нѣсколько опухшей. При изслѣдованіи больной въ лежачемъ положеніи опухоль совершенно исчезла; изслѣдованіе подъ хлороформомъ совмѣстно съ другимъ хирургомъ дало отрицательные результаты. Послѣ 2-хъ недѣль-

наго лежанія въ постели боли совершенно прекратились. При одномъ изъ повторныхъ осмотровъ больной проф. хирургіи *Conner* омъ, послѣдній оцупалъ въ тазу опухоль величиною съ грушу, на ножкѣ, исходящей изъ праваго synchondrosis sacro—iliac.; опухоль лежала на foramen ischiadicum правой стороны; опухоль казалась твердой, неподвижной. Предполагая, что это была грыжа, проф. *Conner* хотѣлъ сдѣлать операцію; но при новомъ изслѣдованіи per. rectum. оказалось, что опухоль исчезла и операція была отложена.

Dr. Linke предполагаетъ, что во время произведенной имъ 3 года назадъ оваріотоміи, имъ могло быть случайно произведено отверстіе въ широкой связкѣ, чрезъ которое по временамъ выпадаетъ книзу петля кишекъ и то, что *Conner* оцупалъ и принялъ за грыжу, была петля кишекъ, наполненная фекальными массами; авторъ не допускаетъ, чтобы это былъ гнойникъ, хотя однажды, при осмотрѣ больной двухъ створчатымъ зеркаломъ, въ сводѣ замѣчалось около чайной ложки гноя; при другихъ осмотрахъ гноя изъ влагалища не выходило. Больная вернулась домой въ сноскомъ состояніи здоровья, хотя при стояніи получалась прежняя картина.

М. Д. Гинзбургъ.

196. I. *Dr. G. E. Herman.*—A Case of partial Retroflexion of the gravid Uterus persisting till the end of the eighth month spontaneous Delivery.—(*Lancet*, 21 V 1898).—Частичное искривленіе кзади беременной матки, продолжавшееся до 8-го мѣсяца беременности; самопроизвольные (преждевременные) роды.

II. *Dr. William Simpson.*—Incarcerated retroflexed pregnant uterus with enormously distended Bladder.—(*Lancet*, 21 mai 1898, p. 1396).—Ущемленная искривленная кзади беременная матка съ огромнымъ растяженіемъ мочевого пузыря.

I. Женщина 27 л., перво-беременная, послѣднія регулы въ Іюнь 97 г. Въ ноябрѣ у ней появилось затрудненіе къ мочеиспусканію, такъ что 2 раза пришлось выпускать мочу катетеромъ; внутренняго изслѣдованія при этомъ не было сдѣлано. До февраля 1898 г. ничто не беспокоило беременную; возобновленіе болей заставило ее обратиться къ врачу, который, найдя ея состояніе очень серьезнымъ, направилъ ее въ больницу.

При осмотрѣ ея въ больницѣ (*London Hospital*) оказалось: въ животѣ опухоль отклоняющаяся нѣсколько вправо отъ средней линіи живота и достигающая до нижнихъ реберъ; сердцебіеніе