

228. М. М. Мироновъ.—Теплыя и горячія ванны во время менструаціи.—(Еженедѣльникъ, 1895 г., № 22).

Желая провѣрить наблюденія *Макавеева* надъ безразличнымъ и благотворнымъ дѣйствіемъ теплыхъ ваннъ при мѣсячныхъ, авторъ подвергалъ дѣйствию соленыхъ ваннъ въ 27°—28° менструирующихъ женщинъ на Славянскихъ минеральныхъ водахъ и описываетъ кратко семь такихъ наблюденій. Выводы изъ послѣднихъ таковы: общія соленыя ванны въ 27°—28° R. съ прибавкой нѣсколькихъ ведеръ щелока не производятъ никакихъ дурныхъ послѣдствій, напротивъ даже утоляютъ боли, причемъ количество теряемой крови или не измѣняется, или уменьшается. Другой рядъ наблюденій авторъ дѣлалъ съ общими или поясными теплыми ваннами въ 31°—33° R., безъ прибавки соли; изъ пяти наблюденій авторъ заключаетъ: у женщинъ съ нормальнымъ половымъ аппаратомъ ванны въ 32°—33° R., продолжительностью въ 20 минутъ не производятъ никакихъ вредныхъ вліяній на теченіе регулъ и даже уменьшаютъ количество теряемой крови. Въ третьемъ рядѣ (21 случай) наблюденій надъ дѣйствіемъ ваннъ на менструирующихъ, съ воспалительными измѣненіями въ тазовыхъ органахъ, получился тотъ же результатъ: ванны не усиливаютъ кровопотерь, иногда уменьшаютъ количество теряемой крови, и что наиболѣе важно, дѣйствуютъ болеутоляющимъ образомъ. *Н. Какушкинъ.*

229. С. А. Липинскій.—Случай рубцового суженія влагалища, оперированнаго по аутопластическому способу.—(Врачъ, 1895 г., № 25).

Крестьянка 21 года, больна послѣ трудныхъ родовъ. Кольцевое суженіе въ нижней трети влагалища. Послѣ манипуляцій съ *Simon*'овскими расширителями была надорвана рубцовая ткань на задней стѣнкѣ до обнаженія кишечной стѣнки; потомъ образовался въ этомъ мѣстѣ кишечный свищъ. Надрѣзавъ боковыя части рубца и получивъ такимъ образомъ двѣ раневыя поверхности листообразной формы, авторъ перенесъ сюда и пришилъ малыя губы, отрѣзанныя у основанія (за исключеніемъ задняго конца) и распластанныя въ ширину разрѣзомъ, проведеннымъ по основанію. Мѣста, гдѣ малыя губы были отрѣзаны, закрыты швами. Всюду примѣнены шелковые швы, которые окончателно удалены на 8 день, давъ первичное натяженіе. Заднюю поверхность влагалищной стѣнки и свищъ авторъ закрылъ кожнымъ лоскутомъ, вырѣзаннымъ отвѣсно къ линіи промежности изъ ягодицъ. Оста-