

ислѣдователей, какъ по вопросу о содержаніи бактерій въ шейк-беременныхъ и не беременныхъ, такъ и о содержаніи въ полоуѣвомъ каналѣ патогенныхъ микробовъ. Онъ приходитъ къ заключенію, что необходимы новыя изслѣдованія въ этомъ направленіи. Однако можно замѣтить, что методы, примѣнявшіеся имъ самимъ, онъ считаетъ недостаточными и напротивъ методы, давшіе въ результатъ выводъ о стерильности въ области внутренняго зѣва и даже большей части шейки, считаетъ наиболѣе научными.

187. **Emilio Curatulo.** — Вліяніе удаленія яичниковъ на обмѣнъ веществъ. (Centr. f. Gynaec., № 21, 1895 г.).

Стараясь выяснитъ механизмъ терапевтическаго дѣйствія удаленія яичниковъ на остеомалачію, авторъ произвелъ рядъ опытовъ на сукахъ, кастрируя ихъ и изслѣдуя вліяніе этого на обмѣнъ веществъ. Оказалось, что уже нѣсколько дней спустя послѣ операціи, было замѣчено рѣзкое уменьшеніе количества фосфорной кислоты въ мочѣ соотвѣтственныхъ животныхъ (до кастраціи среднимъ числомъ 1,50 фосфорной кислоты въ сутки, послѣ нея 0,6). Такое состояніе держалось въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Авторъ дѣлаетъ предположеніе, не выдѣляетъ-ли яичникъ особое вещество въ кровь (согласно теоріи *Бруунъ-Секара*), способствующее усиленному выдѣленію фосфора изъ организма. На основаніи своихъ опытовъ, авторъ думаетъ, что полезное дѣйствіе кастраціи на остеомалачію находитъ въ этомъ солидное подтвержденіе.

188. **Alexander Rosner.** — Объ удаленіи всей матки съ помощью термокаутера для устраненія прививныхъ рецидивовъ. (Über die sog. Thermocauterectomia uteri totalis zur Verhütung von Imfrecidiven).

Авторъ вполне раздѣляетъ мнѣніе *Winter*'а о заразительности рака. Онъ приводитъ одинъ убѣдительный случай въ этомъ отношеніи изъ собственной практики, а именно, у больной, подвергшейся двусторонней эпизіотоміи при удаленіи всей матки, черезъ нѣкоторое время послѣ операціи были констатированы рецидивы, при чемъ имѣлось раковое пораженіе на мѣстѣ бывшей эпизіотоміи. Очевидно, здѣсь имѣлось зараженіе во время операціи. Желая устранить возможность послѣдняго, проф. *Jordan* рѣшился замѣнить (глѣ возможно) термокаутеромъ ножъ и ножницы при удаленіи раково-пораженной матки черезъ влагалище. Операція

обыкновенно производится такимъ образомъ, что влагалище разсѣкается ножомъ и мочевой пузырь отдѣляется отъ матки обычнымъ тупымъ способомъ. Широкия связки захватываются въ рядъ зажимовъ и съ маточной стороны отсѣкаются термокаутеромъ. Въ послѣднее время слизистая оболочка передняго влагалищнаго свода отжигается также термокаутеромъ и кромѣ того послѣ наложенія двухъ первыхъ зажимовъ съ обѣихъ сторонъ термокаутеромъ-же производится отсѣченіе пораженной части шейки.

Всѣ четыре случая, оперированныя этимъ путемъ, имѣли вполне хорошее послѣ-операционное теченіе.

189. Albert Sippel.—О примѣненіи внутри маточныхъ палочекъ.

Авторъ на основаніи многочисленныхъ и продолжительныхъ наблюденій высказывается въ пользу лѣченія внутриматочными пессаріями такихъ загибовъ матки впередъ, гдѣ имѣется лишь ослабленіе маточной ткани (безъ какихъ либо воспалительныхъ явленій какъ въ маткѣ, такъ и въ ея окружности), и гдѣ обыкновенно каналъ шейки представляется достаточно широкимъ. Онъ признаетъ этотъ способъ за очень серьезное вмѣшательство, могущее причинить большой вредъ при неправильномъ примѣненіи, тѣмъ не менѣе самъ никогда не видѣлъ дурныхъ послѣдствій. Результаты во многихъ случаяхъ были блестящіе—женщины, совершенно неспособныя къ работѣ вслѣдствіе дисменоройныхъ явленій, совершенно оправлялись. Палочки носились мѣсяцами безъ всякихъ болѣзненныхъ явленій. При примѣненіи требуется самая строгая антисептика и выборъ соотвѣтственнаго пессарія.

В. Строгановъ.