жидкости; въ задней и передней стѣнкахъ были небольшія твердыя міомы. *D-r Thring* отрѣзалъ большую стебельчатую опухоль, вырѣзалъ яичники и трубы съ обѣихъ сторонъ; матку и обѣ маленькія опухоли не трогалъ.

A) По поводу этихъ случаевъ, *D-r Thring* замѣчаетъ:

1) Чревосѣченіе, необходимое для удаленія опухоли, имѣетъ въ началѣ операціи и діагностическое значеніе. 2) Перевязкой сосудовъ со стороны влагалища мы обезпечиваемъ себя отъ кровотеченій, дѣлаемъ эластическую лигатуру на нижнюю часть ея излишней и получаемъ возможность отсепаровать мочевой пузырь и мочеточники безъ поврежденія ихъ. 3) *Дренажъ черезъ влагалище очень полезенъ при разрывѣ обширныхъ срощеній,* гдѣ можно ожидать значительнаго серознаго выпота.

B) Терапія множественныхъ твердыхъ міомъ и единичныхъ большихъ не одинакова. Множественныя опухоли встрѣчаются чаще; онѣ разстроиваютъ здоровье, но не опасны для жизни. *Thring* не совѣтуетъ вырѣзать ихъ, а давать *эрготинъ*; такъ какъ онѣ всегда осложняются эндометритомъ, то *выскабливаніе* уменьшаетъ на время кровотеченія. Способъ *Apostoly* во многихъ случаяхъ безполезенъ, иногда—вреденъ, эти міомы подъ вліяніемъ беременности иногда разсасываются, съ климактеріемъ—атрофируются. При сильныхъ кровотеченіяхъ, боляхъ и другихъ болѣзненныхъ явленіяхъ (давленіе на почки и т. п.) *Thring* совѣтуетъ *вырѣзать придатки*, хотя, при невозможности послѣдняго вслѣдствіе срощеній, надо быть готовымъ на полную экстирпацію матки.

Большія единичныя фиброміомы болѣе разстраиваютъ здоровье и угрожаютъ жизни; онѣ встрѣчаются въ болѣе пожиломъ возрастѣ и быстро разростаются, клинически онѣ похожи на злокачественныя новообразованія и микроскопъ указываетъ ихъ сходство съ саркомой. Климактеріумъ или вырѣзаніе яичниковъ не вліяютъ на опухоль, еще менѣе внутреннія лекарства или способъ *Apostoly*, а вѣрнѣйшее средство—полная экстирпація матки.

М. Гинзбургъ.

---

197. **D-r Reinolds, Jewett и др.—The Treatment of the Face Presentation.** (New-York Medic. Journ., 1894, 21/VII, p. 88). **Пособіе при лицевыхъ предлежаніяхъ.**

D-r Reinolds (Boston) возбудилъ этотъ вопросъ на 19 годичномъ засѣданіи Американскаго Гинекологическаго Общества. *R.* совѣтуетъ при обыкновенныхъ условіяхъ, т. е. при переднихъ видахъ

и необходимости ускорить роды, послѣ истеченія водъ—анестезировать роженицу и произвесть сгибаніе головки, при заднихъ видахъ—поворотъ на ножки; при невозможности поворота или сгибанія головки—щипцы, даже при заднихъ видахъ.

Д-ра *Jewett* (Brooklin), *Noble*, *Davis* и *Murray*—предпочитаютъ въ трудныхъ случаяхъ произвести симфизеотомію. *Davis* произвелъ 4 раза эту операцію съ благопріятнымъ исходомъ.

D-r H. D. Fry примѣняетъ въ трудныхъ случаяхъ лицевыхъ предлежаній нѣчто въ родѣ Тренделенбургскаго положенія съ приподнятіемъ ягодицъ и опусканіемъ ногъ въ висячемъ положеніи, при чемъ всѣ манипуляціи въ тазу анестезированной роженицы облегчаются.

Президентъ Общества, д-ръ *Lusk* поддержалъ оба противуположныя мнѣнія, т. е. гдѣ возможно, онъ совѣтуетъ перевести лицевыя въ затылочныя положенія *путемъ сгибанія головки, а гдѣ это невозможно—симфизеотомію.* *М. Гинзбургъ.*

---

198. Dr **Dimmock.—Quinine in Pregnancy.**—(New-Jork Med. Journ., 1894, 14/VII, p. 29). **Назначеніе хинина беременнымъ.**

Dr Dimmock, практиковавшій долго въ Индіи, въ мѣстности, гдѣ было много тяжелыхъ малярійныхъ болѣзней, увѣряетъ, что беременныя переносили огромныя дозы хинина, не вызывавшаго у нихъ выкидыша, а на оборотъ, предупреждавшаго выкидышъ, если онѣ начинали принимать хининъ въ началѣ заболѣванія маляріей. Происхожденіе выкидыша, если онъ случался, *D.* приписываетъ малярійному яду. Пользу хинина въ родахъ, при слабости потугъ или его мѣсячногонное свойство, *D.* считаетъ результатомъ тоническаго дѣйствія хинина, а не специфическаго вліянія на сокращеніе матки. Д-ръ *М. Гинзбургъ.*

---

199. **Dr P. Davis, проф. Mann и др.—Fatal Nausea and Vomiting of Pregnancy.**—(New-Jork Medic. Journ., 1894, 28/VII, p. 121). **Смертельная тошнота и рвота у беременныхъ.**

200. **Dr Terrel.—The Black vomit of Pregnancy.**—(Ibid, 18/VIII p. 212). **Черная рвота у беременныхъ.**

Dr *Davis* сообщилъ о *трехъ* случаяхъ рвоты беременныхъ, кончившихся летально. Въ первомъ изъ нихъ беременная болѣла гастрическими разстройствами до беременности; рвоты были у ней безпрерывныя и очень истощили ее. Она умерла на 2 мѣсяцѣ беременности. Передъ смертью у ней появилась пятнистая сыпь въ видѣ петехій. Во второмъ случаѣ сильныя тошноты и рвоты насту-