

и необходимости ускорить роды, послѣ истечения водъ—анестезировать роженицу и произвести сгибаніе головки, при заднихъ видахъ—поворотъ на ножки; при невозможности поворота или сгибанія головки—щипцы, даже при заднихъ видахъ.

Д-ра *Jewett* (Brooklin), *Noble*, *Davis* и *Murray*—предпочитають въ трудныхъ случаяхъ произвести симфизеотомию. *Davis* произвелъ 4 раза эту операцію съ благопріятнымъ исходомъ.

Д-р *H. D. Fry* примѣняетъ въ трудныхъ случаяхъ лицевыхъ предлежаній нѣчто въ родѣ Тренделенбургскаго положенія съ приподнятіемъ ягодицъ и опусканіемъ ногъ въ висячемъ положеніи, при чемъ всѣ манипуляціи въ тазу анестезированной роженицы облегчаются.

Президентъ Общества, д-ръ *Lusk* поддержалъ оба противоположныя мнѣнія, т. е. гдѣ возможно, онъ совѣтуетъ перевести лицевыя въ затылочные положенія *путемъ сгибанія головки, а гдѣ это невозможно—симфизеотомию.* *М. Гинзбургъ.*

198. Dr *Dimmock*.—*Quinine in Pregnancy.*—(New - York Med. Journ., 1894, 14/vii, p. 29). **Назначеніе хинина беременнымъ.**

Dr Dimmock, практиковавшій долго въ Индіи, въ мѣстности, гдѣ было много тяжелыхъ малярійныхъ болѣзней, увѣряетъ, что беременныя переносили огромныя дозы хинина, не вызывавшаго у нихъ выкидыша, а на оборотъ, предупреждавшаго выкидышъ, если онѣ начинали принимать хининъ въ началѣ заболѣванія маляріей. Происхожденіе выкидыша, если онъ случался, *D.* приписываетъ малярійному яду. Пользу хинина въ родахъ, при слабости потугъ или его мѣсячногонное свойство, *D.* считаетъ результатомъ тоническаго дѣйствія хинина, а не специфическаго вліянія на сокращеніе матки.

Д-ръ *М. Гинзбургъ.*

199. Dr *P. Davis*, проф. *Mann* и др.—*Fatal Nausea and Vomiting of Pregnancy.*—(New - York Medic. Journ., 1894, 28/vii, p. 121). **Смертельная тошнота и рвота у беременныхъ.**

200. Dr *Terrel*.—*The Black vomit of Pregnancy.*—(Ibid, 18/viii p. 212). **Черная рвота у беременныхъ.**

Dr Davis сообщилъ о *трехъ* случаяхъ рвоты беременныхъ, кончившихся летально. Въ первомъ изъ нихъ беременная болѣла гастрическими разстройствами до беременности; рвоты были у ней непрерывныя и очень истощили ее. Она умерла на 2 мѣсяцѣ беременности. Передъ смертію у ней появилась пятнистая сыпь въ видѣ петехій. Во второмъ случаѣ сильныя тошноты и рвоты насту-