

205. Dr. J. A. Hamilton, (хирургъ гинекологич. отдѣл. больницы въ Adelaide, въ Австраліи).—**A case of intra-peritoneal Haematocoele.**—(Australasian Med. Gaz., 1894, 15/xii, p. 377). **Внутри-брюшинное кровоизліяніе.**

А., 26 лѣтъ, годъ назадъ родила и была здорова. Въ іюлѣ ожидаемыхъ регулъ не было; въ началѣ августа, не желая быть беременной, она продѣлала рядъ гимнастическихъ фокусовъ и 7/viii дѣйствительно у нея появились небольшія крови съ болью, которыя усилились и заставили ее слечь въ постель. 17/viii при осмотрѣ ея: матка въ anteflexio, не увеличена; влѣво замѣчается опухоль, величиною съ апельсинъ, занимающая Дугласово пространство, упругой консистенціи. Небольшія крови, боли спазмодическаго характера, распространяющіяся къ apus. 19/viii по причинѣ усиленія болей—второе изслѣдованіе подъ анестезіей эфиромъ, не указало ничего новаго. 20/viii—*операция*. Въ полости живота крови не было и Н. подумалъ было, что имѣетъ дѣло съ *внутри-брюшиннымъ* кровоизліяніемъ; но отодвинувъ въ сторону часть кишекъ, нѣкоторыя петли ихъ и сальникъ оказались сросшимися съ лѣвой стороной матки; сращения легко разъединены и подъ ними оказалась полость, наполненная темными кровяными свертками; Фаллопиева труба, перекрученная кзади и книзу, и яичникъ были покрыты этими кровяными свертками. Мѣшокъ или киста состояла, такимъ образомъ, изъ Дугласова пространства внизу и слипшихся кишекъ сверху, совершенно отдѣляясь отъ остальной полости брюшины. Фаллопиева труба была удалена и въ ней оказался разрывъ вблизи ея брюшнаго конца, кровоизліяніе, видно, было не значительное и не свѣжее. Зародыша не найдено: вѣроятно, эта была беременность заносомъ (mola), такъ какъ микроскопическимъ изслѣдованіемъ свертковъ, на ихъ поверхности открыты ворсинки chorii. Въ правомъ яичникѣ была стебельчатая киста, почему Hamilton вырѣзалъ и его. Выздоровленіе гладкое.

М. Гинзбургъ.

206. Проф. Cosey A. Wood (Chicago).—**Puerperal Panophthalmitis due to septic Embolism.**—(American Journ. of Obstetrics, 1894, V, p. 635).—**Послѣродовой панофтальмитъ, обусловленный септической эмболией.**

О происхожденіи панофтальмита у родильницъ вообще мало извѣстно; даже такіе ученые какъ Playfair и Garrigues излагаютъ въ своихъ учебникахъ, будто болѣзнь, начинаясь съ конъюнктивы, проникаетъ вглубь, прободая стекловидное тѣло и роговую оболочку.