

216. **Dr. W. B. Dorsett**, (изъ St.-Louis въ Америкѣ).—**Ligation of the Uterine Arteries for the Cure of Fibroid Tumors and Checking Haemorrhage.** (New-York Med. Journ., 1894, 3/xi, p. 567). **Перевязка маточныхъ артерій ради излѣченія фиброидовъ и остановки кровотеченій.**

Dr. *Dorsett* оспариваетъ у другихъ честь перваго примѣненія названнаго способа, ссылаясь на производство имъ этой операціи еще 1889 г., о чемъ онъ сообщилъ медицинскому обществу въ St.-Louis 17/у 1890 г. и что было опубликовано имъ въ St.-Louis Courier of Medecine въ томъ же году. *М. Гинзбургъ.*

217. **Prof. Howard Kelly.**—**The advantage of atmospheric Distension of the Rectum with Dislodgment of the small Intestines in the bimanual Examination of Uterus, Ovaries and Tubes.**—(American J. of Obstetrics, 1894, V, p. 607).—**Выгоды растяженія recti воздухомъ со смѣщеніемъ тонкихъ кишекъ при комбинированномъ изслѣдованіи матки и ея придатковъ.**

При простомъ изслѣдованіи черезъ прямую кишку петли тонкихъ кишекъ, спускаясь книзу, затемняютъ дѣло, симулируя кистовидно-измѣненный яичникъ, особенно если петли кишекъ наполнены жидкимъ содержимымъ. *Howard Kelly*, давно уже занимающійся этимъ способомъ изслѣдованія, усовершенствовалъ его нынѣ слѣдующимъ образомъ.

Послѣ предварительной очистки кишечника и пузыря, женщинѣ даютъ колѣно-локтевое положеніе и, введеніемъ въ прямую кишку зеркала, даютъ воздуху растянуть кишку, при чемъ петли тонкихъ кишекъ смѣщаются книзу; вынувъ зеркало, переворачиваютъ больную въ спинное положеніе и изслѣдуютъ ее. При этомъ стѣнка прямой кишки, прилегая плотно къ маткѣ и ея придаткамъ, даетъ возможность точно опредѣлить мельчайшія измѣненія въ ихъ очертаніи, безъ помѣхи къ тому со стороны петель тонкихъ кишекъ etc. Статья иллюстрирована 3-мя рисунками, указывающими разницу въ расположеніи органовъ таза при растянutomъ rectum и безъ того. *М. Гинзбургъ.*

218. **Billiteri.**—**Two congenital cases of Roberts pelvis.**—(Teratologia, 1895, april, p. 125).—**Два случая поперечно-суженныхъ тазовъ врожденнаго происхожденія.**

Названная аномалія наблюдалась у 2-хъ сестеръ, почему *Ballantine* допускаетъ, что она была у нихъ врожденною. Одна изъ сестеръ забеременѣла и разрѣшена посредствомъ операціи: