

кесарское сѣченіе по способу *Porro* съ благополучнымъ исходомъ для матери и ребенка.

М. Гинзбургъ.

219. **Grimsdale.—General foetal Dropsy.**—(Teratologia, 1895, april, p. 131).—**Общая водянка ребенка.**

У беременной замѣчались альбуминурія, отеки и *hydramnion*; у плода: водянка живота и общая водянка тѣла его. Роды затянулись и могли быть окончены только послѣ прокола живота ребенка съ выпусченіемъ жидкости. Огромный хрупкій послѣдъ. (*Рецф.* описалъ подобный случай: „Водянка у матери съ увеличеніемъ печени; водянка плода, затрудненное извлеченіе его туловища“. Причиною оказался сифилисъ. Опубликовано въ *Медиц. Обзор.*, 1879 г., т. XII, p. 779).

М. Гинзбургъ.

220. **Dr. Ralf Worrall. (Sydney).—Six consecutive Vaginal, Hysterectomies for Cancer.**—(The Australasian Medic. Gaz., 1895, January 15, p. 12—14).—**Шесть случаевъ вагинальнаго вырѣзанія матки по причинѣ рака.**

Съ января 1892 г. д-ръ *Worrall* произвелъ шесть операций удаленія матки съ благополучнымъ исходомъ. Возрастъ больныхъ былъ: 17, 32, 38, 39, 43 и 52 года. Одна была незамужняя, остальные многорожавшія; кровотеченія до операціи продолжались въ теченіи многихъ мѣсяцевъ у 5 и только у одной—3 года. Мѣсто пораженія было: тѣло матки въ 3-хъ, шейка въ 2-хъ, влагалищная порція въ 1-мъ случаѣ; въ послѣднемъ ракъ перешелъ на заднюю стѣнку влагалища, а въ 2-хъ случаяхъ рака шейки—пораженіе распространялось снаружи на параметріумъ, снутри, по слизистой оболочкѣ, на тѣло матки.

Лигатуры употреблены въ 5 случаяхъ; въ одномъ—жомы, потому что сращения были такъ обширны, что наложеніе лигатуръ оказалось невозможнымъ.

Дренажъ изъ марли примѣненъ 4 раза. Въ 5 случаяхъ брюшинные и влагалищные лоскуты были шиты.

Возвратъ рака появился и обусловилъ смерть 2-хъ больныхъ: одной черезъ 4, другой черезъ 11 мѣсяцевъ; остальные 4 здоровы. Со времени операціи прошло 27, 23, 21 и 12 мѣсяцевъ.

Worrall высказывается, что операція оправдывается, если мы можемъ облегчить больныхъ даже на 6 мѣсяцевъ; смертность отъ самой операціи у искусныхъ хирурговъ равна 5%—10%. За то извѣстны случаи выздоровленія съ промежуткомъ послѣ операціи въ 3—5, даже до 10 лѣтъ. Полное выздоровленіе было бы