

кесарское сѣченіе по способу *Porro* съ благополучнымъ исходомъ для матери и ребенка.

М. Гинзбургъ.

219. **Grimsdale.—General foetal Dropsy.**—(Teratologia, 1895, april, p. 131).—**Общая водянка ребенка.**

У беременной замѣчались альбуминурія, отеки и *hydramnion*; у плода: водянка живота и общая водянка тѣла его. Роды затянулись и могли быть окончены только послѣ прокола живота ребенка съ выпусченіемъ жидкости. Огромный хрупкій послѣдъ. (*Рецф.* описалъ подобный случай: „Водянка у матери съ увеличеніемъ печени; водянка плода, затрудненное извлеченіе его туловища“. Причиною оказался сифилисъ. Опубликовано въ *Медиц. Обзор.*, 1879 г., т. XII, p. 779).

М. Гинзбургъ.

220. **Dr. Ralf Worrall. (Sydney).—Six consecutive Vaginal Hysterectomies for Cancer.**—(The Australasian Medic. Gaz., 1895, January 15, p. 12—14).—**Шесть случаевъ вагинальнаго вырѣзанія матки по причинѣ рака.**

Съ января 1892 г. д-ръ *Worrall* произвелъ шесть операций удаленія матки съ благополучнымъ исходомъ. Возрастъ больныхъ былъ: 17, 32, 38, 39, 43 и 52 года. Одна была незамужняя, остальные многорожавшія; кровотеченія до операціи продолжались въ теченіи многихъ мѣсяцевъ у 5 и только у одной—3 года. Мѣсто пораженія было: тѣло матки въ 3-хъ, шейка въ 2-хъ, влагалищная порція въ 1-мъ случаѣ; въ послѣднемъ ракъ перешелъ на заднюю стѣнку влагалища, а въ 2-хъ случаяхъ рака шейки—пораженіе распространялось снаружи на параметріумъ, снутри, по слизистой оболочкѣ, на тѣло матки.

Лигатуры употреблены въ 5 случаяхъ; въ одномъ—жомы, потому что сращения были такъ обширны, что наложеніе лигатуръ оказалось невозможнымъ.

Дренажъ изъ марли примѣненъ 4 раза. Въ 5 случаяхъ брюшинные и влагалищные лоскуты были шиты.

Возвратъ рака появился и обусловилъ смерть 2-хъ больныхъ: одной черезъ 4, другой черезъ 11 мѣсяцевъ; остальные 4 здоровы. Со времени операціи прошло 27, 23, 21 и 12 мѣсяцевъ.

Worrall высказывается, что операція оправдывается, если мы можемъ облегчить больныхъ даже на 6 мѣсяцевъ; смертность отъ самой операціи у искусныхъ хирурговъ равна 5%—10%. За то извѣстны случаи выздоровленія съ промежуткомъ послѣ операціи въ 3—5, даже до 10 лѣтъ. Полное выздоровленіе было бы

чаще, если бы случаи рака диагностировались въ раннихъ періодахъ болѣзни. Не болѣе 5—10% всѣхъ случаевъ рака попадаютъ къ хирургамъ въ томъ періодѣ болѣзни, когда предсказаніе можетъ быть вѣрнымъ въ благопріятномъ смыслѣ. Не только публика, но и *масса врачей* виноваты въ небрежномъ отношеніи къ неправильнымъ отдѣленіямъ (бѣли, крови etc), полового канала женщинъ, особенно постарше, когда всѣ эти разстройства сваливаютъ на приближающійся климактерическій возрастъ.

Разрывы шейки съ выворотомъ губъ *Worral* считаетъ predisполагающимъ моментомъ къ пораженію ракомъ отъ тренія о стѣнки влагалища и при coitus'ѣ и проповѣдуетъ немедленное зашиваніе разрывовъ.

Изъ казуистики *Worral'*я приведу примѣры, показывающіе, что и въ отчаянныхъ случаяхъ операція спасаетъ больныхъ отъ тяжелыхъ страданій, хотя бы на нѣсколько мѣсяцевъ.

38 лѣтъ, многорожавшая, 9 мѣсяцевъ страдаетъ болями въ маткѣ и кровянистыми отдѣленіями, сильно похудѣла; послѣдніе 4 мѣсяца боли жестоки, осложняясь рвотой. Ноги отечны, матка неподвижна, дно ея на серединѣ пространства между лобкомъ и пупкомъ, поверхность ея неправильной формы шейка увеличена, сливается (?) со сводами; каналъ ея тѣстоватъ, съ разраженіями, простирающимися кверху въ тѣло матки. Острой ложкой удалена огромная масса хрупкой ткани. Видно, что болѣзнь вызвала уже ограниченный перитонитъ и только по настоятельной просьбѣ больной *Worral* согласился на операцію. Изъ за обширныхъ сращеній удаленіе придатковъ, наложеніе лигатуръ и другіе техническіе приемы не могли быть примѣнены, на кровоточащія мѣста пришлось наложить жомы и больная все таки перенесла операцію и здоровою вернулась домой.

Рецидивъ рака убилъ ее черезъ нѣсколько мѣсяцевъ.

Случай 2-й. 52 лѣтъ, многорожавшая, обильныя регулы 3—4 года уже, а послѣдніе 2 недѣли сильныя кровотеченія, жестокиа боли въ спинѣ, паховыхъ областяхъ и ягодицахъ. Матка увеличена, 3½ дюйма длины, отечна. 25/vi, 92 г., выскабливаніе съ впрыскиваніемъ іода; удалено много грануляціонной ткани. 19/x вторичное выскабливаніе. Крови не прекратилась. 31/x *истеректомія*. По причинѣ сращеній придатки удалены отдѣльно. Дренажъ Дугласова пространства марлей и нѣсколько швовъ на каждый изъ боковыхъ сводовъ. Гладкое выздоровленіе. Оперированная по настоящее время здорова.

М. Гинзбургъ.