

## б) А н г л і й с к о й.

243. Dr. John D. Malcolm.—Illustration of some Modes of Death from Ovariotomy.—(Lancet., 1895, 12/v, p. 93).—Нѣкоторыя причины смерти послѣ оваріотомії.

Д-ръ *Malcolm* сообщилъ Лондонскому Королевскому медико-хирургическому обществу перечень всѣхъ, встрѣтившихся въ его практикѣ случаевъ смерти послѣ оваріотомії съ результатами вскрытий, выяснившими причины смертельнаго исхода. (Такое сообщеніе, полагаю, поучительнѣй, чѣмъ рядъ успешныхъ случаевъ этой операциіи.—*Ред.*).

№ 1.—Дермоидная киста съ прободеніемъ въ кишку. Во время операциіи часть опухоли, приросшую къ flexura sigmoidea, нельзя было отдѣлить и операторъ укрѣпилъ ее внѣ-брюшинно, въ нарочно для этого сдѣланномъ отверстіи въ покровахъ живота въ лѣвой паховой области. Припадки непроходимости кишечка обнаружились на 3-й день, рана въ паху стала исходнымъ пунктомъ болѣзни. Смерть на 6-й день. Вскрытие: отсутствіе общаго перитонита; непроходимость кишечка произошла путемъ приращенія здоровой тонкой кишки къ ложкѣ яичника на правой сторонѣ. На лѣвой сторонѣ—нагноеніе въ области паховой раны, ограниченное участкомъ сросшейся брюшины.

№ 2.—Разорвавшаяся опухоль яичника съ фунгозными разрашеніями на ней и внутри ея. Полное удаление опухоли. На 9-й день—припадки непроходимости кишечка, постепенно ухудшавшіеся, на 34-й день—вторичная операциія съ цѣлью отыскать ущемленіе, которое было обусловлено перемычками впереди flexurae sigmoidea, чрезвычайно растянутой. Частица культи выше лигатуры отдѣлилась въ видѣ струпа, но не вызвала нагноеніе въ брюшинѣ. Черезъ 14 часовъ послѣ вторичной лапаротоміи больная умерла. Смерть приписана измѣненіямъ въ flexura sigmoidea, но не перитониту, вслѣдствіе отпаденія частицы культи. Опухоль оказалась не злокачественной.

№ 3.—Опухоль тѣстоватой консистенціи, исходившая изъ полости таза и достигавшая до реберъ, съ явной флюктуаціей; сращенія на всей поверхности ея. Смерть отъ шока.

№ 4.—Двухсторонняя оваріальная киста и фиброма матки. Опухоли были удалены. Смерть на 12-й день отъ закупорки vena iliaca, наступившей часовъ за 6 до смерти, по прижизненному діагнозу.

№ 5.—Лопнувшая коллоидная киста у 60-лѣтней женщины. Вскрытие указало: многочисленные атрофированные фибромы матки, расширение полости ея. При жизни предполагалась злокачественная опухоль матки. Отдѣленіе изъ матки прекратилось на 4-й день послѣ операции, появился большой жаръ и на 6-й день больная умерла.

№ 6. — Двѣ яичниковые опухоли, сращенные съ маткою, смѣщенію ими въверху. Въ 1891 г. д-ръ *Malcolm* сдѣлалъ проколъ съ диагностическою цѣлью, указавшій злокачественный характеръ опухоли. Такъ какъ клиническія явленія не протекали скрытно, то вырѣзаніе опухолей произведено черезъ 2 года. Смерть отъ шока.

Д-ръ *Malcolm* не наблюдалъ у оперированныхъ имъ соскальзывающей лигатуры или септицеміи.

Авторъ дѣлаетъ слѣдующіе выводы:

а) Точное опредѣленіе добро или злокачественности опухоли невозможно до операции; также невозможно иногда совершенно вырѣзать даже доброкачественную опухоль. Поэтому выборъ случаевъ для операций—очень трудная задача; авторъ протестуетъ противъ тѣхъ врачей, которые требуютъ оперировать всѣ представляющіеся случаи безъ разбора.

б) Септицемію—наиболѣе частую причину смерти послѣ овариотоміи—можно избѣжать тщательною чистотою.

с) Непроходимость кишечнаго просвета послѣ этихъ операций также даетъ значительную смертность.

*M. Гинзбургъ.*

244. Dr. Albert Green.—A Case of Post-Mortem Parturition.—(Lancet., 1895, 5/1, p. 27).—Случай родовъ послѣ смерти (съ выворотомъ матки и разрывомъ промежности).

20-лѣтняя девушка, на столько тучная, что ея родители, у которыхъ она жила, не замѣчали ея беременности, дошедшей до нормального срока, внезапно заболѣла головной болью; ночью у ней появились конвульсіи. Приглашенный врачъ нашелъ ее въ безсознательномъ состояніи; приступы конвульсій были по 3—4 раза въ часъ, болѣе тонического, чѣмъ клонического характера, языкъ былъ прикушенъ, зрачки расширены. Докторъ заподозрилъ отравленіе какимъ-нибудь алколоидомъ. Утромъ больная умерла, не разрѣшившись. Двѣ женщины, обмыvавшія умершую и уложившія ее на столъ, не замѣтили у неї выхожденія ребенка; они прикрыли ее простыней, которую не было повода рисковать двое сутокъ, до судебнно-медицинского осмотра трупа д-ромъ *Green'omъ*. Послѣдній, снявъ простыню, увидѣлъ, что между ногами покойницы лежалъ