мертвый новорожденный ребенокъ, ногами книзу, головкою у помовыхъ органовъ матери, т. е. предлежавшій ягодицами; изъполовыхъ органовъ умершей торчала мясистая круглая масса, оказавшаяся выворотившимся дномъ матки съ не отдѣлившимся отъ него послѣдомъ; пуповина была очень коротка. Слѣдовъ кровотеченія или стустковъ не было замѣтно. Промежность родильницы оказалась разорванной. Животъ ея былъ сильно вздутъ и при надрѣзѣ изъ него вышло огромное количество газовъ. Въ органахъ живота и груди никакихъ патологическихъ явленій не было. Въ желудкѣ и кишкахъ, отосланныхъ въ химическуюлабораторію, стрихнина не найдено.

Случай этотъ указываетъ, что роды, начавшіеся, вѣрно, при жизни, произошли путемъ посмертныхъ сокращеній матки и дѣйствія развившихся въ ней газовъ; изгоняющая сила была такъвелика, что при короткости пуповины, произвела выворотъ матки и разрывъ промежности.

М. Гинзбургъ.

245. Dr. James Murphy.—Abdominal Section during Pregnancy.—(Lancet., 1895, 19/1, p. 148).—Чревосъченія во время беременности.

22-льтняя женщина съ кистою льваго яичника, причинявшею ей значительныя боли, считая себя беременною въ 2 мфсяца, обратилась къ д-ру Мигрhy за совътомъ; онъ не нашелъ повода къ немедленному производству операціи. Черезъ короткое время у больной вдругъ появился колляпсъ, въ живот в прощупывалась жидкость. Murphy тотчась же произвель подъ хлороформомъ разрёзъ живота, при чемъ изъ последняго выдёлилось до 20 унцъ жидкой крови, и промыль полость брюшины борнымъ растворомъ. Матка оказалась увеличенной, объ трубы и яичники здоровымино близь праваго яичника найдено кровоточащее мъсто въ разорвавшейся ложной оболочкъ, которою яичникъ былъ прикръпленъ въ Дугласовомъ пространств. При поднятіи беременной матки кверху оболочка надорвалась и дала обильное кровотеченіе, въроятно не за долго до операціи. По перевязкъ кровоточащей оболочки, операція закончена; выздоровленіе гладкое. Беременность продолжалась и больная разрёшилась въ срокъ живымъ ребенкомъ.

27-лѣтняя женщина, на 3-мъ мѣсяцѣ, страдала кистой праваго ямчника, величиною съ гусиное яйцо, причинявшей ей сильныя боли. Вырѣзаніе ямчника съ гладкимъ выздоровленіемъ. Въ концѣ 1-го мѣсяца послѣ операціи больная схватила тяжелый брон-

хить съ пораженіемъ почекъ (бѣлокъ въ мочѣ, сильные отеки ногъ). Роды наступили преждевременно, мертвымъ ребенкомъ, послѣродовой періодъ прошелъ благополучно; бѣлокъ исчезъ и больная совершенно поправилась.

Два другихъ случая чревосъченій у беременныхъ кончились благополучно; безъ перерыва беременности въ одномъ и съ перерывомъ въ другомъ изъ нихъ. Всего *Murphy* произвелъ въ 1893 г. 4 чревосъченія, всъ съ благополучнымъ исходомъ. *М. Гинзбургъ*.

246. Dr. O'Sullivan.—(Melbourne, Австралія). Cases (50) of abdominal Section.—(The Australasian Medical Gazette, 1895' 15 april., p. 154).—50 чревосъченій (съ замъчаніями о нъкоторыхъ вопросахъ гинекологической хирургіи).

O'Sullivan произвель за послёднее время рядъ крупныхъ гинекологическихъ операцій, а именно:

- 3 изсъченія матки по *Шредеру* (amputatio sapravaginalis) съ внутри-брющиннымъ опущеніемъ культи.
- 2 изсъченія матки чрезъ влагалище.
- 2 изсѣченія матки одновременно чрезъ влагалище и путемъ лапаротоміи.
- 1 " съ зашиваніемъ культи внѣ-брюшинно.
- 8 удаленій Фалоп. трубъ по случаю pyosalpingit'a.
- 1 " " и appendicit'a съ выръзаніемъ червообразнаго отростка.
- 5 вырѣзаній придатковъ матки по случаю хроническихъ воспаленій ихъ.
- 3 Salpingo-oophorectomi'й, ради твердых ъ, узловатых ъ фиброміом ъ.
- 5 операцій аденомы яичника.
- 5 " пароваріальных кистъ.
- 2 " многополостной папилломатозной кисты яичника.
- 1 " простой кисты яичника.
- 3 🦏 трубно-яичниковыхъ гнойныхъ скопленій.
- 2 , водянки Фалоп. трубы.
- 2 ланаротоміи при разлитомъ туберкулезномъ перитонитъ.
- 4 " при трубной беременности.
- 1 " по причинѣ эхинококковой болѣзни.

Исходы операцій были очень благопріятны, но цифры выздо ровленій не показаны.

Но поводу своихъ операцій O'Sullivan обсуждаетъ нѣкоторые вопросы по оперативной гинекологіи и я считаю интереснымъ реферированіе мнѣній австралійскаго хирурга.