хить съ пораженіемъ почекъ (бѣлокъ въ мочѣ, сильные отеки ногъ). Роды наступили преждевременно, мертвымъ ребенкомъ, послѣродовой періодъ прошелъ благополучно; бѣлокъ исчезъ и больная совершенно поправилась.

Два другихъ случая чревосъченій у беременныхъ кончились благополучно; безъ перерыва беременности въ одномъ и съ перерывомъ въ другомъ изъ нихъ. Всего *Murphy* произвелъ въ 1893 г. 4 чревосъченія, всъ съ благополучнымъ исходомъ. *М. Гинзбургъ*.

246. Dr. O'Sullivan.—(Melbourne, Австралія). Cases (50) of abdominal Section.—(The Australasian Medical Gazette, 1895' 15 april., p. 154).—50 чревосъченій (съ замъчаніями о нъкоторыхъ вопросахъ гинекологической хирургіи).

O'Sullivan произвель за послёднее время рядъ крупныхъ гинекологическихъ операцій, а именно:

- 3 изсъченія матки по *Шредеру* (amputatio sapravaginalis) съ внутри-брющиннымъ опущеніемъ культи.
- 2 изсъченія матки чрезъ влагалище.
- 2 изсѣченія матки одновременно чрезъ влагалище и путемъ лапаротоміи.
- 1 " съ зашиваніемъ культи внѣ-брюшинно.
- 8 удаленій Фалоп. трубъ по случаю pyosalpingit'a.
- 1 " " и appendicit'a съ выръзаніемъ червообразнаго отростка.
- 5 вырѣзаній придатковъ матки по случаю хроническихъ воспаленій ихъ.
- 3 Salpingo-oophorectomi'й, ради твердых ъ, узловатых ъ фиброміом ъ.
- 5 операцій аденомы яичника.
- 5 " пароваріальных кистъ.
- 2 " многополостной папилломатозной кисты яичника.
- 1 " простой кисты яичника.
- 3 🦏 трубно-яичниковыхъ гнойныхъ скопленій.
- 2 , водянки Фалоп. трубы.
- 2 ланаротоміи при разлитомъ туберкулезномъ перитонитъ.
- 4 " при трубной беременности.
- 1 " по причинѣ эхинококковой болѣзни.

Исходы операцій были очень благопріятны, но цифры выздо ровленій не показаны.

Но поводу своихъ операцій O'Sullivan обсуждаетъ нѣкоторые вопросы по оперативной гинекологіи и я считаю интереснымъ реферированіе мнѣній австралійскаго хирурга.

- 1) Почему такъ много оперированныхъ женщинъ остаются калъками послъ удаленія у нихъ яичниковъ и трубъ?—О'Я полагаетъ, что причиною ихъ страданій—бользиь эндометрія, ради которой онъ считаетъ полезнымъ производить и выскаблаваніе матки. Онъ во мпогихъ случаяхъ наблюдалъ, что забольваніе трубъ и яичниковъ не было первичнымъ, а зависящимъ отъ слизистой матки. Выборъ времени для выскабливанія, до или послъ лапаротоміи, не одинаковъ для встхъ случаевъ.
- 2) Лѣченіе мягкихъ и твердыхъ фиброидовъ должно быть совершенно различнымъ. Согласно съ *L-Тай*омъ, *O'S*. считаетъ мягкіе фиброиды экзогеннымъ разрощеніемъ, прекращающимся съ удаленіемъ ихъ сумки. Поэтому удаленіе трубъ и яичниковъ здѣсь безполезно. Твердые фиброміомы онъ считаетъ эндогеннымъ разращеніемъ расширенной артеріальной вѣтви, зависящимъ отъ иннерваціи; по этому удаленіе трубъ и яичниковъ здѣсь полезно.
- 3) Послѣ сальпинготоміи опъ считаетъ нужнымъ прижиганіе термокаутеромъ остающихся концовъ, которые безъ того могутъ служить источникомъ септическаго зараженія. Тоже онъ дѣлаетъ при appendicit'ь.
- 4) Мягкія фиброміомы не излѣчиваются перевязкой ихъ питающихъ артерій.
- 5) O'S. порицаетъ удаленіе придатковъ ради невральгій. Болье частою причиною такихъ болей O'S. считаетъ недоразвитіе матки, дътскую матку; по его наблюденіямъ, въ этихъ случа хъ оказываютъ пользу расширеніе и тампонада матки, причемъ излъчивается и бывшее раньше безплодіе.
- 6) Только въ рѣдкихъ случаяхъ О'S промываетъ полость брюшины слабымъ солянымъ растворомъ—тамъ, гдѣ подозрѣвается возможность септическаго заражевія.

 М. Гинзбургъ.
- 247. Dr. Theobald Smith.—On a local vascular Disturbance of the Foetus, probably due to the Injection of Tuberculin in the pregnant Cow.—From the Pathological Laboratory of the Bureau of Animal Industry of the United States Departament of Agriculture.—(New-Jork Medic. Journ., 1895, 23/11, p. 233).—О местномъ розстройстве кровообращения въ зародыше, обусловленномъ впрыскиваниемъ туберкулина матери.—Опыты на животныхъ, произведенные въ лабораторіи Департамента Земледёлія Сев.-Ам. Соед. Штатовъ.

Два нижеописываемыя наблюденія интересны въ смыслѣ подтвержденія распространеннаго въ публикѣ мнѣнія объ отраженіи