

довыхъ заболѣваній и къ третьему—400 случаевъ, съ 0,5<sup>0</sup>/о смертности и 2,5<sup>0</sup>/о послѣродовыхъ заболѣваній. Взявъ во вниманіе только случаи патологическіе, авторъ вычислилъ процентъ смертности для щипцовъ (10 случ.) въ 20, а процентъ осложненийъ въ 30. Въ прочихъ случаяхъ оперативныхъ пособій—смертныхъ исходовъ не было; только поворотъ (4 случая) далъ 25<sup>0</sup>/о осложненийъ. Въ патологическихъ случаяхъ авторъ признаетъ обеззараживанія влагалища во время родовъ цѣлесообразными, хотя и безъ нихъ результаты не дурны. Въ общемъ онъ считаетъ прополаскиванія рукава, даже въ грязной обстановкѣ, не необходимыми. Особенно онъ настаиваетъ на запрещеніе дѣлать эти прополаскиванія повивальнымъ бабкамъ, для которыхъ онъ требуетъ обязательныхъ постановленій. Лучшимъ обеззараживающимъ средствомъ для рукъ и для всего, что приходится въ соприкосновеніе съ роженицей—онъ считаетъ 2<sup>0</sup>/о, 5<sup>0</sup>/о растворъ корболовой кислоты.

*Н. Какушкинъ,*

253. **Д. Е. Гороховъ и Н. Е. Хлѣбниковъ.**—Случай лоннаго хрящеразсѣченія въ земской практикѣ.—(Врачъ 1895 г. № 32).

Роженица (въ 4-й разъ) 24 лѣтъ. Ростъ тѣла 143 см. Размѣры таза: 26; 24; 23; 17; 5; conjug diagon. 8. Предлежитъ головка съ выпавшей правой ручкой; воды отошли; схватки сильныя; плодъ живъ. Подъ хлороформнымъ наркозомъ разрѣзь мягкихъ частей лона до кости; надкостница отдѣлена; хрящъ разрѣзанъ крѣпкимъ ножомъ. Ребенокъ (живая дѣвочка) извлеченъ щипцами, при этомъ концы лонныхъ костей разошлись на 6—7 см. Послѣ извлеченія плода надкостница и кожа лона шиты тремя узловатыми швами съ нѣсколькими промежуточными поверхностными; въ нижній уголъ раны введенъ іодоформный тампонъ. Надрывъ слизистой передней стѣнки входа въ рукавъ зашитъ 4 узловатыми швами. Поверхностные швы сняты на 14-й день, глубокіе на 26-й. Больная пролежала въ постели (съ цѣлью болѣе прочнаго сращенія костей) 6 недѣль. Походка не измѣнилась.

*Н. Какушкинъ.*

254. **Л. Е. Мацянской.**—Излѣченіе повторными кюрражами послѣродовой горячки, зависящей отъ оставшейся въ маткѣ части послѣда.—(Проток. засѣд. Имп. Виленскаго мед. общ.; 1895 г., № 2, стр. 79).

Первородящая, 23 лѣтъ. Срочные роды. Разрывъ промежности; одинъ шовъ. Послѣдъ выдѣлился произвольно. Повышенія