

то начались со второго дня послѣ родовъ. На 6-й день обнаруженъ дифтеритическій налетъ на ранкѣ промежности. Дурной запахъ выдѣленій. Повторныя промыванія полости матки растворомъ сулемы не давали результата. Когда былъ (на 12 день) обнаруженъ въ маткѣ остатокъ послѣда, сдѣлано выскабливаніе полости матки. Выскабливаніе было повторено еще два раза черезъ нѣсколько дней, при чемъ въ послѣдній разъ (на 5 недѣль послѣ родовъ), при очень тяжеломъ общемъ состояніи больной (явленія отравленія сулемой?). Каждый разъ ложечкой удалялись куски дѣтскаго мѣста. Больная выздоровѣла. *Н. Какушкинъ.*

255. Э. Г. Канъ.—*Partus per rupturam perinei centrales.*—(Проток. засѣд. Имп. Виленскаго мед. общ., 1895 года, № 3, стр. 119).

Первородящая, 19 лѣтъ. Роды продолжались 48 часовъ и произошли безъ пособія и присутствія врача и акушерки. Высота промежности 7 снтм. Въ серединѣ ея разрывъ, сообщающійся съ большимъ разрывомъ на зайдней стѣнкѣ влагалища. Спайка большихъ губъ и отверстіе задняго прохода цѣлы. На 20 день послѣ родовъ операція: разсѣченъ мостикъ, поверхность раны освѣжена выскабливаніемъ. Наложены глубокіе и поверхностные швы. *Prima intentio.* *Н. Какушкинъ.*

256. Г. Я. Гершунъ.—*О вульво-вагинитѣ у маленькихъ дѣвочекъ.*—(Проток. засѣд. Имп. Виленскаго мед. общ., 1895, № 4, стр. 139).

За 8 мѣсяцевъ авторъ наблюдалъ 9 случаевъ этой болѣзни у дѣвочекъ, въ возрастѣ 13 мѣсяцевъ—8 лѣтъ. Выдѣленія изслѣдовались только микроскопически. Источниками зараженія служили родственницы и прислуга. Только въ одномъ случаѣ зараженіе произошло вслѣдствіе взаимнаго онанизма. Изнасилованіе ни разу не имѣло мѣста. Клиническая картина особенностями не отличалась. Лѣченіе состояло въ возможной чистотѣ, изоляціи и обеззараживающихъ спринцеваніяхъ. *Н. Какушкинъ.*

257. Я. І. Выгодскій.—*Рѣдкіе акушерскіе случаи.*—(Прот. засѣд. Имп. Виленскаго мед. общ., 1895, № 6, стр. 229).

Описано три случая: 1) *семикратное обвитіе пуповины вокругъ шейки ребенка, какъ причина смерти послѣдняго и задержки родовъ.* У первородящей, 20 лѣтъ. Роды срочные. Плодь выжать. Вѣсъ плода 2400. Длина пуповины 168. Кромѣ шейки пуповина

имѣла одинъ оборотъ вокругъ плечика. 2) *Тройни. Evolutio spontanea*. Всѣ три дѣвочки; первая и третья живыя; вторая—мертвая (1500 грм.). *Evolutio spontanea* относится къ мертвому плоду. 3) *Placenta praevia centralis, partim calcinata*. Третьеродящая, 28 лѣтъ. Поворотъ по *Braxton-Hicks'*у. Ручное отдѣленіе послѣда. Атонія матки и тампонація ея. Выздоровленіе. Плодъ живой. Около трети послѣда обызвествлена. *Н. Какучкинъ.*