

б) Н ѣ м е ц к о й.

258. **Fritsch.**—**Zur Hebammenreform.**—(Arch. f. Gyn., Bd. XLIX, Hft. 1).—**Къ вопросу о преобразованіи сословія акушерокъ.**

Указавъ на то, что господствовавшее въ послѣднее время въ этомъ вопросѣ затишье, наступило отнюдь не вслѣдствіе удовлетворительнаго его разрѣшенія и пояснивъ подробно, почему предпринятая уже мѣры, какъ то: увеличеніе срока обученія, устройство повторительныхъ курсовъ, установленіе обязательныхъ правилъ для дезинфекціи и т. п., не могли достигнуть предначертанной цѣли, *F.*, вновь выступаетъ поборникомъ полного преобразования сословія акушерокъ по проекту *Brennecke*, требующаго, чтобы акушерки вербовались исключительно изъ интеллигентныхъ классовъ и вообще изъ лицъ поистинѣ преданныхъ дѣлу, которому желаютъ служить. Но необходимыми условіями успѣшнаго выполненія подобной программы является прежде всего болѣе свободное и болѣе распространенное преподаваніе акушерства при университетскихъ клиникахъ, при родильныхъ пріютахъ и т. д. Преподаваніе акушерства должно быть, по мнѣнію *F.*, такъ обставлено, чтобы образованная женщина могла учиться, гдѣ и какъ она хочетъ. Второе же необходимое условіе успѣха это то, чтобы акушерки были такъ или иначе, хоть бы на почвѣ правильно устроеннаго взаимнаго вспоможенія, обезпечены на случай старости и инвалидности.

С. Ю. Хазанъ.

259. **Strassmann.**—**Aeusserre und combinirte gebutshülfliche Verfahren.**—(Arch. f. Gyn., Bd. XLIX, Hft. 1).—**Наружные и комбинированные акушерскіе приемы.**

Если уже отъ замѣны внутренняго акушерскаго изслѣдованія наружнымъ мы видимъ несомнѣнную пользу, то тѣмъ болѣе намъ обѣщаетъ ее стремленіе находить такіе наружные приемы, которые могли бы замѣнить или по крайней мѣрѣ органичить до minimum'a употребленіе опасныхъ внутреннихъ акушерскихъ операций. На такіе приемы, при помощи которыхъ родовой актъ или прямо разрѣшается или же принимаетъ болѣе успѣшное теченіе, намъ указываетъ авторъ. Къ нимъ относятся: 1) Родоразрѣшеніе помощью выжиманія (способъ *Kristeller*'а). При затяженіи родоваго акта, вслѣдствіе вялости потугъ, слабого дѣйствія брюшнаго пресса и неподатливости мягкихъ частей, приемъ этотъ,

конечно лишь при глубокомъ стоянїи головки и полномъ раскрытіи зѣва, можетъ быть примѣненъ съ несравненно большею пользою, чѣмъ наложеніе щипцовъ, такъ какъ при этомъ избѣгается опасность инфекціи, пораненій матери и плода и послѣдующей атоніи. 2) Выжиманіе головки и защита промежности черезъ заднюю промежность (способъ *Ritgen'a*) путемъ давленія, производимаго кончикомъ большаго или указательнаго и средняго пальцевъ на лежащую сзади и сбоку отъ *anus'a* часть тазовой стѣнки, которая соотвѣтствуетъ *incisurae ischiadae*. Приему этому, находящему примѣненіе какъ при *expressio bimanualis*, такъ и при наложеніи щипцовъ, главнымъ образомъ съ цѣлю защитить промежность, слѣдуетъ съ точки зрѣнія асептики безспорно отдать предпочтеніе предъ выведеніемъ головки пальцемъ, введеннымъ въ прямую кишку. 3) Вдавленіе подъ хлороформомъ въ полость таза высокостоящей головки (способъ *Hofmeister'a*) рекомендуется вмѣсто высокихъ щипцовъ при среднихъ степеняхъ суженія, при уже частью вколоченной головкѣ и достаточно подготовленныхъ мягкихъ частяхъ. Противопозаніемъ къ производству этой операціи служитъ сильное растяженіе нижняго отрѣзка матки. 4) Поворотъ на головку при косомъ и поперечномъ положеніяхъ примѣнимъ съ успѣхомъ лишь при стоячемъ пузырьѣ; противопоказуется при выпаденіи пуповины, а равно и при узкомъ тазѣ. 5) Ручное выжиманіе при тазовомъ положеніи можетъ съ пользою замѣнить всякіе внутреннїе приемы, когда при глубоко вколоченной подлежащей части и достаточномъ раскрытіи существуетъ показаніе для послѣднаго окончанія родовъ. 6) Вдавленіе въ полость таза послѣдующей головки, производимое или одною рукою, при чемъ другая дѣйствуетъ на подбородокъ, (приемъ *Martin-Wigand-Winckel'a*) или-же обѣими руками. Послѣдній приемъ особенно необходимъ при еще высоко надъ входомъ стоящей головкѣ, т. е. при сильныхъ степеняхъ суженія, при которыхъ посредствомъ приема *Veit-Smellie* нельзя достигнуть цѣли, такъ какъ приемъ этотъ можетъ служить лишь для выведенія уже находящейся въ полости таза головки. 7) Выжиманіе плаценты (способъ *Credé*). Помощью этого приема, въ особенности, если его примѣнить нѣкоторое время спустя послѣ родовъ, почти всегда можно удалить задержанное дѣтское мѣсто; лишь рѣдко приходится прибѣгать къ болѣе сильному давленію обѣими руками. Даже въ случаяхъ частичнаго отдѣленія мѣста, когда *Credé* не удается, еще можно обойти внутреннїя манипуляціи: стоитъ только давленіемъ, про-