

265. Fraenkel.—Die Histologie der Blasenmolen und ihre Beziehungen zu den malignen von den chorionzotten (Decidua) ausgehenden Uterustumoren.—(Arch. f. Gyn., Bd. XLIX, Hft. 3).—**Гистологическое строение пузырных заносовъ и отношеніе ихъ къ злокачественнымъ исходящимъ изъ хоріальныхъ ворсинокъ (отпадающей оболочки) опухолямъ матки.**

Послѣ того какъ въ большомъ числѣ случаевъ злокачественныхъ новообразованій, исходящихъ изъ отпадающей оболочки или хоріальныхъ ворсинокъ, анамнезомъ было установлено предшествовавшее забеременѣніе заносомъ, никто не сталъ болѣе сомнѣваться въ существованіи взаимной связи между обоими этими столь рѣдкими патологическими процессами. Спорнымъ и не выясненнымъ оставался лишь вопросъ о томъ, какому изъ этихъ процессовъ принадлежитъ первичная роль, другими словами, развивается ли заносъ вслѣдствіе того, что слизистая оболочка матки уже раньше была поражена злокачественнымъ новообразованіемъ или наоборотъ оставшіяся въ маткѣ ненормальныя ворсинки даютъ начало развитію злокачественной опухоли. Этотъ то спорный вопросъ пытается разрѣшить авторъ на основаніи систематическаго изслѣдованія 10 препаратовъ, хранившихся въ гинекологической клиникѣ и патолого-анатомическомъ институтѣ Фрейбургскаго университета. Результаты, къ которымъ онъ приходитъ, слѣдующіе: 1) Въ пузырныхъ заносахъ всегда почти замѣчается новообразовательный процессъ, который не ограничивается областью ворсинокъ и ничего общаго съ миксоматознымъ перерожденіемъ этихъ послѣднихъ не имѣетъ. 2) Новообразование состоитъ здѣсь не изъ слизистой ткани съ подавленою жизнедѣятельностью, а изъ весьма живучихъ размножающихся клѣтокъ, словомъ изъ элементовъ, встрѣчающихся при злокачественныхъ опухоляхъ ворсинокъ и отпадающей оболочки. Весьма вѣроятно, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ развитію злокачественнаго новообразованія предшествовалъ заносъ, остатки этого послѣдняго именно и являются исходною точкою злокачественной опухоли.

*С. Ю. Хазанъ.*