

248. Ch. Michel.—Utilisation des matériaux nutritifs du lait. Comparaison, chez le nourrisson, des deux modes d'alimentation: lait de femme et lait de vache.—(La France médicale. 1898, № 26, с. 402).—Сравнительная усвояемость новорожденными женского и коровьяго молока.

Изслѣдуя у 5 мальчиковъ въ 5—15 дневнаго возраста калъ и мочу послѣ кормленія только женскимъ молокомъ, авторъ нашелъ слѣдующее. Калъ, желтый въ свѣжемъ состоянїи, черезъ нѣкоторое время принималъ зеленоватый цвѣтъ и не издавалъ никакого зловонія. Въ немъ оказалось 80⁰/о воды; высушенная часть кала содержала 89,22⁰/о органическихъ веществъ (20,65⁰/о жира и 27,68⁰/о бѣлковыхъ веществъ) и 10,78⁰/о минеральныхъ солей. Усвояемость женскаго молока выразилась слѣдующими цифрами: сухого экстракта молока 96,11⁰/о; жира 96,35⁰/о; бѣлковыхъ веществъ 93,60⁰/о; минеральныхъ солей 78,26⁰/о; извести 59,42⁰/о и фосфорной кислоты 91,63⁰/о. Въ 4 случаяхъ кормленія цѣльнымъ обезпложеннымъ коровьимъ молокомъ авторъ замѣтилъ, что калъ, въ свѣжемъ состоянїи цвѣта яичнаго желтка, черезъ нѣкоторое время принималъ сѣроватый оттѣнокъ и прїобрѣталъ дурной запахъ. Въ немъ оказалось 83⁰/о воды; въ высушенной части: 4⁰/о азота, 14⁰/о жира, 21,80⁰/о минеральныхъ солей. Въ общемъ усвояемость коровьяго молока выразилась цифрой 93,60⁰/о (для женскаго молока эта цифра 96,11⁰/о). Меньшая усвояемость коровьяго молока сравнительно съ женскимъ пришлось главнымъ образомъ на долю извести и фосфорной кислоты.

И. Какушкинъ.

249. Marx.—Sur quatre cas de folie post—opératoire.—(La Revue médicale. 1898, № 204).—Четыре случая психоза послѣ операціи.

Авторъ высказываетъ слѣдующія положенія: 1) послѣоперационные психозы наблюдаются только у женщинъ, причемъ характеръ оперативнаго вмѣшательства здѣсь не имѣетъ значенія (собственно оскопленіе не вызываетъ тяжелыхъ душевныхъ разстройствъ); 2) хлороформъ съ одной стороны и подавленное состояніе нервной системы больной передъ операціей—съ другой суть главные предрасполагающіе моменты при этомъ (сюда относятся также общій упадокъ питанія, малокровіе и т. под.), 3) всѣ послѣоперационныя душевныя разстройства, начиная отъ простыхъ галлюцинацій до тяжелой формы меланхоліи, имѣютъ характеръ временный, проходящій. Въ описанныхъ авторомъ случаяхъ психозы развились: