

252. Depage.—Rupture de l'ovaire. Hémorrhagie intraperitonéale foudroyante. Laparotomie. Guérison.—(Annales de la Société Belge de chirurgie. 15 avril 1898. Стр. 53).—**Разрывъ ячника. Внутреннее кровотеченіе. Чревосѣченіе съ благопріятнымъ исходомъ.**

Молодая дѣвственница въ теченіе 2—3 дней страдала болями въ животѣ, которыя были отнесены на счетъ воспаленія брюшины на почвѣ воспаленія червеобразнаго отростка слѣпой кишки. Затѣмъ у больной внезапно обнаружился явленія быстрого упадка силъ и признаки внутренняго кровотеченія. Немедленно произведено вскрытіе брюшной стѣнки. Вся брюшинная полость оказалась выполненной сгустками крови, источника кровотеченія долго не удавалось найти. Ощупанъ объемистый, твердый яичникъ, который тотчасъ же удаленъ. Онъ—второе—вчетверо больше обыкновеннаго. Ткань его потеряла обычный характеръ, вслѣдствіе внутритканыхъ кровеизліяній. Онъ былъ разорванъ по одной плоскости во всю толщину и представлялся состоящимъ какъ бы изъ двухъ створокъ. Микроскопическое изслѣдованіе показало довольно развитой склерозъ, кровяное пропитываніе ткани и мѣстами болѣе или менѣе атрофированные фолликулы. Больная поправилась безъ осложнений.

Н. Какучкинъ.

253. Lop.—De l'hémorragie interne dans les cas de placenta praevia ou de placenta normalement inseré. — (la Presse medicale 2 juillet 1898).—**Внутреннее кровотеченіе при нормальномъ прикрѣпленіи послѣда и при предлежаніи его.**

Описываются два случая. Въ первомъ, у сифилитички 39 лѣтъ беременной въ 7-й разъ (и ни разу не разрѣшавшейся въ срокъ), внезапно замѣчено увеличеніе живота, общая слабость и боли. Акушерка сначала заподозрила водянку амніона, затѣмъ двойни, и только когда появилось наружное кровотеченіе, послала за врачомъ. Ребенокъ дышавшій нѣсколько минутъ родился произвольно, объемистый послѣдъ извлеченъ изъ влагалища, изъ матки удалено до 120 грм. сгустковъ. Больная умерла. Второй случай касается женщины 41 года, беременной въ 12 разъ (прежніе роды безъ осложнений). У нея также сталъ увеличиваться животъ и появились боли. Акушерка распознала двойни. Затѣмъ прорвался пузырь, вышло много сгустковъ крови; авторъ убѣдился въ краевомъ предлежаніи послѣда и сдѣлалъ поворотъ на ножку съ извлеченіемъ. Плодъ живой, но скоро умеръ, родильница была первое время въ хорошемъ состояніи, но чрезъ нѣ-