

б) А н г л і й с к о й.

257. I. Baldy.—(Philadelphia).—Acute Strangulation of prolapsed Uterus and Vagina.—(The American Journal of Obstetrics etc, 1898, February, p. 230).—Острое ущемление выпавших матки и влагалища.

II. Bejea.—Acute Septic Infection and Strangulation of a Completely prolapsed Uterus; Vaginal Hysterectomy; Death.—(Ibidem, p. 231).—Острое септическое заражение и ущемление выпавшей матки; влагалищное изсѣчение съ смертельнымъ исходомъ.

III. Bejea and Baldy.—Cases of Acute Strangulation of prolapsed Uterus et Vagina.—(Ibidem, p. 247).—О томъ же.

I. Baldy описываетъ выпаденіе матки и влагалища у 70-лѣтней старухи, страдавшей этимъ 10 лѣтъ; сдѣланное при осмотрѣ вправленіе не удерживалось, даже при лежаніи на спиѣ; на шейкѣ матки была язва въ $\frac{1}{2}$ доллара. На операцію не согласилась. Когда старуха вторично пришла къ В. черезъ 10 дней, по причинѣ ожесточенія болей, то выпавшія части оказались сильно опухшими, изъязвленіе распространилось вверхъ до половины матки, общее состояніе стало очень плохимъ. Назначенныя горячія души облегчили больную, опуханіе уменьшилось. Для полного излѣченія Baldy хотѣлъ сдѣлать надвлагалищную ампутацію матки брюшиннымъ путемъ съ пришиваніемъ культи маточной шейки къ верху; но по вскрытіи живота, на надвлагалищной части оказалась опухоль величиною съ куриное яйцо, вѣдрившаяся въ клѣтчатку позади влагалища; поэтому Baldy произвелъ полное вырѣзаніе матки и, закрывъ своды влагалища, пришилъ ихъ къ яичниковой культѣ. Зашивъ брюшную рану, В. сдѣлалъ еще colporaphiam anteriorem et perineoraphiam. Больная поправилась.

II. Въ случаѣ Bejea выпаденіе 6-лѣтней давности у 22-лѣтней женщины. Она не соглашалась на операцію, пока у ней не появились потрясающій ознобъ, боли и вздутіе живота, запоры и рвоты. Она поступила въ больницу на 7-й день болѣзни. При осмотрѣ оказалось: изъ влагалища торчитъ красная опухоль величиною съ дѣтскую головку, шейка и задняя стѣнка влагалища покрыты язвами, съ налетами на краяхъ послѣднихъ, изъ шейки выдѣляется серозная слизистая жидкость. Bejea вырѣзалъ матку вла-

галищнымъ путемъ; опустившіяся въ рану гиперемированныя петли кишекъ покрыты были выпотомъ; на разрѣзахъ матки, въ стѣнкѣ ея были небольшіе нарывы; яичники и Фалопіевы трубы оказались здоровыми. Въ ранѣ оставленъ марлевый дренажъ. Рвоты послѣ хлороформированія успокоились; но черезъ 2 дня появились признаки септического отравленія, начавшагося до операціи и больная умерла.

III. По поводу приведенныхъ сообщеній, сдѣланныхъ авторами ихъ на засѣданіи Филадельфійскаго College of physicians, *Baer* и *Costa* высказались, что въ случаѣ *Bejea* было бы умѣстнѣе оперировать брюшиннымъ путемъ, въ виду того, что въ выпаденіи матки участвуютъ гипертрофированныя стѣнки влагалища, пузыря и *recti* и что при операціи сверху (брюшиннымъ путемъ) влагалище пришивается къ широкимъ связкамъ или къ брюшнымъ стѣнкамъ, а при вагинальномъ способѣ черезъ 8—10 мѣсяцевъ иногда наблюдаются рецидивы выпаденія влагалища; у молодыхъ женщинъ при первомъ способѣ—влагалище не укорачивается, а благодаря одновременнымъ пластическимъ операціямъ суживается, что важно для замужнихъ женщинъ.

М. Д. Гинзбургъ.

258. **Alban Doran.—Ovarian Tumours, Simulating inflamed Ovaries.**—(The Edinburgh med. Journ., May 1898, p.p. 449—460).—**Опухоли или воспаленія яичниковъ?** (resp. дифференціальный діагнозъ этихъ болѣзней).

Не смотря на тысячи производимыхъ повсюду овариотомій, дифференціальный діагнозъ между кистами и маленькими плотными опухолями яичника еще не достаточно выясненъ. Многіе вырѣзаютъ всѣ попадающіеся имъ опухоли яичниковъ; не рѣдко опуханіе яичника обусловливается только воспаленіемъ его, которое, при надлежащемъ лѣченіи, прошло бы и безъ операціи. Случается, что опухоль яичника, раньше чѣмъ подымается изъ малаго таза вверхъ, становится болѣзненною, что обусловливается болѣзвью матки или другаго яичника и можетъ повлечь на ошибку въ діагнозѣ. Съ другой стороны приращеніе опухоли яичника въ маломъ тазу, при совпаденіи съ удлиненіемъ матки и обильными регулами, даетъ поводъ принять опухоль яичника за фиброидъ матки. Съ цѣлью способствовать вѣрнѣйшему діагнозу въ подобныхъ случаяхъ, *Doran* приводитъ 6 исторій болѣзней и обсуждаетъ представляемые ими особенности.