

276. **М. И. Гошкевичъ.**—Случай уродства, прибавочныя срамныя губы.—(Врачъ 1895 г., № 37, стр. 1044).

У 35-лѣтней, рожавшей, не представляющей никакихъ отклоненій въ сложеніи и питаніи своего тѣла, авторъ нашель на промежности, на поперечный палецъ ниже задняго конца половой щели, двѣ кожистыя, пигментированныя, полукруглыя, похожія на малые губы, складки, расположенныя симметрично по обѣ стороны шва промежности. Двина каждой складки  $3\frac{1}{2}$  стн., ширина (наибольшая) 2 стн., толщина  $\frac{1}{2}$  стн., Пространство между складками нѣсколько вдавлено, шероховато и пигментировано. При сведенныхъ бедрахъ складки прилегаютъ другъ къ другу. Онѣ мало чувствительны.

*Н. Какушкинъ.*

277. **И. А. Залѣскій.**—*Haematocoele retrouterinum.*—(Южно-Русская Медицинская Газета, 1895 г., № 41, стр. 545).

У больной, послѣ семинедѣльной задержки мѣсячныхъ, при поднятіи тяжести появилось кровоизліяніе въ заматочномъ пространствѣ. Опухоль была величиной съ голову взрослого. Пяти-недѣльное лѣченіе ваннами, спринцеваніями, ихтіоломъ, привело къ уменьшенію опухоли до величины апельсина. Авторъ полагаетъ, что здѣсь имѣла мѣсто трубная беременность, а кровотеченіе произошло изъ разрыва беременной трубы.

*Н. Какушкинъ.*

278. **Проф. Н. Н. Феноменовъ.**—Къ вопросу о полномъ удаленіи матки при міомахъ.—(Врачъ, 1895 г., №№ 42 и 43, стр. 1171 и 1206).

Краткимъ очеркомъ современныхъ способовъ лѣченія фиброміомъ матки авторъ устанавливаетъ преимущества хирургическаго вмѣшательства при этихъ новообразованіяхъ. Онъ исключаетъ всѣ косвенныя способы, какъ оскопленіе, перевязка сосудовъ, или симптоматическіе, какъ выскабливаніе, и не считаетъ навѣрное излѣчивающими тѣ приемы, при которыхъ удаляются только опухоли, а матка оставляется. Успѣхи техники заставляютъ отбросить и надвлагалищное отсѣченіе матки, такъ что остается единственный путь для излѣченія отъ фиброміомъ—полное удаленіе всего органа. Авторъ отдаетъ преимущество влагалищному выдущенію матки передъ брюшно-стѣночнымъ. Особенности его техники заключаются въ томъ, что онъ сначала вскрываетъ задній сводъ, а затѣмъ дѣлаетъ разрѣзъ въ переднемъ сводѣ и производитъ отслойку лузья. Иногда, при большихъ опухоляхъ, къ попереч-