

оперативное лѣченіе должно быть примѣнено лишь при самыхъ строгихъ показаніяхъ, а именно при замѣтномъ увеличеніи опухоли, при симптомахъ внутренняго кровотеченія и при явленіяхъ разложенія въ мѣшкѣ, при чемъ брюшная операція и здѣсь является самою раціональною.

С. Ю. Хазанъ.

272. Falk.—Zweimalige Laparotomie wegen recidivirter Tuben-gravidität.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 2).—Повторная ляпоротомія вслѣдствіе рецидива трубной беременности.

Главный интересъ этого сообщенія заключается въ томъ, что оба раза авторъ нашелъ перитоническія сращенія, которыя онъ поэтому считаетъ причиною вѣматочной беременности.

С. Ю. Хазанъ.

273. Tjaden.—Alkohol und Händedesinfection.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 3).—Алкоголь и дезинфекція рукъ.

Въ виду того, что изслѣдованія послѣдняго времени относительно значенія алкоголя, какъ дезинфекціоннаго средства, еще не привели къ окончательнымъ выводамъ, авторъ предпринялъ въ клиникѣ и бактеріологическомъ институтѣ въ Гисенѣ новый рядъ изслѣдованій съ цѣлью опредѣлить роль алкоголя при стерилизації рукъ и въ тоже время уяснить себѣ вопросы: о томъ, насколько добытые въ клиникѣ результаты примѣнимы въ частной практикѣ, а также и о томъ, что можно достигнуть дезинфекціею рукъ у вольнопрактикующихъ акушеровъ. Результаты, къ которымъ авторъ приходитъ, сводятся къ слѣдующему: 1) алкоголь является очень полезнымъ дезинфекціоннымъ средствомъ, хотя вполне обезплодить руки помощью этого средства удается лишь въ исключительныхъ случаяхъ; 2) при дезинфекціи рукъ полезно послѣ употребленія сулемы погрузить руки въ алкоголь, а затѣмъ опять въ сулему; 3) успѣхъ дезинфекціи зависитъ отъ степени умственнаго развитія, такъ и въ особенности отъ свойства самихъ рукъ, а потому во всякомъ случаѣ не раціонально рекомендовать частое изслѣдованіе, какъ это дѣлаетъ Ahlfeld; 4) изъ 402 опытовъ дезинфекціи рукъ приходящихъ на повторительные курсы акушеровъ лишь въ 9 случаяхъ удалось констатировать полное обезпложиваніе. Эти результаты, равно какъ фактъ добытый статистическими данными о сравнительно высокомъ еще процентѣ пуэрперальныхъ заболѣваній заставляютъ автора требовать отъ правительства коренной реформы акушерскаго дѣла въ томъ именно смыслѣ, чтобы сельскія акушерки получали достаточное

жалованье отъ казны, дабы онѣ не имѣли надобности прибѣгать къ черной работѣ, лишаящей руки ихъ гладкости и тѣмъ препятствующей основательной ихъ дезинфекціи. С. Ю. Хазанъ.

274. Zangemeister.—Drei Fälle von wiederholter Extrauterin-gravidität bei derselben Frau.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 3).—Три случая повторной внѣматочной беременности у одной женщины.

Изучивъ на основаніи собственныхъ трехъ наблюденій и 31 случая другихъ наблюдателей этиологию внѣматочной беременности, авторъ пришелъ къ тому заключенію, что пытаться установить однородную причину для всѣхъ случаевъ внѣматочной беременности было-бы большою ошибкою, такъ какъ болѣзнь эта вызывается самыми разнообразными причинами.

С. Ю. Хазанъ.

275. Pincus.—Eine neue Methode der Behandlung entzündlicher Beckenaffectionen mittelst Belastungslagerung.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—Новый методъ лѣченія воспалительныхъ процессовъ въ тазу помощью т. наз. отягчающаго положенія.

Лѣченіе воспалительныхъ и преимущественно эксудативныхъ процессовъ вокругъ матки и ея придатковъ должно быть прежде всего выжидательное и имѣть своею цѣлью освобожденіе тазовыхъ органовъ отъ тяжести. Последнее достижимо лишь посредствомъ усиленія внутрибрюшнаго давленія, улучшенія стока венозной крови, ускоренія тока лимфы помощью примѣненія тяжести, поднятія тазовыхъ органовъ изъ малаго таза и оставленія пораженныхъ частей въ абсолютномъ покоѣ, а все это въ свою очередь достигается помощью такъ наз. отягчающаго положенія, состоящаго въ *positio in plano inclinato cum compressione*, эффектъ котораго еще усиливается методической легочной гимнастикой и усиленнымъ питаніемъ по способу *Weir-Mitchell*'а. Наклонное положеніе получается помощью поднятія одного конца кровати или матраца на 15—20 сант. выше другого головнаго конца. Давленіе производится какъ на животъ (эластическія повязки, мѣшокъ съ дробью, мокрая глина отъ 2—12 фунтовъ), такъ и на влагалище (воздушный или водяной пессарій, мѣшокъ съ дробью и тампонація). Примѣняется этотъ методъ лѣченія или постоянно или съ промежутками (въ острыхъ случаяхъ). Показаніемъ служить всякаго рода *plethora* тазовыхъ органовъ, смѣщенія и сращенія