

6) Итальянской.

281. **Gugliemo de Paoli.**—**Altri due casi di eclampsiae in gestazione.**—**Два случая эклампсии во время беременности.** (Annali di ost. e ginec., Agosto, 1894).

De Paoli сообщает о двух случаях эклампсий во время беременности: у многоразжавшей на 8-мъ мѣсяцѣ, и у молодой женщины 22 л., беременной въ первый разъ, у которой появились экламптические припадки также на 8-мъ мѣсяцѣ, при чемъ былъ найденъ бѣлокъ въ мочѣ въ огромномъ количествѣ. Послѣ употребленія безъ успѣха различныхъ средствъ, произведены преждевременные искусственныя роды съ помощью дилатора Bossi въ обоихъ случаяхъ. Послѣродовой періодъ:

1) У первой родильницы было 2 слабыхъ приступа. Выздоровленіе.

2) У второй—безъ осложнений. Выздоровленіе. А. Лапина.

282. Проф. **La Torre.**—**L'elleticita nella cura dell'amenorrea.**—**Примѣненіе электричества при лѣченіи аменорреи.**—(Annali di ost. e ginec., 1894, Maggio).

Изъ краткаго историческаго очерка, приведеннаго авторомъ, видно, что еще въ 1755 г., de Haen примѣнялъ электричество при отсутствіи мѣсячныхъ, затѣмъ Alberti (1764), Fridenthal (1864 г.), Whittaker (1874), и за послѣднее время, появились сообщенія Nitel, Labbé, Massin—по этому вопросу.

La Torre сообщаетъ три наблюденія:

I. Больная 30 л. multipara, metritis chronica и лѣвосторонній сальпинго-оваритъ. Аменоррея. Сдѣлана ампутація маточной шейки по способу Шредера; черезъ 4 мѣсяца послѣ операціи, больная заявила, что общее состояніе здоровья улучшилось, но продолжается отсутствіе мѣсячныхъ. Назначено лѣченіе электричествомъ при чемъ въ полость матки вводили отрицательный полюсъ и послѣ 3-го сеанса появилось кровянистое отдѣленіе. Послѣ 15 сеансовъ установился тишь менструаціи.

II. Авторъ примѣнилъ внутриматочную электризацію отрицательнымъ токомъ при superinv. post. partum съ благоприятнымъ результатомъ.

III. Больная 26 л., рожала 2 раза; жалуется на отсутствіе мѣсячныхъ въ теченіе 15 лѣтъ, и считала себя беременною 9 мѣся-