

6) Итальянской.

281. **Gugliemo de Paoli.**—**Altri due casi di eclampsiae in gestazione.**—**Два случая эклампсии во время беременности.** (Annali di ost. e gines., Agosto, 1894).

De *Paoli* сообщает о двух случаях эклампсий во время беременности: у многоразжавшей на 8-мъ мѣсяцѣ, и у молодой женщины 22 л., беременной въ первый разъ, у которой появились экламптические припадки также на 8-мъ мѣсяцѣ, при чемъ былъ найденъ бѣлокъ въ мочѣ въ огромномъ количествѣ. Послѣ употребленія безъ успѣха различныхъ средствъ, произведены преждевременные искусственныя роды съ помощью дилатора *Bossi* въ обоихъ случаяхъ. Послѣродовой періодъ:

1) У первой родильницы было 2 слабыхъ приступа. Выздоровленіе.

2) У второй—безъ осложнений. Выздоровленіе. *A. Ланца.*

282. Проф. **La Torre.**—**L'elleticita nella cura dell'amenorrea.**—**Примѣненіе электричества при лѣченіи аменорреи.**—(Annali di ost. e gines., 1894, Maggio).

Изъ краткаго историческаго очерка, приведеннаго авторомъ, видно, что еще въ 1755 г., de *Haen* примѣнялъ электричество при отсутствіи мѣсячныхъ, затѣмъ *Alberti* (1764), *Fridenthal* (1864 г.), *Whittaker* (1874), и за послѣднее время, появились сообщенія *Nitol*, *Labbé*, *Massin*—по этому вопросу.

La Torre сообщаетъ три наблюденія:

I. Больная 30 л. multipara, metritis chronica и лѣвосторонній сальпинго-оваритъ. Аменоррея. Сдѣлана ампутація маточной шейки по способу *Шредера*; черезъ 4 мѣсяца послѣ операціи, больная заявила, что общее состояніе здоровья улучшилось, но продолжается отсутствіе мѣсячныхъ. Назначено лѣченіе электричествомъ при чемъ въ полость матки вводили отрицательный полюсъ и послѣ 3-го сеанса появилось кровянистое отдѣленіе. Послѣ 15 сеансовъ установился типъ менструаціи.

II. Авторъ примѣнилъ внутриматочную электризацію отрицательнымъ токомъ при *superinv. post. partum* съ благоприятнымъ результатомъ.

III. Больная 26 л., рожала 2 раза; жалуется на отсутствіе мѣсячныхъ въ теченіе 15 лѣтъ, и считала себя беременною 9 мѣся-

цевъ, на основаніи аменорреи и увеличенія объема живота. У больной найдено общее ожиреніе: Матка увеличена и при измѣреніи—полость ея 10 cent.

По мнѣнію автора, въ данномъ случаѣ аменорреа зависѣла отъ общаго ожиренія (d'una amenorrea per diatesi adiposi). Послѣ внутриматочной электризаціи (отрицат. полюсъ) появилась менструація. Всѣхъ сеансовъ было 12. А. Латина.

283. **Schiavoni.**—**Un caso d'amenorrea da superinvoluzione uterina post-partum in utero doppio didelfo.**—(Annali di ost. e. Ginec., Ottobre, 1894).—**Uterus didelphys, superinv. uteri post-partum, amenorrea.**

Д-ръ *Schiavoni* сообщаетъ объ одномъ случаѣ аномаліи развитія матки. Въ маѣ 1894 г., въ акушерско-гинекологической институтъ проф. *La Torre* поступила *Teresa* № 21, жалуясь на отсутствіе регулъ въ продолженіе 6 мѣсяцевъ послѣ выкидыша на 6-мъ мѣсяцѣ беременности. Начала менструировать 14 л. и типъ регулъ не былъ правильный.

Исслѣдованіе: наружные половые органы развиты правильно; *vagina septa*; влагалищная часть представляется двойною и каждая имѣетъ наружное отверстіе; шейки раздѣлены плотною перемычкою въ 1 cent. шириной.

Зонды, одновременно введенные каждый въ одно изъ наружныхъ отверстій, между собою не соприкасаются и расходятся.

Измѣреніе показало:

Полость правой матки	6½ cent.
„ лѣвой „	7½ „

На ощупь матка уплотнена.

Prof. *La Torre* діагностировалъ: *uterus didelphys, superinvoluti uteri post-partum* и, по его мнѣнію, аменоррею зависѣла отъ суперинволюціи.

Для лѣченія аменорреи назначена электризація матки. Послѣ предварительной дезинфекціи влагалища, вводили въ полость матки отрицательный полюсъ; сеансъ продолжался 5—6 минутъ; интенсивность тока—50—60 м.а. Всѣхъ сеансовъ было 9, причемъ лѣвую матку электризовали 7 разъ и 2 раза правую. Результатъ полученъ благоприятный: у больной появилась менструація. Послѣ того, какъ больная выписалась изъ клиники, сообщала письменно, что состояніе здоровья удовлетворительно, регулы появляются въ правильные сроки, обильны и, въ первые мѣсяцы, сопровождались болями въ области матки и яичниковъ.