

жалованье отъ казны, дабы онѣ не имѣли надобности прибѣгать къ черной работѣ, лишаящей руки ихъ гладкости и тѣмъ препятствующей основательной ихъ дезинфекціи. С. Ю. Хазанъ.

274. Zangemeister.—Drei Fälle von wiederholter Extrauterin-gravidität bei derselben Frau.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 38, Hft 3).—Три случая повторной внѣматочной беременности у одной женщины.

Изучивъ на основаніи собственныхъ трехъ наблюденій и 31 случая другихъ наблюдателей этиологію внѣматочной беременности, авторъ пришелъ къ тому заключенію, что пытаться установить однородную причину для всѣхъ случаевъ внѣматочной беременности было-бы большою ошибкою, такъ какъ болѣзнь эта вызывается самыми разнообразными причинами.

С. Ю. Хазанъ.

275. Pincus.—Eine neue Methode der Behandlung entzündlicher Beckenaffectionen mittelst Belastungslagerung.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—Новый методъ лѣченія воспалительныхъ процессовъ въ тазу помощью т. наз. отягчающаго положенія.

Лѣченіе воспалительныхъ и преимущественно экссудативныхъ процессовъ вокругъ матки и ея придатковъ должно быть прежде всего выжидательное и имѣть свою цѣлью освобожденіе тазовыхъ органовъ отъ тяжести. Последнее достижимо лишь посредствомъ усиленія внутрибрюшнаго давленія, улучшенія стока венозной крови, ускоренія тока лимфы помощью примѣненія тяжести, поднятія тазовыхъ органовъ изъ малаго таза и оставленія пораженныхъ частей въ абсолютномъ покоѣ, а все это въ свою очередь достигается помощью такъ наз. отягчающаго положенія, состоящаго въ *positio in plano inclinato cum compressione*, эффектъ котораго еще усиливается методической легкой гимнастикой и усиленнымъ питаніемъ по способу *Weir-Mitchell*'а. Наклонное положеніе получается помощью поднятія одного конца кровати или матраца на 15—20 сант. выше другого головнаго конца. Давленіе производится какъ на животъ (эластическія повязки, мѣшокъ съ дробью, мокрая глина отъ 2—12 фунтовъ), такъ и на влагалище (воздушный или водяной пессарій, мѣшокъ съ дробью и тампонація). Примѣняется этотъ методъ лѣченія или постоянно или съ промежутками (въ острыхъ случаяхъ). Показаніемъ служить всякаго рода *plethora* тазовыхъ органовъ, смѣщенія и сращенія

половыхъ органовъ, а главное хроническіе эксудаты и болѣзни трубъ. Противопоказуется лѣчение это при явленіяхъ перитонита; точно также нужно отъ него отказаться въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ обнаруживаются симптомы указывающіе на несомнѣнное присутствіе въ эксудатѣ гноя, который необходимо удалить путемъ операціи.

С. Ю. Хазанъ.

276. Klein.—*Hyperemesis gravidarum.*—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—**Неукротимая рвота беременныхъ.**

Подъ понятіе неукротимой рвоты беременныхъ авторъ совѣтуетъ подводить лишь тѣ случаи, въ которыхъ рвота вызывается и поддерживается исключительно беременностью и въ которыхъ замѣтно страдаетъ питаніе больныхъ. Ближайшую причину разбираемой болѣзни слѣдуетъ искать въ существованіи невроза или истеріи. Не только первая степень этой болѣзни (рвота немедленно послѣ приѣма пищи), но и вторая степень (рвота и помимо приѣма пищи, отвращеніе и страхъ передъ пищей, жажда, скудная моча, исхуданіе и слабость) излѣчиваются діететически путемъ доставленія больной физическаго и нравственнаго покоя и урегулированія пищи (употребленіе исключительно жидкостей). Нерѣдко приходится прибѣгать къ клиническому пользованію больной, порою-же одно предложеніе перевести больную въ клинику останавливаетъ рвоту. Мѣстное лѣченіе (исключая устраненія опасныхъ аномалій, какъ *incarceratio uteri retroflexi*) равно какъ употребленіе медикаментовъ является совершенно излишнимъ. Лишь при третьей формѣ болѣзни (кровь въ рвотныхъ изверженіяхъ, лихорадочныя явленія, обмороки и т. п.) можетъ быть рѣчь объ искусственномъ выкидышѣ. Во избѣжаніе-же подобной необходимости слѣдуетъ приступить къ діететическому лѣченію какъ можно раньше.

С. Ю. Хазанъ.

277. Semon.—*Ueber die in dem Provinzial-Hebammeninstitut zu Danzig in den Jahren 1887—1897 ausgeführten Zangenetbindungen.*—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—**О родоразрѣшеніяхъ посредствомъ щипцовъ въ Окружномъ повивальномъ институтѣ въ Данцигѣ за періодъ времени отъ 1887—1897 г.**

За послѣдніе десять лѣтъ въ Данцигскомъ повивальномъ институтѣ щипцы были наложены 123 раза на 2831 случай родовъ = 4,3%. Частота для отдѣльныхъ годовъ колеблется между 2,2% и 7,9%. Щипцы были наложены 81 разъ = 65,8% у первородящихъ и 42 раза = 34,2% у многорожавшихъ. Показаніемъ