

половыхъ органовъ, а главное хроническіе эксудаты и болѣзни трубъ. Противопоказуется лѣчение это при явленіяхъ перитонита; точно также нужно отъ него отказаться въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ обнаруживаются симптомы указывающіе на несомнѣнное присутствіе въ эксудатѣ гноя, который необходимо удалить путемъ операціи.

С. Ю. Хазанъ.

276. Klein.—*Hyperemesis gravidarum*.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—**Неукротимая рвота беременныхъ.**

Подъ понятіе неукротимой рвоты беременныхъ авторъ совѣтуетъ подводить лишь тѣ случаи, въ которыхъ рвота вызывается и поддерживается исключительно беременностью и въ которыхъ замѣтно страдаетъ питаніе больныхъ. Ближайшую причину разбираемой болѣзни слѣдуетъ искать въ существованіи невроза или истеріи. Не только первая степень этой болѣзни (рвота немедленно послѣ приѣма пищи), но и вторая степень (рвота и помимо приѣма пищи, отвращеніе и страхъ передъ пищей, жажда, скудная моча, исхуданіе и слабость) излѣчиваются діететически путемъ доставленія больной физическаго и нравственнаго покоя и урегулированія пищи (употребленіе исключительно жидкостей). Нерѣдко приходится прибѣгать къ клиническому пользованію больной, порою-же одно предложеніе перевести больную въ клинику останавливаетъ рвоту. Мѣстное лѣченіе (исключая устраненія опасныхъ аномалій, какъ *incarceratio uteri retroflexi*) равно какъ употребленіе медикаментовъ является совершенно излишнимъ. Лишь при третьей формѣ болѣзни (кровь въ рвотныхъ изверженіяхъ, лихорадочныя явленія, обмороки и т. п.) можетъ быть рѣчь объ искусственномъ выкидышѣ. Во избѣжаніе-же подобной необходимости слѣдуетъ приступить къ діететическому лѣченію какъ можно раньше.

С. Ю. Хазанъ.

277. Semon.—*Ueber die in dem Provinzial-Hebammeninstitut zu Danzig in den Jahren 1887—1897 ausgeführten Zangenetbindungen*.—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd 39, Hft 1).—**О родоразрѣшеніяхъ посредствомъ щипцовъ въ Окружномъ повивальномъ институтѣ въ Данцигѣ за періодъ времени отъ 1887—1897 г.**

За послѣдніе десять лѣтъ въ Данцигскомъ повивальномъ институтѣ щипцы были наложены 123 раза на 2831 случай родовъ = 4,3%. Частота для отдѣльныхъ годовъ колеблется между 2,2% и 7,9%. Щипцы были наложены 81 разъ = 65,8% у первородящихъ и 42 раза = 34,2% у многорожавшихъ. Показаніемъ