

## V.

### Тазъ еврейки. Живой доношенный еврейскій ребенокъ.

Ординатора Клиники М. Л. Папернаго.

(Изъ клиники акушерства и женскихъ болѣзней проф. Н. В. Ястrebова при Императорскомъ Варшавскомъ Университетѣ).

Уже въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія было обращено вниманіе на тотъ чрезвычайно важный и интересный фактъ, что величина и форма таза взрослой женщины бываютъ существенно отличны у индивидуумовъ, принадлежащихъ къ различнымъ расамъ, народамъ, племенамъ.—Явленіе это, особенно важное съ акушерской точки зрењія, было впослѣдствіи подтверждено работами многочисленныхъ авторовъ и въ настоящее время оно считается фактомъ, не подлежащимъ никакому сомнѣнію.

Я здѣсь не намѣренъ вдаваться въ литературу по этому вопросу, такъ какъ это не составляетъ ближайшей цѣли моего настоящаго труда, тѣмъ болѣе, что литературные данныя по этой части весьма подробно разработаны многоуважаемымъ товарищемъ д-ромъ Павловымъ въ опубликованной уже работѣ: «Къ ученію о величинѣ и формѣ таза взрослой женщины. Тазъ польской женщины». (Журналъ Ак. и Жен. Бол. Т. IX. юнь 1895 г.) и въ неопубликованной еще диссертациіи того-же автора.—Главная цѣль моей настоящей работы это, согласно предложенію проф. Н. В. Ястrebова, указать на величину и форму таза взрослой еврейки, равно какъ на размѣры доно-

шеннаго еврейскаго ребенка, по сосьмъ новой классификаціи тазовъ даннаго народа, предложенной проф. Ястремовимъ въ недавно изданной имъ «I-ой части курса Акушерства». (Варшава, 1896 г.).

Здѣсь тазы даннаго народа раздѣляются по ихъ величинѣ на три категоріи.

1) *Нормальные тазы*: «при которыхъ средній зрѣлый плодъ можетъ родиться силами природы безъ тѣхъ осложненій, которыя могутъ быть поставлены въ связь съ пространственнымъ несоответствіемъ между плодомъ и тазомъ».

2) *Тазы производительницы*, при которыхъ возможно рожденіе средняго зрѣлаго плода или зрѣлаго, имѣющаго размѣры менѣе средней нормы, силами природы, безъ осложненій или съ осложненіями, зависящими отъ пространственного несоответствія между плодомъ и тазомъ.

3) *Племянной тазъ*: «средній изъ большаго числа тазовъ даннаго народа, въ число которыхъ должны войти всѣ попадающіяся въ данное время у народа патологическія формы».

Для осуществленія предпринятой цѣли, я воспользовался протоколами родовъ въ Варшавской Акушерской клиникѣ за десятилѣтній періодъ, начиная съ 1887 г. до 1896 г. включительно. Изъ такого огромного клиническаго матеріала мнѣ удалось выбрать только 176 еврейскихъ тазовъ, гдѣ кромѣ другихъ размѣровъ таза была отмѣчена и *cong. diagonalis*; отсутствіе-же послѣдней объясняется въ протоколахъ многими причинами: сильной болѣзnenностью при изслѣдованіи, недостижимостью мыса, свѣжесросшейся промежностью и проч.

При обработкѣ цифръ я, для болѣйшей точности, воспользовался формулой проф. Stied'a, благодаря которой кромѣ простой ариѳметической средней опредѣляются еще предѣлы колебанія и точность ея. Формула эта слѣдующая:  $r$  (предѣль колебанія средней величины) =  $0,6745 \sqrt{\frac{sd^2}{n}}$ , гдѣ  $0,6745$  — постоянное число;  $d$  — разность отдельнаго измѣренія отъ ариѳметической средней;  $sd^2$  — сумма всѣхъ квадратовъ разности;  $n$  — число отдельныхъ измѣреній.  $R$  (точность средней величины)

$$= \sqrt{\frac{r}{n}}$$

Согласно классификаціи проф. Ястrebова, прежде всего пришлось опредѣлить средній племянной еврейской тазъ, для чего послужили всѣ 176 тазовъ, имѣвшихся въ моемъ распоряженіи. Въ 14-ти тазахъ, главнымъ образомъ съуженныхъ, была опредѣлена и conj. vera, что дало мнѣ возможность вычислить и среднюю разность между диагональной и истинной коньюгатами.—Результатъ этихъ вычисленій слѣдующій:

### I. Племянной еврейской тазъ.

	M.	$\pm r.$	$\pm R.$
Dist. i. spin-spin. anter. . . . .	25,02	0,99	0,075
crist. cristarum. . . . .	27,19	1,01	0,076
Conjugata externa. . . . .	18,39	0,64	0,048
diagonalis. . . . .	11,34	0,51	0,038
Differ. i. d. spin. et d. crist. . . . .	2,17	0,58	0,044
" c. ext. et c. diag. . . . .	7,96	0,57	0,043
" c. diag. et c. vera. . . . .	1,70	0,18	0,047

Schröter, (Antropologische Untersuchungen am Becken lebender Menschen. Dorpat 1884) измѣрившій въ 1884 г. 40 евреекъ въ Варшавѣ, пришелъ къ совсѣмъ инымъ результатамъ.

По Schröter'у: Dist. spin. il. ant. sup. = 22, 6.  
 crist. il. = 26,06.  
 Conj. ext. = 18,10.

Сравнивая цифры, полученные нами и Schröter'омъ, сей-часъ-же бросается въ глаза громадная разница между ними. Мы видимъ, что всѣ размѣры еврейского таза, по нашимъ вычисленіямъ, больше таковыхъ по Schröter'у, причемъ осо-бенно замѣтна разница по отношенію къ dist. spin. ant. sup., разница, доходящая до 2,42; differ. между dist. spin. и crist., играющая такую важную роль въ акушерствѣ, равняется по нашей таблицѣ 2,17, а по Schröter'у она = 3,46(!). Но если принять во вниманіе малое число наблюдений Schröter'a, гдѣ быть можетъ случайнымъ образомъ попали своего рода исключительные тазы и то обстоятельство, что Schröter дѣлалъ эти измѣренія, будучи еще студентомъ, на матеріалѣ во всякомъ случаѣ не клиническомъ, мы должны относиться къ его цыфрамъ съ нѣкоторымъ недовѣріемъ и отдать, само собою разумѣется, предпочтеніе цыфрамъ, добытымъ на большомъ числѣ клинически измѣренныхъ женщинъ.

Изъ вышеприведенной таблицы также наглядно видно, насколько размѣры еврейского таза рѣзко отличаются отъ размѣровъ общепринятыхъ для другихъ племенъ и шаблонно описанныхъ во многихъ акушерскихъ руководствахъ, а также насколько практическому акушеру важно знать размѣры таза женщины, принадлежащей къ данному племени, чтобы прогнозъ и терапія его основывались всегда на прочныхъ, научныхъ основаніяхъ.

Для опредѣленія среднихъ размѣровъ доношенного еврейского ребенка, я исключилъ изъ общаго числа 176 дѣтей, 37 недоношенныхъ и 2 перфорированныхъ, не зная точно количества выпущенного при перфорации мозга, такъ что для статистической обработки осталось 137 доношенныхъ, живыхъ, еврейскихъ дѣтей. Чтобы быть по возможности болѣе точнымъ, я кромѣ того опредѣлилъ размѣры ребенка отдельно для перво=, второ= и многородящихъ, и отдельно, наконецъ для мальчиковъ и дѣвочекъ. Результаты получились слѣдующіе:

#### II. ТАБЛИЦА СРЕДНИХЪ РАЗМѢРОВЪ ДОНОШЕННОГО ЖИВОГО ЕВРЕЙСКАГО РЕБЕНКА.

	M.	$\pm$ r.	$\pm$ R.
Всѣ . . . . .	3225,60	214,56	18,46
Длина . . . . .	50,29	1,37	0,118
Окружность головки прямая . . . . .	34,02	0,88	0,076
" косая . . . . .	37,78	0,91	0,079
Размѣр головки прямой . . . . .	11,07	0,32	0,027
" косой . . . . .	13,03	0,41	0,035
" поперечный большой . . . . .	8,8	0,39	0,034
" малый . . . . .	7,6	0,33	0,028
Окружность на высотѣ плечиковъ . . . . .	34,49	1,39	0,120
Размѣр " " " . . . . .	11,52	0,63	0,054

#### III. ТАБЛИЦА СРЕДНИХЪ РАЗМѢРОВЪ ДОНОШЕННОГО ЖИВОГО ЕВРЕЙСКАГО РЕБЕНКА ПО ОТНОШЕНИЮ КЪ ПОЛУ И ЧИСЛУ РОДОВЪ.

	Primiparae (мальчики).			Primiparae (дѣвочки).		
	M.	$\pm$ r.	$\pm$ R.	M.	$\pm$ r.	$\pm$ R.
Всѣ . . . . .	3266,49	207,62	32,43	3074,66	154,43	23,02
Длина . . . . .	50,41	1,15	0,179	49,51	1,21	0,180
О. пр. гол. . . . .	34,65	0,75	0,117	33,71	0,94	0,140
О. кос. . . . .	38,43	0,94	0,147	37,59	0,81	0,120
Разм. пр. гол. . . . .	11,12	0,30	0,047	11,04	0,30	0,045
" кос. . . . .	13,14	0,38	0,059	12,96	0,25	0,038
Поп. больш. гол. . . . .	8,81	0,26	0,040	8,69	0,31	0,046
" малый . . . . .	7,63	0,34	0,053	7,40	0,32	0,047
О. плечик. . . . .	34,68	1,36	0,213	34,01	0,86	0,013
Разм. . . . .	11,46	0,64	0,100	11,40	0,45	0,067

	Secundiparae (мальчики).			Secundiparae (дѣвочки).		
	M.	± r.	± R.	M.	± r.	± R.
Вѣсъ . . . . .	3413,52	226,38	54, 84	3210,00	218,21	48, 80
Длина . . . . .	50,88	1,86	0,451	51,15	1,28	0,286
О. пр. гол. . . . .	34,50	0,88	0,213	33,25	0,71	0,158
О. кос. " . . . . .	37,85	0,83	0,202	36,92	0,92	0,212
Разм. пр. гол. . . . .	11,18	0,35	0,085	10,91	0,26	0,058
" кос. " . . . . .	13,09	0,52	0,127	12,85	0,36	0,082
Поп. больш. гол. . . . .	9,00	0,65	0,157	8,74	0,28	0,062
" малый " . . . . .	7,74	0,30	0,073	7,68	0,23	0,051
О. плеч. . . . .	35,68	1,40	0,338	34,35	1,24	0,278
Разм. плеч. . . . .	11,71	0,72	0,118	11,55	0,64	0,143

	Multiparae (мальчики).			Multiparae (дѣвочки).		
	M.	± r.	± R.	M.	± r.	± R.
Вѣсъ . . . . .	3404,44	236,94	78, 98	3296,00	201, 27	90, 02
Длина . . . . .	50,66	1,58	0,527	51,00	1, 91	0,853
О. пр. гол. . . . .	34,11	1,05	0,350	33,60	0,034	0,015
О. кос. " . . . . .	38,11	1,09	0,363	37,20	0,058	0,026
Разм. пр. гол. . . . .	11,22	0,34	0,114	10,90	0,37	0,165
" кос. " . . . . .	13,22	0,42	0,139	12,80	0,61	0,274
Поп. больш. гол. . . . .	9,00	0,38	0,126	8,95	0,075	0,034
" малый " . . . . .	7,86	0,42	0,141	8,00	0,24	0,107
О. плеч. . . . .	33,44	1,88	0,627	35,00	0,95	0,427
Разм. плеч. . . . .	11,61	0,88	0,292	11,90	0,69	0,309

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что въ общемъ мальчики, какъ у перво, = такъ и у многородящихъ, вѣсятъ больше дѣвочекъ, приблизительно на 200 грам.; длина мальчиковъ и дѣвочекъ приблизительно одинакова; размѣры головки и плечиковъ въ общемъ у мальчиковъ больше, чѣмъ у дѣвочекъ. Вѣсъ дѣтей у первородящихъ значительно меньше, чѣмъ у многородящихъ. Постараемся теперь сравнить вѣсъ и размѣры еврейского доношенаго плода съ таковыми русскаго и польскаго.

На основаніи этой сравнительной таблицы мы приходимъ къ довольно интересному заключенію: еврейскій доношенный ребенокъ по вѣсу меньше русскаго и польскаго; окружность, поперечные размѣры головки и поперечные размѣры плечиковъ еврейскаго ребенка уступаютъ таковымъ русскаго, межъ тѣмъ какъ длина русскаго плода, прямой и косой размѣры головки его уступаютъ таковымъ еврейскаго, такъ что въ общемъ русскій доношенный плодъ по вѣсу и размѣрамъ одинаково относится какъ къ польскому, такъ и къ еврейскому доношенному ребенку.—Сравнивая затѣмъ отдельно зрѣлого еврейскаго и польскаго плода, мы видимъ, что въ длину плода, окружности, прямомъ и косомъ размѣрахъ го-

IV. ТАБЛИЦА СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ И ВСЕЙ ЖИЛЫХ ДОНОПЕННЫХ ПЛОДОВЪ РУССКИХ, ПОЛЬСКИХ И ЕВРЕЙСКИХ.

Материалъ.	Мѣсто соби- ранія мате- риала. Авторъ.	Вѣсъ.	Р А З М Е Р Ы Г О Л О В К И.				Окружность на высотѣ плечи- ковъ.	Размѣръ на вы- сотѣ плечикъ.	
			Длина.	Окружность го- ловки прямая.	Прямой.	Косой.			
275	С.-Пе- тровскъ тербургъ. русскихъ.	$3350 \pm 17,5$ $r = \pm 297$	$49,3 \pm 0,07$ $r = \pm 1,80$	$34,4 \pm 0,04$ $r = \pm 0,79$	—	$11,0 \pm 0,02$ $r = \pm 0,42$	$12,9 \pm 0,01$ $r = \pm 0,31$	$9,15 \pm 0,01$ $r = \pm 0,24$	$7,9 \pm 0,01$ $r = \pm 0,21$
276	гор. Бар- ылодовъ шава. польск.	$3340 \pm 17,5$ $r = \pm 292$	$50,95 \pm 0,11$ $r = \pm 1,89$	$34,54 \pm 0,06$ $r = \pm 1,01$	$38,29 \pm 0,06$ $r = \pm 0,13$	$11,44 \pm 0,02$ $r = \pm 0,43$	$13,35 \pm 0,03$ $r = \pm 0,55$	$8,52 \pm 0,02$ $r = \pm 0,35$	$7,5 \pm 0,02$ $r = \pm 0,35$
137	гор. Бар- ылодовъ шава. еврейск.	$3225 \pm 18,46$ $r = \pm 214,56$	$50,29 \pm 0,11$ $r = \pm 1,37$	$34,02 \pm 0,17$ $r = \pm 0,88$	$37,78 \pm 0,07$ $r = \pm 0,91$	$11,07 \pm 0,03$ $r = \pm 0,32$	$13,03 \pm 0,03$ $r = \pm 0,41$	$8,8 \pm 0,03$ $r = \pm 0,39$	$7,6 \pm 0,028$ $r = \pm 0,33$
									$34,49 \pm 0,12$ $r = \pm 1,39$
									$11,52 \pm 0,05$ $r = \pm 0,63$

ловки еврейской ребенокъ уступаетъ польскому, превосходя послѣдняго въ поперечныхъ (большомъ и маломъ) головки и поперечномъ плечиковъ, едва только на десятая сантиметра. Только послѣ того какъ мы опредѣлили племянной еврейской тазъ и величину живого доношенного еврейского плода, мы могли, на основаніи вышеупомянутой классификаціи тазовъ проф. Ястrebова, приступить къ опредѣленію нормального еврейского таза и таза производительницы еврееки.—Для опредѣленія этого рода тазовъ, слѣдовало изъ общаго числа 176 исключить: тазы, при которыхъ роды были окончены *оперативнымъ путемъ*; затѣмъ тазы, при которыхъ родились силами природы *недоношенные дѣти* и, наконецъ, тазы, гдѣ силами природы родились *мертвые дѣти*.

Такихъ тазовъ, непригодныхъ для дальнѣйшихъ вычислений, оказалось 50, такъ что въ нашемъ распоряженіи осталось всего 126 тазовъ, и результатомъ статистической обработки ихъ являются двѣ нижеслѣдующія таблицы.

V. ТАБЛИЦА СРЕДНИХЪ РАЗМѢРОВЪ НОРМАЛЬНОГО ЕВРЕЙСКАГО ТАЗА.

	M.	$\pm r.$	$\pm R.$
Dist. i. spin.-spin. anter. . . . .	25,45	0,91	0,105
„ crist. cristarum. . . . .	27,78	0,87	0,100
Conjugata externa . . . . .	18,80	0,59	0,068
„ diagonalis . . . . .	11,53	0,53	0,061
Differ. i. d. spin. et d. crist. . . . .	2,33	0,54	0,063
„ „ c. ext. et c. diag. . . . .	7,28	0,53	0,061

VI. ТАБЛИЦА СРЕДНИХЪ РАЗМѢРОВЪ ТАЗА ЕВРЕЙСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНИЦЫ.

	M.	$\pm r.$	$\pm R.$
Dist. i. spin.-spin. anter. . . . .	25,12	0,96	0,085
„ crist. cristarum. . . . .	27,42	0,91	0,081
Conjugata externa . . . . .	18,56	0,62	0,055
„ diagonalis . . . . .	11,39	0,59	0,053
Differ. i. d. spin. et d. crist. . . . .	2,30	0,55	0,049
„ „ c. ext. et c. diag. . . . .	7,17	0,54	0,048

Сравнивая таблицы 3-хъ категорій еврейскихъ тазовъ, видно, что размѣры нормального таза превосходятъ таковые племянного и таза производительницы; размѣры племянного таза уступаютъ размѣрамъ двухъ остальныхъ; наконецъ, тазъ производительницы, по отношенію къ своимъ размѣрамъ, стоять посрединѣ между нормальнымъ и племяннымъ.

VII. ТАБЛИЦА СРЕДНИХ РАЗМЕРОВЪ ТАЗА: РУССКОЙ, ПОЛЬСКОЙ И ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНЩИНЪ, РОДИВШИХ ЖИВОЙ  
ДОНОПЕННЫЙ ПЛОДЪ.

МАТЕРИАЛЪ.	Мѣсто собирания материала. Авторъ.	Dist. sp.-sp.	Dist. cr. cr.	Conjug. ext.	Conjug. diag.	Diff. inter. conj. ext. et diag.
275 женщинъ русскихъ						
	C.-Петербургъ . . .	24,5 ± 0,05	27,7 ± 0,05	19,15 ± 0,03	12,5 ± 0,02	6,68 ± 0,02
	<i>Павловъ.</i>	r = ± 0,87	r = ± 0,85	r = ± 0,63	r = ± 0,38	r = ± 0,43
276 женщинъ полокъ.						
	Варшава . . . . .	25,26 ± 0,06	28,05 ± 0,05	18,85 ± 0,04	11,52 ± 0,03	7,32 ± 0,03
	<i>Павловъ.</i>	r = ± 1,07	r = ± 0,97	r = ± 0,68	r = ± 0,54	r = ± 0,66
126 женщинъ евреекъ						
	Варшава . . . . .	25,12 ± 0,08	27,42 ± 0,08	18,56 ± 0,05	11,39 ± 0,05	7,17 ± 0,04
		r = ± 0,96	r = ± 0,91	r = ± 0,62	r = ± 0,59	r = ± 0,54

Сравнивая данные, добытыя д-ромъ *Павловымъ* съ нашими, по отношенію къ тазамъ производительницъ: русской, польки и еврейки, мы приходимъ къ слѣдующему заключенію. Хотя всѣ размѣры таза еврейки и уступаютъ таковыми польки, однако разница между всѣми размѣрами выражается только въ десятыхъ сантиметра. Размѣры таза русскихъ женщинъ значительно превосходятъ таковые еврейки только по отношенію къ наружной и діагональной коньюгатамъ. межъ тѣмъ какъ разница въ ихъ поперечныхъ размѣрахъ незначительна, и что касается *dist. spin. spin.* разница выходитъ даже въ пользу таза еврейки; разность между *dist. spin.* и *crist.*, въ тазахъ русскихъ женщинъ больше, чѣмъ въ еврейскихъ, и наоборотъ, разность между *conj. ext.* и *conj. diagonalis* въ еврейскихъ тазахъ больше, чѣмъ въ русскихъ.

Изъ вышесказанного заключаемъ, что тазъ еврейки относится точно также къ русскому тазу, какъ тазъ польки къ этому послѣднему. Сопоставляя теперь размѣры таза производительницы еврейки съ размѣрами средняго доношенного живого еврейского ребенка, мы, на основаніи вышеприведенныхъ таблицъ, видимъ, что размѣры плода вполнѣ соответствуютъ размѣрамъ таза, черезъ который плодъ долженъ *sua sponte* пройти во время родового акта. Незначительное-же преобладаніе поперечныхъ размѣровъ еврейского ребенка въ сравненіи съ размѣрами еврейского таза уравновѣшивается безъ сомнѣнія сильной конфигураціей головки плода во время прохожденія послѣдней черезъ родовой каналъ; вышеупомянутой-же конфигураціи головки особенно способствуетъ чрезвычайная тонкость черепныхъ костей у еврейскихъ плодовъ, которая клинически часто и наблюдается.

Резюмируя все вышесказанное нами, мы вправѣ сдѣлать слѣдующія заключенія.

- 1) Еврейскій тазъ и живые доношенные еврейскіе плоды далеко не такъ малы, какъ это предполагалось до сихъ поръ большинствомъ акушеровъ.
- 2) Еврейскій тазъ по формѣ и величинѣ ближе подходить къ польскому, чѣмъ къ русскому тазу.

3) Между размѣрами доношенного еврейского плода и размѣрами еврейского таза существуетъ полное соотвѣтствіе.

4) Конфигурація головки доношенного еврейского плода во время родовъ должна быть значительная.

---