

орѣхъ, узурпировавшая часть маточной стѣнки, до  $\frac{1}{2}$  ея толщины. *Boldt* считалъ ее за *angioma cavernosum*; *Doran* же думаетъ, что это былъ плацентарный полипъ.

Въ случаѣ *Lejars* и *Levi* тоже вырѣзали матку, предполагая ракъ. Оказалось, что опухоль состояла изъ чистой плацентарной ткани, т. е. напрасно только произвели *hysterectomiam*.

*Galabin* наблюдалъ у пожилой женщины миксоматозную опухоль; послѣ выскабливанія, она рецидивировала. *Galabin*'у казалось, что онъ имѣетъ дѣло съ злокачественнымъ новообразованиемъ. Вторичное выскабливаніе и совпавшее по времени наступленіе климактерія излѣчили больную. (Реф. описалъ 3 случая плацентарныхъ полиповъ въ протоколахъ общества Русскихъ врачей въ Москвѣ, № 23-й, отъ 2-го декабря 1872 г. съ приведеніемъ литературы того времени).  
*М. Гинзбургъ.*

71. I. Charles J. Cullingworth (London). — Diffuse (non-capsulated) Myoma of uterus. — (Transactions of the obstetrical society of London, vol. XXXVII, 1895, p. 143). — Разлитая (неинкапсулированная) миома матки.

II. William Duncan (London). — Oedematous Myoma of uterus. — (Ibidem, p. 148). — Отечная миома матки.

I. Большая часть опухоли въ случаѣ *Cullingworth*'а не была рѣзко отграничена; она инфильтровала стѣнки матки не какъ доброкачественная, а скорѣе, какъ злокачественная опухоль. Не смотря на 55 лѣтній возрастъ больной, регулы не только не останавливались, но были такъ сильны, что угрожали жизни больной. Регулы начались у ней съ 14 лѣтъ, были всегда болѣзненны и обильны; 29 лѣтъ она была замужемъ и родила трехъ живыхъ дѣтей и имѣла 1 выкидышъ. Послѣднія ея роды были въ 1879 году и матка послѣ нихъ осталась увеличенною. 7 лѣтъ назадъ она замѣтила у себя опухоль; регулы ея стали обильны и длились по 9 дней, которыя она должна была оставаться въ постели. Въ 1890 г. она консультировалась д-ра *Cullingworth*'а, который предложилъ ей подождать съ операціей, рассчитывая на уменьшеніе кровотеченій съ прекращеніемъ регулъ. Когда три года спустя, кровотечения, продолжаясь, довели ее до изнеможенія, С. согласился оперировать ее. Гистеректомія кончилась хорошо, больная выздоровѣла. Передняя стѣнка матки была равномерно утолщена, тверда; при расширеніи матки опухоль вдавалась въ полость ея въ видѣ гладкой, твердой опухоли. Зондъ входилъ на 5 дюймовъ. Выскабливаніе облегчило ее на 3 недѣли.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ С. произвелъ у ней гистеректомію. Фаллопьевы трубы были нормальны, оба яичника—малы и атрофированы, въ правомъ была небольшая кровяная киста. Матка была 3 дюймовъ длины,  $3\frac{1}{4}$  дюйма въ передне-заднемъ,  $4\frac{1}{2}$  дюйма въ поперечномъ размѣрѣ и  $11\frac{1}{2}$  дюйма въ окружности, наружная поверхность матки была гладка, исключая задне-нижней части ея, на которой замѣчалось выпячиваніе круглаго фиброида, сидѣвшаго въ своей отдѣльной капсулѣ. На правой сторонѣ опухоли былъ другой меньшій фиброидъ, легко вылущенный изъ общей массы разлитой опухоли. Последняя инфильтровала всю толщу матки, отъ слизистой до брюшины. Нормальной маточной ткани не видно было, вылущить міому невозможно было.

Маточный каналъ находился въ задней части опухоли, былъ 2 дюйма длины; слизистая казалась совершенно нормальною. Міома представлялась на разрѣзѣ сѣрватою—бѣлой тканью, фиброиды—бѣлыя и слои ихъ болѣе концентрическими.

Подъ микроскопомъ видны были въ міомѣ вертенообразныя мышечныя клѣтки, размѣщенныя неправильно, съ немногими соединительно-тканными элементами; между первыми замѣчалось нѣсколько овальныхъ или круговидныхъ промежутковъ—венозные синусы; въ 1 или 2 мѣстахъ замѣчалось миксоматозное перерожденіе.

II. Больная *W. Duncan*'а была не замужняя, 26 лѣтъ; до 1891 г. была здорова. Въ 1891 г. заболѣла, нѣсколько недѣль пролежала въ постели и съ того времени одна нога у ней осталась утолщенной. Въ 1893 г. регулы стали длиться по 7—14 дней и животъ сталъ пухнуть. Передъ операциею опухоль достигла до мечевиднаго отростка, флюктуировала и представлялась гладкой и эластичной. Вырѣзана абдоминальнымъ путемъ. Опухоль вѣсила 7 фунтовъ. Больная выздоровѣла. *М. Гинзбургъ.*

72. *Dr. Fairfax Ross (Sydney).—A long Pregnancy.—(The Australasian med. Gaz., 20 july, 1896, p. 281).—*Чрезмѣрно продолжительная беременность.

Женщина 31 года; въ 1-й разъ разрѣшилась мальчиномъ 8 лѣтъ назадъ; 2-я беременность окончилась преждевременными родами въ 7 мѣсяцевъ три года назадъ. Съ молодыхъ лѣтъ страдаетъ опущеніемъ лѣваго яичника и воспаленіемъ Фаллопиевыхъ трубъ и яичниковъ. 3-я беременность наступила у ней въ 1895 г.; 30 сентября она почувствовала первое движеніе. *Dr. Ross*, приглашенный къ ней 6-го октября, ясно ощущалъ