

77. Dr. G. Coromilas (Greece).—Technique of the Dilatation of the Perineum in Labor.—(Edinburgh medical Journal, August 1896, p.p. 134—137).—Техника расширения промежности во время родовъ.

Практикующій въ Греції *Coromilas* прислалъ проф. *J. W. Ballantyne* описание примѣненаго имъ способа расширения не податливой промежности, состоящей въ слѣдующемъ. Роженица ложится на спинѣ или на лѣвомъ боку, ноги ея согнуты, какъ обыкновенно при родахъ. Лобокъ, большія и малыя губы, промежность и влагалище старательно обмываются, по возможности до асептичности. Акушеръ, продезинфицировавъ свои руки, смазываетъ ихъ такимъ составомъ:

Vaselini	50.0
Cocaini.	3.0
Antipyrini.	3.0

Промежность, влагалище и зѣвъ смазываются тою же мазью. Акушеръ вводить 4 пальца руки во влагалище и дѣлаетъ ими полукружныя движенія то въ одну, то въ другую сторону, растягивая ими по немногу промежность. Послѣ 3-хъ 4-хъ такихъ движеній одною рукою, акушеръ замѣняетъ ее другою рукой и дѣлаетъ ею рядъ такихъ же движеній. Когда требуемая степень растяженія промежности достигнута, тогда пальцы проводятся глубже въ рукаву, пока указательный, средній и 4-й пальцы не соприкасаются съ зѣвомъ, а ладонною поверхностью ручной кисти повторяютъ круговыя движенія въ родѣ описанныхъ выше. Когда предлежащая часть надавливаетъ на пальцы, акушеръ извлекаетъ свою руку и проводить остальную часть родовъ, какъ обыкновенно.

Проф. *Ballantyne* высказываетъ, что этимъ способомъ можно предупредить разрывы промежности и что втираніе кокainо-антипириновой мази должно уменьшить боли при прорѣзываніи головки.

Изъ приводимыхъ д-ромъ *Coromilas* 4-хъ исторій родовъ съ примѣненіемъ его способа видно, что роды прошли съ незначительною болью, расширение зѣва и прорѣзываніе—прошли быстрѣе обычнаго; но самыя манипуляціи растягиванія промежности производятъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ порядочную боль.

M. Гинзбургъ.