

менструаціонное кровотеченіе изъ слизистой оболочки матки продолжается и получаетъ характеръ менорагіи. *Б. Фейнбергъ.*

89. **G. Burckhard.**—50 Fälle von vaginaler Totalexstirpation des Uterus nach der Doyen-Landauschen Methode.—(Arch. f. G. 53 II).—50 случаевъ полной экстирпаціи матки черезъ рукавъ по методу Doyen-Landau.

Незначительность числа операцій *B.* объясняетъ тѣмъ, что проф. *Pernice* изъ клиники котораго взяты эти случаи придерживается слѣдующихъ воззрѣній. Онъ оперируетъ лишь при полной подвижности матки и если параметріи свободны отъ карциноматозныхъ массъ. Допускается незначительное распространеніе рака на заднюю и боковую стѣнки рукава, но не на переднюю.

Непосредственно послѣ операціи умерли 10=20%. Рецидивы у 18=36%; изъ послѣднихъ умерли или заболѣли черезъ 3 мѣсяца послѣ операціи 4=8%; съ 3-го до 6-го мѣсяца 3=6%; до 1 года 4=8%, въ теченіи 2-го года р. ор. 5=10%, въ теченіи 3 года 1=2%, въ теченіи 4 года 1=2%. Свободны отъ рецидива остались 17=24%.

Ни въ одномъ случаѣ не замѣчено послѣдовательное кровотеченіе. *Б. Фейнбергъ.*

90. **B. S. Schultze.**—Einiges über Pathologie und Therapie der Retroflexio uteri.—(Monatsschrift f. Geburtshilfe und Gynaecologie 1896. Januar).—**Къ патологіи и терапіи ретрофлексіи матки.**

Эта статья имѣетъ полемическій характеръ и направлена противъ *Theilhaber*'а. Послѣдній на гинекологическомъ конгрессѣ въ Вѣнѣ сдѣлалъ докладъ, въ которомъ выступилъ противъ обычнаго, принятаго всѣми гинекологами, лѣченія ретрофлексированной матки. *Th.* утверждаетъ, что ретрофлексія матки сама по себѣ не должна считаться патологическою, и что всѣ болѣзненные симптомы, на которые жалуются женщины съ ретрофлексированною маткою, происходятъ обыкновенно не отъ ретрофлексіи, а отъ другихъ причинъ, чаще всего отъ кишечника или же нервнаго происхожденія. *Schultze* хотя и соглашается, что подвижная ретрофлексированная матка можетъ иногда протекать безъ всякихъ болѣзненныхъ симптомовъ, но утверждаетъ, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ это есть явленіе пато-