

срослось и тазовое кольцо расширилось, такъ что больная черезъ годъ родила свободно здороваго доношенаго ребенка. Вслѣдствіе этого *Frank* при слѣдующихъ симфизеотоміяхъ самаго начала рѣшилъ оперировать остеопластически. При этомъ онъ поступалъ слѣдующимъ образомъ: разрѣзъ проводится поперечный надъ самымъ симфизомъ; онъ имѣеть значительныя преимущества передъ обычно принятымъ продольнымъ разрѣзомъ, такъ какъ при немъ щадятся обширныя венозныя сплетенія, лежащія подъ лобкомъ въ области клитора. Верхняя и задняя поверхность лоннаго сочлененія тщательно отдѣляется отъ мягкихъ частей, послѣ чего отъ симфиза долотомъ сверху внизъ откалывается кусокъ кости шириною въ  $3\frac{1}{2}$ —4 сантим. тѣсно связанный спереди съ надкостнично-кожнымъ мостикомъ. Остающаяся часть симфиза послѣ этого легко разсѣкается въ продольномъ направленіи и тазъ расходится. Послѣ окончанія родовъ передняя костная пластинка вдвигается между разошедшимися концами симфиза и фиксируется толстыми шелковыми нитками. Рана зашивается. *Pooth* описываетъ 3 случая, оперированныхъ *Frank*омъ по этому способу съ полнымъ успѣхомъ. Костные пластинки во всѣхъ случаяхъ, даже въ первомъ, протекавшемъ не совсѣмъ гладко, зажили хорошо и получалось полное сращеніе симфиза. Всѣ размѣры таза оказались расширенными на 1— $2\frac{1}{2}$  сантиметра.

*Ф. Веберъ.*

93. Abel. Ergotinol—(Vossinkel) als Ersatz fur Ergotin.—(Berliner Klinische Wochenschrift. 1897. № 8).—Эрготинолъ какъ замѣна эрготина.

*Gottshalk* въ 1892 предложилъ на гинекологическомъ конгрессѣ въ Брюсселѣ новый препаратъ *secalis cornuti*, приготовленный д-ромъ *Vossinkel*емъ и названный имъ эрготиноломъ. Этотъ препаратъ, получаемый довольно сложно способомъ изъ маточныхъ рожковъ, есть ничто иное какъ *liquor ammonii ergotinicici*; 1 куб. сантим. эрготинола соотвѣтствуетъ 0,5 гр. extract. *secalis cornuti*. *Abel* употреблялъ его въ теченіе 3 лѣтъ и остался резульватами весьма доволенъ. Эрготинолъ благодаря своему постоянному химическому составу имѣеть значительныя преимущества передъ эрготиномъ; онъ легче дозируется и дѣйствуетъ гораздо быстрѣе и вѣрнѣе послѣдняго. Кромѣ того онъ въ противоположность эрготину совершенно не подвергается порчу. Употребляется этотъ жидкий препаратъ въ видѣ подкожныхъ впрыскиваний, причемъ въ теченіе дня впрыскивается не больше 2 куб. сантим.

Вследствие довольно сильной болезненности къ эрготинолу прибавляется небольшая доза морфия или кокaina. Главнымъ образомъ эрготинолъ примѣнялся при острыхъ кровотеченіяхъ, но и при хроническихъ особенно при міомахъ матки *Abel* имѣлъ прекрасные результаты. При послѣднихъ *Abel* во время менструаций впрыскивалъ ежедневно по одному шприцу, въ промежуткахъ же между ними впрыскиванія производились два раза въ недѣлю; кровотеченіе во всѣхъ случаяхъ значительно уменьшалось, хотя величина міомъ въ большинствѣ случаевъ не измѣнялась.

*Ф. Веберъ.*

94. *Flatan.—Ueber Vaginistrictur bei Prolaps.*—(Monatschrift f. Geburtshilfe und Gynaecologie 1896. August).—**О вагиностриктурѣ при пролапсѣ.**

Въ 1893 году *Freund* младшій описалъ новый способъ операций вынаденія матки, состоящій въ томъ, что влагалище съуживается посредствомъ нѣсколькихъ лигатуръ изъ серебряной проволоки, наложенныхъ кольцеобразно подъ слизистою оболочкою влагалища. Этотъ способъ, примѣнимый по легко понятнымъ причинамъ, исключительно въ старческомъ возрастѣ, не нашелъ себѣ многихъ сторонниковъ, такъ какъ серебряная проволока обыкновенно вызывала нагноеніе и черезъ болѣе или менѣе короткій срокъ выходила наружу. *Flatan* сдѣлалъ не большое видоизмѣненіе способа *Freund'a*, состоящее въ томъ, что вся проволока находится въ около влагалищной клѣтчаткѣ, въ то время какъ у *Freund'a* проволока на мѣстахъ вколо и выкола смотритъ въ просвѣтъ влагалища, вслѣдствіе чего такъ часто и получалось нагноеніе. Эта маленькая операция производится строго асептически обыкновенно безъ всякаго наркоза; на мѣстѣ вколо изъ слизистой оболочки влагалища отсепаровывается маленький лоскутъ; большая слегка изогнутая игла проводится подъ слизистою оболочкою и на мѣстѣ предполагаемаго выкола иглы отдѣляется второй лоскутъ, гдѣ выкалывается и снова вкальвается игла. Обыкновенно въ 2—3 приема удается провести проволоку въ видѣ кольца вокругъ всего влагалища и вывести ее у первого лоскута, гдѣ проволока стягивается и закрѣпляется. Послѣ этого лоскуты зашиваются 1—2 ктгутовыми швами, такъ что серебряная проволока не имѣеть никакого сообщенія съ просвѣтомъ влагалища. Обыкновенно 3—4 такихъ лигатуръ достаточно, чтобы хорошо стянуть влагалище и препятствовать вынаденію матки. Авторъ произвелъ эту операцию три