

раза и имѣлъ очень хороший продолжительный успѣхъ. Серебряная проволока во всѣхъ случаяхъ зажила безъ всякой реакціи.
Ф. Веберъ.

95. Neumann.—Ueber puerperale uterus gonorrhoe.—Monatschrift f. Geburtshülfe u. Gynaecologie 1896, August.—**О послѣродовой гонорреѣ матки.**

Въ то время какъ въ началѣ предполагали, что гонококи суть исключительно паразиты слизистыхъ оболочекъ, въ послѣднее время въ особенности послѣ работъ *Wertheim'a* и другихъ выяснилось, что они могутъ прекрасно развиваться въ соединительной и даже мышечной ткани. *Neumann*, пользуясь прекраснымъ матеріаломъ клиники *Schauta* въ Вѣнѣ, старался выяснить значеніе гонококовъ въ послѣродовомъ періодѣ. Послѣ многократныхъ тщетныхъ поисковъ ему наконецъ удалось найти гонококовъ въ децидуальной ткани, добытой изъ полости матки женщины продолжавшей безлихорадочный послѣродовой періодъ, но страдавшей небольшимъ гнойнымъ истеченіемъ изъ влагалища и имѣвшей ребенка съ бленноррагическимъ конъюнктивитомъ, маточныя выдѣленія содержали массу гонококовъ. *Neumann* на 9-й день послѣ родовъ съ антисептическими предосторожностями удалил изъ полости матки острой ложкою небольшой кусочекъ ткани. Послѣдній состоялъ изъ типической децидуальной ткани, представлявшей весьма сильную мелкоклеточную инфильтрацію. При соотвѣтствующей окраскѣ здѣсь найдена масса типичныхъ гонококовъ, которые лежали свободно или же въ бѣлыхъ кровяныхъ шарикахъ; децидуальные клѣтки гонококовъ не содержали.

Neumann предполагаетъ, что въ этомъ случаѣ гонококи проникли изъ шейки или влагалища въ полость матки и вызвали гонорройное воспаленіе deciduae послѣ родовъ, такъ какъ трудно, допустить, чтобы беременность могла протечь благополучно при столь рѣзкихъ измѣненіяхъ въ децидуальной ткани. Въ пользу того, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ свѣжимъ процессомъ, говорить еще то обстоятельство, что гонококи найдены преимущественно въ поверхностныхъ слояхъ.
Ф. Веберъ.

96. Ahlfeld.—Giebt Tympania uteri eine Indication zur Entfernung des Uterus in partu?—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXV Hft. 2).—**Представляетъ-ли развитіе газовъ въ маткѣ показаніе къ удаленію этого органа во время родовъ?**

Въ „Centralbl. f. Gyn.“ за 1896 г. были опубликованы два

случая кесарскаго сѣченія. Въ одномъ случаѣ вольнопрактикующій врачъ *Esser*, послѣ неудачной попытки извлечь щипцами низко стоящую головку, удалил незрѣлый но съ сильно вздутымъ животомъ плодъ помощью кесарскаго сѣченія по консервативному способу. Больная выздоровѣла.—Во второмъ случаѣ, который произошелъ въ клиникѣ *Chrobak*'а, дѣло было въ общемъ аналогично, только вслѣдствіе тщетныхъ попытокъ къ родоразрѣшенію произведенныхъ еще внѣ клиники присоединились явленія тимпанита, почему клиническій ассистентъ *Ludvig* прибѣгъ къ операци *Porro*. *Ahlfeld* не только подобно всѣмъ, осуждаетъ образъ дѣйствій *Esser*'а, въ случаѣ котораго не было показанія къ кесарскому сѣченію а только къ эвентраціи, но и образъ дѣйствій *Ludvig*'а, исходя изъ того положенія, что при *turmania uteri*, какъ показываютъ его собственныя наблюденія, при которыхъ онъ дѣлалъ промыванія матки 50% спиртомъ прогнозъ вовсе не такъ плохъ, чтобы нужно было рѣшиться на кесарское сѣченіе.

При этомъ *A.* высказывается также противъ права врача произвести операцию по *Porro* (вмѣсто консервативнаго метода) единственно изъ желанія гарантировать больную отъ возможности вторичнаго забеременѣнія.

C. Ю. Хазанъ.

97. **Alfred Hahn.**—**Ein stadium der Placentarentwicklung.**—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIV Hft. 3).—**Стадій развитія дѣтскаго мѣста.**

Авторъ приводитъ новое наблюденіе, подтверждающее, по его мнѣнію, теорію *Keilmann*'а, по которой не только *placenta praevia* но и всякая *плацента* первоначально развивается на *reflexa*.

C. Ю. Хазанъ.

98. **Ahlfeld.**—**Zur Diagnose der Zwillingsschwangerschaft.**—(Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. XXXIV Hft. 2).—**Къ діагнозу беременности двойнями.**

Абсолютно вѣрный діагнозъ беременности двойнями далеко не такъ легокъ, какъ многіе думаютъ, и это обстоятельство особенно наглядно выступаетъ тогда, когда отъ вѣрнаго діагноза зависитъ образъ дѣйствій врача. *A.* недавно наблюдалъ подобный случай. Многорожавшая, у которой прежніе роды вслѣдствіе узкости таза прошли неблагоприятно для дѣтей, пріѣхала въ Марбургскую клинику, по ея счету за мѣсяць до нормальнаго срока беременности, для производства преждевременныхъ